



Telessaúde
UFSC



apresentam

A importância da atenção primária de saúde nas ações de eliminação do sarampo.

Alda Maria R. Silva

SES/ SC-Diretoria de Vigilância Epidemiológica

Pensar em Sarampo...

Doença viral de transmissão respiratória

Alta Infectividade

Alta Transmissibilidade (15 minutos de contato)


Um (1) caso já é considerado SURTO

Disseminação da doença

- É um vírus muito lábil.
- Em aerossol pode permanecer viável por até duas horas
- Sobrevive bem ao frio
- Persiste em baixa umidade do ar.
- Tem alta transmissão por meio de aerossóis, em consultórios médicos, clínicas, serviços de saúde, academias, escolas...



Figura 6. Curso clínico característico de la infección por el virus del sarampión




Fuente: Reproducido de Krugman S. Diagnosis of acute exanthematous disease. En: *Krugman's infectious diseases of children*, 11th ed. Gershon AA, Hotez PJ, Katz SL (eds.) Figura 45-1, p. 927. Copyright 2000, con la autorización de Elsevier.

Exantema do sarampo

- Exantema de evolução **lenta**, surge na área do cabelo, progride para baixo , até envolver extremidades incluindo palma das mãos e planta dos pés. (distribuição céfalo caudal)
- Máxima intensidade no 3º dia desaparece também da cabeça para as extremidades.
- É maculopapular, **não pruriginoso, não apresenta vesículas, não tem aspecto de lixa, pústulas, petéquias, não recorrente, não desaparece com pressão.**

Sarampo




Sarampo




Koplic

Sarampo



Fonte: Telessaúde UFSC

Não é sarampo




Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS


Sarampo - Epidemiologia

Number of Reported Measles Cases (Last 6 months)



Country	Cases*
Nigeria	14,656
India**	8,373
Liberia	5,291
Pakistan	4,901
Ethiopia	3,145
Afghanistan	2,133
DR Congo***	1,961
Cameroon	1,741
Indonesia	1,434
Côte d'Ivoire	980

SARAMPO – HISTÓRICO RECENTE



**Atualmente 2 Unidades Federadas estão com surto
São Paulo e Amapá**

Último surto de sarampo em Santa Catarina

Tempo : Ano 2019 e 2020: 37 Semanas epidemiológicas

Lugar : 43 municípios

Pessoa : 411 casos

Cenário pós surto 2020 a 2022:

198 casos suspeitos

Todos descartados

Tem sarampo no bairro, e agora?



Sarampo???

Ações imediatas:

Notificar


- Investigar: **É caso suspeito?**
- Vacinação de bloqueio.
- Coleta de material.
- **Busca de outros suspeitos/contatos**
- **Monitoramento casos secundários**



Grande desafio em surto de sarampo


Conter a dispersão viral

- **Busca de contatos - outros suspeitos**
- **Monitoramento casos secundários**



Parceria com Atenção Primária de Saúde é determinante para a contenção de surto

Linha de tempo



Grande desafio em surto de sarampo

Busca de contatos - outros suspeitos

Aparecimento de casos secundários: monitorar até 30 dias para identificar casos secundários. São considerados casos secundários os casos confirmados que tiverem contato direto com o caso positivo.

Seguimento dos contatos : Durante o período de 30 dias todas os contatos que **apresentarem** sinais e sintomas compatíveis com o sarampo devem ser avaliados, notificados e investigados imediatamente .

Grande desafio em surto de sarampo

Cobertura vacinal

Acúmulo de indivíduos suscetíveis sustentam transmissão

Parceria com Atenção Primária de Saúde é determinante para a contenção de surto

Cobertura vacinal e homogeneidade

Vacina tríplice viral em crianças de 1 ano de idade

Santa Catarina 2015 a 2021



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS) dados atualizados em 10/09/2022

Risco Reintrodução Sarampo

Movimentos migratórios/refugiados, guerras, clima, turismo, grandes eventos esportivos...



Obrigada

Perguntas e respostas