



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO  
“ÁREA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO”**

*Cinthia Cunha Maradei Pereira Campos*

**AVALIAÇÃO DE FAQBOTS ATRAVÉS DA  
FERRAMENTA AUTOCHATTER**

Dissertação submetida à Universidade Federal de Santa Catarina como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Ciência da Computação

**Raul Sidnei Wazlawick**  
Orientador

Florianópolis, setembro de 2002

# **AVALIAÇÃO DE FAQBOTS ATRAVÉS DA FERRAMENTA AUTOCHATTER**

*Cynthia Cunha Maradei Pereira Campos*

Esta Dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação - Área de Concentração: Sistemas de Conhecimento e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação.

---

Fernando Álvaro Ostuni Gauthier  
(coordenador do curso)

Banca Examinadora

---

Prof. Dr. Raul Sidnei Wazlawick

---

Profa. Dra. Edla Maria Faust Ramos

---

Prof. Dr. Walter Abreu Cybis

---

Profa. Dra. Liane Tarouco - UFRGS

*Ao meu marido Eduardo,  
nossos filhos, Victor e Catarina,  
meus pais Humberto e Luciana  
e irmãs Cláudia, Simone e Val.*

## EPÍGRAFE

*“...gosto de ser gente porque inacabado,  
sei que sou um ser condicionado,  
mas, consciente do inacabamento,  
sei que posso ir mais além dele.”  
(Paulo Freire)*

## AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, o verdadeiro responsável, por me permitir subir mais um degrau nesta vida, mostrando-me caminhos que não conseguia enxergar, levando-me a agir mesmo quando o corpo pedia descanso, mesmo quando preferia não estar agindo.

Em especial ao meu marido Eduardo que não se limitou a me incentivar, mas perdeu horas de sono junto comigo e contribuiu com diversas linhas deste trabalho.

Aos meus pais que sempre foram pra mim exemplos de atitude de vida, respeito ao próximo e contínua dedicação àquilo que acreditam.

Ao meu orientador Raul que me colocou na “linha” no momento em que já pensava em desistir. Agradeço pela orientação e acompanhamento que me dedicou durante todo o trabalho.

À amiga Elisa que “ficou no meu pé” para que eu não desistisse, fazendo-me acreditar que era capaz.

Aos amigos da Val que participaram voluntariamente da pesquisa.

A Ana Paula, Erivaldo, Cissa, enfim, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

Aos colegas e professores do curso pela grande contribuição que trouxeram ao meu aperfeiçoamento profissional.

## SUMÁRIO

<i>LISTA DE FIGURAS</i> .....	<i>ix</i>
<i>LISTA DE TABELAS</i> .....	<i>xi</i>
<i>RESUMO</i> .....	<i>xii</i>
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xiii</i>
<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Objetivo Geral</b> .....	<b>2</b>
1.1.1 Objetivos Específicos .....	2
<b>1.2 Justificativa</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Estrutura do Trabalho</b> .....	<b>4</b>
<b>2. CHATTERBOTS</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 O que é um Chatterbot</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Classificações</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3 Exemplos de Chatterbots</b> .....	<b>9</b>
2.3.1. ELIZA .....	9
2.3.2. PARRY .....	10
2.3.3. JÚLIA .....	10
2.3.4. CYBELLE.....	11
2.3.5. ALICE.....	12
2.3.6. MegaHAL .....	13
<b>3. AUTOCHATTER – FERRAMENTA DE AUTORIA DE CHATTERBOTS</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1. Apresentação dos Menus do Autochatter</b> .....	<b>14</b>
<b>3.2 Utilidade da ferramenta</b> .....	<b>15</b>
<b>3.3 Funcionamento</b> .....	<b>16</b>
3.3.1- Criação do repertório.....	17
3.3.2 Focos de Assunto.....	19
<b>3.4 Thesaurus</b> .....	<b>19</b>
<b>4. METODOLOGIA DA PESQUISA</b> .....	<b>20</b>
<b>4.1 Contexto da pesquisa</b> .....	<b>20</b>
<b>4.2 Metodologia</b> .....	<b>20</b>
<b>4.3 Fases da pesquisa</b> .....	<b>21</b>
<b>5. RESULTADOS DA PESQUISA</b> .....	<b>23</b>

<b>5.1 Considerações Iniciais .....</b>	<b>23</b>
<b>5.2. Apresentação e análise dos resultados obtidos .....</b>	<b>23</b>
5.2.1 Aplicação do tema AIDS .....	23
5.2.2 Aplicação do tema Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).....	34
5.2.3. Aplicação do tema Educação Sexual.....	45
<b>6. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DA FERRAMENTA.....</b>	<b>59</b>
<b>6.1 Avaliações baseadas em critérios ergonômicos<sup>26,27,28,29</sup> .....</b>	<b>59</b>
6.1.1-Condução .....	60
6.1.2. Carga de Trabalho .....	68
6.1.3.Controle Explícito.....	70
6.1.4. Adaptabilidade.....	71
6.1.5. Gestão de erros .....	72
6.1.6.Homogeneidade/Coerência (Consistência) .....	74
6.1.7. Significado dos códigos e denominações .....	75
6.1.8. Compatibilidade .....	75
<b>7. CONCLUSÕES .....</b>	<b>77</b>
<b>8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>80</b>
<b>9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.....</b>	<b>84</b>
<b>10. ANEXOS .....</b>	<b>86</b>
<b>10.1 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema AIDS.....</b>	<b>86</b>
10.1.1 Questionamentos da 1ª aplicação .....	86
10.1.2 Questionamentos da 2ª aplicação .....	88
10.1.3 Questionamentos da 3ª aplicação .....	91
10.1.4 Questionamentos da 4ª aplicação .....	95
10.1.5 Questionamentos da 5ª aplicação .....	98
10.1.6 Questionamentos da 6ª aplicação .....	102
10.1.7 Questionamentos da 7ª aplicação .....	105
10.1.8 Questionamentos da 8ª aplicação .....	109
10.1.9 Questionamentos da 9ª aplicação .....	112
10.1.10 Questionamentos da 10ª aplicação.....	116
10.1.11 Questionamentos da 11ª aplicação.....	120
<b>10.2 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema DST .....</b>	<b>124</b>
10.2.1 Questionamentos da 1ª aplicação .....	124
10.2.2 Questionamentos da 2ª aplicação .....	127
10.2.3 Questionamentos da 3ª aplicação .....	130
10.2.4 Questionamentos da 4ª aplicação .....	133
10.2.5 Questionamentos da 5ª aplicação .....	137
10.2.6 Questionamentos da 6ª aplicação .....	141
10.2.7 Questionamentos da 7ª aplicação .....	145
10.2.8 Questionamentos da 8ª aplicação .....	149
10.2.9 Questionamentos da 9ª aplicação .....	153
10.2.10 Questionamentos da 10ª aplicação.....	157
10.2.11 Questionamentos da 11ª aplicação.....	161

<b>10.3 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema educação sexual .....</b>	<b>165</b>
10.3.1 Questionamentos da 1ª aplicação .....	165
10.3.2 Questionamentos da 2ª aplicação .....	168
10.3.3 Questionamentos da 3ª aplicação .....	174
10.3.4 Questionamentos da 4ª aplicação .....	182
10.3.5 Questionamentos da 5ª aplicação .....	189
10.3.6 Questionamentos da 6ª aplicação .....	197
10.3.7 Questionamentos da 7ª aplicação .....	204
10.3.8 Questionamentos da 8ª aplicação .....	212
10.3.9 Questionamentos da 9ª aplicação .....	219
10.3.10 Questionamentos da 10ª aplicação .....	227
10.3.11 Questionamentos da 11ª aplicação .....	236
<b>10.4 Avaliação realizada no Ergolist .....</b>	<b>245</b>
10.4.1. Critério Presteza .....	245
10.4.2. Critério Agrupamento/Distinção por Localização .....	246
10.4.3. Critério Agrupamento/Distinção por Formato .....	247
10.4.4. Critério Feedback Imediato .....	248
10.4.5 Critério. Legibilidade .....	249
10.4.6 Critério Concisão .....	251
10.4.7 Critério Ações Mínimas .....	253
10.4.8 Critério Densidade Informacional .....	253
10.4.9 Critério Ações Explícitas .....	254
10.4.10 Critério Controle do Usuário .....	254
10.4.11 Critério Flexibilidade .....	255
10.4.12 Critério Experiência do Usuário .....	255
10.4.13 Critério Proteção contra Erros .....	255
10.4.14 Critério Qualidade das Mensagens de Erros .....	256
10.4.15 Critério Correção de Erros .....	257
10.4.16 Critério Consistência .....	257
10.4.17 Critério Significado dos Códigos .....	258
10.4.18 Critério Compatibilidade .....	259



## LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Chatterbot Eliza.....	09
Figura 2.2 – Interface da Cybelle.....	11
Figura 2.3 – Interface de ALICE na Internet.....	12
Figura 3.1 – Palco de Conversação .....	17
Figura 3.2 – Arquitetura da ferramenta Autochatter.....	18
Figura 5.1 – Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema AIDS.....	24
Figura 5.2 – Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema AIDS.....	25
Figura 5.3 – Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema AIDS.....	26
Figura 5.4 – Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema AIDS.....	26
Figura 5.5 – Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema AIDS.....	27
Figura 5.6 – Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema AIDS.....	28
Figura 5.7 – Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema AIDS.....	28
Figura 5.8 – Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema AIDS.....	29
Figura 5.9 – Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema AIDS.....	30
Figura 5.10 – Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema AIDS.....	30
Figura 5.11 – Evolução dos resultados das aplicações COM o Thesaurus - AIDS.....	31
Figura 5.12 – Evolução dos resultados das aplicações SEM o Thesaurus - AIDS.....	32
Figura 5.13 – Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema DST.....	35
Figura 5.14 – Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema DST.....	36
Figura 5.15 – Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema DST.....	37
Figura 5.16 – Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema DST.....	37
Figura 5.17 – Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema DST.....	38
Figura 5.18 – Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema DST.....	39
Figura 5.19 – Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema DST.....	39
Figura 5.20 – Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema DST.....	40
Figura 5.21 – Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema DST.....	40
Figura 5.22 – Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema DST.....	41
Figura 5.23 – Evolução dos resultados das aplicações COM o Thesaurus - DST.....	42
Figura 5.24 – Evolução dos resultados das aplicações SEM o Thesaurus - DST.....	43
Figura 5.25 – Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema ES.....	46
Figura 5.26 – Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema ES.....	46

Figura 5.27 – Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema ES.....	47
Figura 5.28 – Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema ES.....	48
Figura 5.29 – Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema ES.....	48
Figura 5.30 – Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema ES.....	49
Figura 5.31 – Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema ES.....	50
Figura 5.32 – Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema ES.....	50
Figura 5.33 – Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema ES.....	51
Figura 5.34 – Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema ES.....	52
Figura 5.35 – Evolução dos resultados das aplicações COM o Thesaurus - ES.....	52
Figura 5.36 – Evolução dos resultados das aplicações SEM o Thesaurus - ES.....	53
Figura 6.1 – Distribuição de atores no Palco de conversação.....	62
Figura 6.2 – Visualizador de perguntas.....	63
Figura 6.3 – Visualizador de repertório.....	65
Figura 6.4 – Apresentação da questão no Visualizador de perguntas.....	65
Figura 6.5 – Pergunta alterada.....	65
Figura 6.6 – Gráfico demonstrativo do tempo de gravação x quantidade de perguntas .....	66
Figura 6.7 –Janela Carrega Repertório.....	67
Figura 6.8 – Qualidade das mensagens de erro.....	73

## LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Classificação dos chatterbots .....	6
Tabela 3.1 - Frase Original x Frase após o <i>stemming</i> .....	18
Tabela 5.1 - Perguntas x Radicais.....	33
Tabela 5.2- Perguntas existentes no repertório da 5ª aplicação.....	54
Tabela 5.3 - Perguntas/respostas de um repertório de testes .....	55
Tabela 5.4 - Perguntas/respostas incluídas no repertório de teste .....	57

## RESUMO

Essa dissertação propõe analisar a ferramenta de construção de *chatterbots* – *Autochatter* (AC), em seus aspectos técnicos e ergonômicos. O trabalho de avaliação como um todo foi realizado utilizando a metodologia de pesquisa experimental. Utilizou-se a ferramenta durante um pouco mais de três meses visando, através de sucessivas aplicações, avaliar a técnica de construção de *faqbots* baseada em palavras-chave x resposta a fim de detectar se o aumento da quantidade de questões no repertório traria resultados positivos para o *chatterbot*. Foram utilizadas como variáveis de controle o uso de um *thesaurus* e a implementação de três *chatterbots* com assunto de domínio com graus de abrangência diferentes, os quais foram AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e educação sexual (temas com pequena, média e grande abrangência respectivamente). Participaram da pesquisa, dezoito alunos do ensino médio, distribuídos em três grupos/tema, sendo cada grupo dividido em duas partes para análise da performance da ferramenta com e sem o uso do *thesaurus*. Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que o número de respostas corretas do *chatterbot* frente aos questionamentos do usuário, não está somente ligado à quantidade de questões catalogadas no repertório. O trabalho relata de forma clara os principais pontos a serem refinados no processo de funcionamento do AC (incluindo o aperfeiçoamento da rotina de *stemming* e do processo de formulação de respostas), de forma a adequar a ferramenta a processos de ensino/aprendizagem. Paralelamente à avaliação técnica, efetuou-se uma análise ergonômica baseada em observações durante o contínuo processo de atualização dos repertórios criados e das diversas aplicações realizadas pelos alunos. Sob este aspecto, foram observados a operacionalidade, falhas de interrupções/erros e performance. Por fim sugeriram-se melhorias baseadas nas análises efetuadas, incluindo desde o projeto de uma nova interface mais amigável e atraente ao usuário, como também modificações na ferramenta para otimizar as tarefas envolvidas no processo de criação do repertório do *chatterbot*.

*Palavras-chave: Chatterbot, ferramenta de autoria, ergonomia de software.*

## ABSTRACT

This dissertation proposes to analyze the construction tools of *chatterbots* – *Autochatter* (AC), in its technical and ergonomics aspects. The evaluation process was performed, as a whole, using the experimental research methodology. The tool was used during a little more than three months aiming, through successive applications, to evaluate the construction technique of *faqbots*, based in key words versus answers, with the purpose of detecting if the increase of quantity of questions would bring positive results to the *chatterbot*. It was used as control variable, a *thesaurus* and the implementation of three *chatterbots* with domain subjects in different levels covering subjects as AIDS, sexually transmitted diseases and sexual education (themes with small, medium and large extent respectively). The research was carried out with eighteen high school students, distributed in three groups/themes, each group was divided in two parts, in order to analyze the performance of the tool with and without the use of the *thesaurus*. The results obtained in the research show that the number of correct answers of the *chatterbot* in the face of the student's questionings is not solely related to the number of questions classified in the repertoire. The work gives a clear account of the main points to be refined in the functioning process of AC (including the improving of the *stemming* routine and of the formulation process of answers), in order to adjust the tool to the teaching/learning process. Together with the technical evaluation, an ergonomic analysis was done, based in observations during the continuous process of updating the repertoires created and of the different applications performed by the students. Under this aspect, were analyzed the operational performance, interruptions, flaws and the performance itself. Lastly, it was suggested some improvements based in the analysis produced, including not only a new interface project, friendlier to the user but also changes in the tool to optimize the tasks involved in the creation process of the *chatterbot* repertoire.

Keywords: Chatterbot, authoring tool, software ergonomics.

# 1. INTRODUÇÃO

Nas duas últimas décadas foram produzidos diversos filmes de ficção científica que projetavam para este novo milênio uma nova era de computadores. Estes teriam capacidade de raciocinar e tomar decisões baseadas em seu próprio conhecimento acumulado. Apesar dos computadores atuais resolverem tarefas complexas em frações de segundos, tais como cálculos matemáticos, animações gráficas, transmissões em tempo real, etc, atribui-se ao homem a capacidade de pensar, pois os computadores executam essas tarefas sem consciência do que estão fazendo. Entretanto, uma linha de pesquisadores há bastante tempo vem investindo no sentido de tornar as máquinas capazes de raciocinar, aprender, pensar, sentir, compreender, como seres humanos.

Este processo teve início em 1950, quando Alan Turing publicou o artigo “*Computing Machine and Intelligence*” onde afirmava que no momento que pudéssemos manter uma conversa com uma máquina, sem conseguirmos distinguir estar conversando com uma máquina ou com uma pessoa, poderíamos atribuir à máquina a noção de inteligência. Para tal, Turing propôs o jogo da imitação, que consistia em submeter um operador, fechado em uma sala, a descobrir se quem respondia suas perguntas, introduzidas através do teclado, era um outro homem ou uma máquina. Este jogo ficou conhecido como Teste de Turing<sup>1</sup>.

Após este fato, surgiu uma nova disciplina que ficou conhecida, a partir de 1956, por Inteligência Artificial (IA). A IA pode ser definida como<sup>2</sup>

“...uma coleção de técnicas suportadas por computador, emulando algumas capacidades dos seres humanos, tais como, resolução de problemas, visão e robótica, sistemas especialistas e aquisição de conhecimento, metodologias de representação do conhecimento e compreensão de linguagem natural.”

Esta última tem como objetivo principal capacitar um computador a manter uma conversação razoável com o usuário, isto é, uma conversa na qual problemas e proposições seriam expressos através de sentenças corretamente estruturadas, segundo os padrões da língua natural usada<sup>3</sup>. Aparentemente simples, o teste de Turing tem como obstáculo a complexidade

da linguagem natural, que apresenta um vocabulário com diferentes funções e significados em uma sentença, podendo também conter certas ambigüidades gramaticais que são inerentes à língua em questão. Surgiu então, um subconjunto de sistemas de Programação em Linguagem Natural (PLN) conhecidos como *chatbots*, os quais têm sido criados para povoar comunidades virtuais na Internet. Segundo Simon Laven (1996), “um *chattebot* é um programa que tenta simular uma conversação, com o objetivo de pelo menos temporariamente fazer um ser humano pensar que está conversando com outra pessoa”<sup>4</sup>.

A partir da publicação do artigo de Turing (1950), grandes foram os avanços no campo da IA e no processamento da linguagem natural, mas vale ressaltar que nenhum programa ainda conseguiu passar no teste de Turing.

O presente trabalho visa avaliar a ferramenta *Autochatter* (AC). O AC é uma ferramenta de autoria de *chatbots*, desenvolvida por um grupo de pesquisadores do Laboratório de Sistemas de Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (LSC). A ferramenta foi implementada na linguagem de programação *Smalltalk*, no ambiente de desenvolvimento Mundo dos Atores [Mariani, 1998], e constitui-se em um protótipo de uma ferramenta a ser usada no projeto CNPq-ProTem-CC “Museu virtual” [Wazlawick, 2001].

## 1.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem por objetivo a análise da ferramenta de autoria de *chatbots* – *Autochatter*, através da avaliação da técnica de construção de repertórios baseados em palavras-chave x respostas.

### 1.1.1 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos, o trabalho se propõe a:

- a) Analisar a eficiência dos *faqbots* de acordo com o grau de abrangência do assunto de domínio;

- b) Verificar o comportamento do *chatbot* com e sem o uso de um *thesaurus*;
- c) Observar como ocorre a interação entre o usuário e o programa, visando analisar a ergonomia da ferramenta;
- d) Propor melhorias para a ferramenta de acordo com as análises efetuadas.

## 1.2 Justificativa

Pierre Lévy (1993) enfatiza que a história das mídias evoluiu juntamente com a história da humanidade. Ele refere-se à oralidade, à escrita e à informática como tecnologias de inteligência associadas à memória e ao conhecimento. A oralidade era utilizada para estender nossa memória - as lendas, mitos e dados culturais eram ecoados de geração para geração. A escrita, apesar de ser uma técnica antiga, somente foi difundida na Europa nos séculos XVII e XVIII com o surgimento do livro no formato similar ao que temos atualmente. Essa técnica possibilitou que a memória fosse estendida de modo qualitativamente diferente em relação à oralidade, permitindo que a linearidade do raciocínio apareça. Essa técnica só ganhou destaque com acessibilidade de instrumentos como o papel, o lápis, entre outros. A informática proporcionou uma nova extensão de memória substituindo a linearidade da escrita pela descontinuidade, trazendo modos de pensar baseados na simulação, na experimentação e em uma “nova linguagem” que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea<sup>5</sup>. Segundo Tikhomirov (1981) *apud* RIPPER, os computadores reorganizam o pensamento – essa visão inclui a formulação e resolução de problemas e o julgamento de valor de como se usa um dado conhecimento<sup>6</sup>. Cabe ao educador, ver como a aprendizagem se constitui quando novos atores (informática) se fazem presentes em sua investigação.

Segundo Santos (1988) *apud* RIPPER,

“a escola parece cega, surda e muda às metamorfoses da percepção humana que a realidade tecnológica está provocando. A escola encara a formação da percepção, da sensibilidade e da subjetividade de seus alunos como se eles ainda se encontrassem no século XVIII antes da revolução industrial”<sup>6</sup>.



Lévy enfatiza que

“A principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens”<sup>7</sup>.

Segundo Teodoro,

“a introdução das tecnologias da informação na educação pode estar associada à mudança do modo como se aprende, à mudança das formas de interação entre quem aprende e quem ensina, à mudança do modo como se reflete sobre a natureza do conhecimento”<sup>8</sup>.

Para tal, as ferramentas de EAD (ensino aberto e a distância), entre elas hipermídias, redes de comunicações interativas, arquivos digitais, realidade virtual, devem ser inseridas no contexto da educação presencial, pois favorecem aprendizagens personalizadas e aprendizagens coletivas em rede<sup>9</sup>.

Olhando sobre o prisma desta nova faceta da educação, a inserção de computadores, como instrumento de indução de mudanças no processo de ensino-aprendizagem, leva a investigação e avaliação de ferramentas que favoreçam as metas acima expostas.

### **1.3 Estrutura do Trabalho**

O trabalho está estruturado em 9 capítulos como descrito abaixo.

No capítulo 2, encontra-se uma descrição da tecnologia dos *chatterbots*, relatando aspectos que vão desde conceito, classificação, aplicações e exemplos.

No capítulo seguinte, tem-se uma breve explanação sobre critérios que determinam a qualidade de uma ferramenta de autoria e a descrição da ferramenta de autoria de *chatterbots* utilizada na pesquisa – *Autochatter* (AC), onde mostram-se características de criação, funcionamento e utilidade.

O 4º capítulo aborda a definição da pesquisa, onde são expostos o contexto de seu desenvolvimento, as fases da pesquisa e a descrição da metodologia adotada.

O capítulo 5 detalha os resultados da pesquisa, fazendo uma exposição e análise dos fatos decorrentes do processo.

No capítulo 6, apresenta-se a análise de aspectos ergonômicos da ferramenta AC, avaliando a interface do programa, questões como performance e falhas e sugestões de melhorias.

No 7º capítulo encontram-se as conclusões finais do trabalho e sugestões de trabalhos futuros.

Finalizando, os capítulos 8 e 9 trazem as referências bibliográficas e a bibliografia complementar utilizadas para a elaboração deste trabalho.

## 2. CHATTERBOTS

### 2.1 O que é um *Chatterbot*

*Bot* é a abreviação da palavra *robot*, a qual foi usada pela primeira vez em 1921 na peça “R.U.R.” – Rossum’s Universal Robots – de Karel Capek com a idéia de um homem-máquina capaz de efetuar atividades humanas (*Robot* é uma palavra derivada do Tcheco *Robota* e significa trabalho)<sup>1</sup>.

*Chatterbots* são programas de computador que tentam simular conversações digitadas com os usuários, com o objetivo de pelo menos temporariamente fazer um ser humano pensar que esta conversando com outra pessoa. A complexidade de seus algoritmos é variável, mas em geral eles são programados para responder às entradas do usuário com declarações pré-estabelecidas. Deste modo, *chatterbots* podem ter uma conversação um pouco lógica com um usuário humano, até mesmo sem ter capacidade de compreensão<sup>10</sup>. Geralmente são utilizados para bater papo ou, em alguns casos, conversar sobre um assunto específico. Possuem a vantagem de estarem sempre disponíveis, podendo manter diferentes conversas com várias pessoas ao mesmo tempo<sup>1</sup>.

### 2.2 Classificações

Abaixo apresenta-se uma tabela representativa das diversas classificações dos *chatterbots*.

<b>Estilo</b>	<b>Característica</b>	<b>Área de Aplicação</b>
Clássicos	Capacidade de Aprender	Entretenimento
Complexos	Memória	Marketing
Amigáveis	Domínio	FAQs
Ensináveis	Robustez	Suporte ao Consumidor
	Autoconhecimento	Propósito Geral
		Ensino

**Tabela 2.1 - Classificação dos *chatterbots***

Segundo **Simon Laven**, podemos classificar os *chatbots*, quanto aos diferentes **estilos** em<sup>4</sup>:

**a) Clássicos**

Encontram-se nesta classe os *chatbots* pioneiros, tais como, *Eliza* e *Parry*.

**b) Complexos**

Possuem seu escopo de construção fundado em linguagens mais sofisticadas. Pode-se citar: *Alice*, *Brian* e *Hex*.

**c) Amigáveis**

Criados com características semelhantes a uma determinada personalidade. *Julia* e *Silvie* são alguns dos *chatbots* desta classe.

**d) Ensináveis**

Possuem capacidade de auto-aprendizagem, e não necessitam, a priori, de uma base de conhecimento completa. Encontram-se nesta categoria *MegaHal*, *Fred* e *Omnibot*.

Franklin e Graesser classificaram os *Bots* (Agentes) de conversação segundo determinadas características, dentre as quais:

**a) Capacidade de aprender**

Capacidade que o *chatbot* possui de aprender sobre o domínio e sobre o usuário durante um diálogo.

**b) Memória**

Capacidade de memorizar e recuperar diálogos e sentenças mencionados previamente em uma conversação.

**c) Domínio**

Alguns *chatbots* são classificados como especialistas por tratarem de um único assunto. Outros são generalistas, por conseguirem manter diálogos de assuntos diversos, sendo que alguns permitem que o usuário faça a escolha do tema a ser abordado.

**d) Robustez**

Capacidade de responder a sentenças do usuário não reconhecidas.

**e) Auto conhecimento**

Capacidade de falar sobre si mesmo<sup>11,12</sup>.

No artigo “*How to make a bot*” (Neuromedia 1999), encontra-se outra forma de classificar os *Bots*, de acordo com os vários usos comerciais.

**a) Entretenimento**

São aqueles que têm como característica principal a capacidade de divertir o usuário.

**b) Marketing**

São responsáveis por demonstrar produtos tentando despertar o interesse do usuário.

**c) FAQs (Frequent Asked Questions)**

Possuem a capacidade de responder a questionamentos simples e freqüentes de usuários sobre assuntos pertencentes à sua base de FAQs.

**d) Suporte ao Consumidor**

Destinados a dar suporte de atendimento a clientes. Funcionam de forma similar aos FAQs, porém interagem com o usuário cliente de modo a obter maiores informações sobre o problema, reduzindo comunicações desnecessárias entre o cliente e o pessoal de suporte.

**e) Propósito Geral**

Encontram-se nesta categoria os *chatterbots* especialistas ou aqueles voltados para uma atividade específica.

**f) Ensino (*Knowledgebots*)**

São classificados como *bots* de ensino aqueles *chatterbots* aplicados a situações de ensino/aprendizagem<sup>13</sup>.

## 2.3 Exemplos de *Chatterbots*

### 2.3.1. ELIZA

Criado por Joseph Weizenbaum em 1966, o programa *Eliza* é considerado o primeiro *chatterbot*. De estilo clássico, *Eliza* possui uma arquitetura simples, mas eficiente. Isto porque tenta imitar as características de um psicólogo Rogeriano, no qual a terapia objetiva fazer o paciente falar. Portanto, ao invés de responder qualquer questão, *Eliza* devolve a questão ao usuário fazendo refletir sobre emoções, problemas, etc... O programa *Eliza* utiliza um modelo de raciocínio baseado em casos (*Case-based Reasoning*) onde cria em dois passos uma resposta para cada entrada do usuário<sup>14</sup>. No primeiro passo, ele procura todas as palavras-chave que aparecem na entrada do usuário, e as ordena segundo um valor de importância pré-estabelecido. Para cada palavra-chave existe uma lista circular de possíveis respostas e um ponteiro que indica a próxima resposta. O segundo passo é um *script* que gera uma resposta para a palavra-chave de maior importância. Este *script* permite ainda passar parte da entrada para a resposta<sup>15</sup>.



Figura 2.1 - *Chatterbot Eliza*

O sucesso de *Eliza* deve-se ao fato de que o contexto no qual atua é limitado, tornando a conversação convincente. Apesar de não utilizar técnicas sofisticadas de programação de linguagem natural, este *chatterbot* influenciou a IA por décadas.

### 2.3.2. PARRY

Criado por Kenneth Colby em 1975, *Parry* simula um comportamento paranóico através do rastreamento do seu estado emocional. *Parry*, similarmente a *Eliza* não tem conhecimento de seu funcionamento, contudo apresenta em sua arquitetura um avanço sobre *Eliza*, já que estende sua implementação em vários aspectos. *Parry* mantém registro sobre toda a conversa passada e sobre seu atual estado mental. Seu modelo emocional foi projetado de forma a simular comportamentos de raiva, medo, desconfiança, etc. Em testes com psiquiatras, questionando três pacientes reais e o programa num jogo de imitação parecido com o teste de *Turing*, não houve distinção entre pacientes reais e o programa. (BALLARD & JONES, 1987 *apud* Laureano)<sup>13</sup>.

Vincent Cerf pesquisou o comportamento destes dois *chatbots* quando colocados para conversar entre eles. O resultado, porém, não trouxe nenhuma contribuição, pois ambos respondiam os questionamentos do outro apenas de forma superficial, levando a crer que somente as intervenções com humanos deixam as conversas mais interessantes<sup>15</sup>.

### 2.3.3. JÚLIA

Criado por Michael Mauldin tem como objetivo o auxílio a jogadores em um *TinyMUD* (mundo virtual composto por vários usuários controlando personagens. Jogado em rede através de terminais com clientes emulando ambientes através de interface de texto - ASCII). *Júlia* atua como personagem do jogo que interage com qualquer outro usuário do jogo, real ou virtual<sup>12</sup>.

A construção de *Júlia* foi feita utilizando um *Parser* simples, onde em cada frase são identificados padrões de palavras-chave e escolhida uma resposta ao padrão mais adequado. *Júlia* é um agente que possui conhecimentos e objetivos prévios, podendo adquirir novos conhecimentos e objetivos com a interação com outros agentes<sup>16</sup>.

Desde que *Júlia* foi projetada para os ambientes de MUD, ela vem superando as expectativas do nível de conversação que pode manter. Isto se deve ao fato de suas habilidades conversacionais serem derivadas de um módulo estruturado como uma rede de ativação de

respostas. Consiste em vários padrões com respostas associadas a um valor de ativação e este associado a cada nó contendo a resposta. Nesta rede, cada nó consiste de um conjunto de padrões, uma resposta simples, um nível de ativação, uma lista de nós estimulados e outra de nós inibidos. Quando o usuário menciona algum padrão específico, os nós que contêm o modelo têm sua ativação estimulada e dentre estes, o de maior nível de ativação é selecionado e a resposta pertencente a este nó é ecoada ao usuário<sup>14</sup>.

#### 2.3.4. CYBELLE

Criada por Alex Primo (concepção, *design* de interface, redação do cérebro) e Luciano Coelho (programação do mecanismo em *Perl*), a fim de mostrar a complexidade da linguagem humana. Este foi o primeiro *chatterbot* projetado para manter um diálogo em português.

Seu funcionamento segue o modelo de *ELIZA*, com palavras-chave e valores de importância, porém, no caso de múltiplas respostas possíveis o *chatterbot* faz uma seleção aleatória, ao invés de usar uma lista circular.

*Cybelle* apresenta uma personalidade depressiva e sonha em um dia ser mais humana. Sua aparência mostra-se atraente e foi inspirada no estilo dos desenhos animados japoneses (*mangá*)<sup>17</sup>.




Figura 2.2 - Interface da *Cybelle*



### 2.3.5. ALICE

*ALICE* (*Artificial Linguistic Internet Computer Entity*) é um *chatbot* criado na linguagem AIML (*Artificial Intelligence Markup Language*). Sua arquitetura é muito similar à de *Eliza*, o qual trabalha com raciocínio baseado em casos e padrões de modelos para realizar conversações convincentes<sup>14</sup>. Porém, sua base de conhecimento é maior e sua ferramenta permite que o *chatbot* se modifique, mesmo sem a presença do programador.

*ALICE* tem módulos de conversação categorizando os usuários por idade, gênero, localização geográfica e profissão. Além disso, *ALICE* guarda o nome do usuário e o tópico da conversação. Em seu cérebro foi incluído inteligência social e emocional, personalidade e afeto. A *Alice* pergunta e responde perguntas, atua como uma secretária que recorda as pessoas de compromissos, espalha fofocas e até mesmo conta mentiras<sup>10</sup>.




Figura 2.3 - Interface de *ALICE* na Internet

### 2.3.6. *MegaHAL*

O *bot MegaHal* foi desenvolvido por Jason Hutchens com o objetivo de vencer o concurso de *Loebner*. É de estilo ensinável, pois tem a capacidade de aprender novas respostas na interação com o usuário.

Sua construção baseou-se em dois modelos Hidden Markov (HMM) e um conjunto de palavras-chave<sup>18</sup>. Primeiro, o *bot* determina as palavras-chave que aparecem na entrada do usuário. Para todas as palavras-chave encontradas o *bot* constrói tantas respostas candidatas, quanto possíveis, em um determinado tempo. Aqui um modelo HMM serve para criar a parte que vai da palavra-chave até o início da resposta candidata e o outro HMM serve para criar a parte que inicia na palavra-chave e vai até o fim da frase. Depois é selecionada a resposta candidata que parece ser mais adequada, utilizando critérios como o número de palavras-chave encontradas, entre outras<sup>15</sup>.

### 2.3.7 – *ShallowRed*

*Shallowred* é um *faqbot* para informações de Marketing que foi criado com o sistema de autoria da NeuroStudio™. Age como um representante de vendas virtual. Seu funcionamento resume-se em guardar as últimas sentenças do diálogo com o usuário, podendo inclusive contextualizar algumas de suas características, aprendendo sobre ele através de *cookies* (arquivos com informações específicas sobre usuários, geralmente utilizados para personalizar páginas na Internet) localizados na máquina do usuário.

O *ShallowRed* consegue conversar muito bem sobre o seu domínio e demonstra ignorância quando questionado sobre assunto fora de seu conhecimento. A seleção de respostas é feita através de casamento de padrões: palavras-chave selecionadas a partir de cada questão são comparadas a uma lista interna de combinações de chaves que indexam as respostas<sup>13</sup>.

### 3. *AUTOCHATTER* – FERRAMENTA DE AUTORIA DE *CHATTERBOTS*

Andrade define ferramenta de autoria como:

“softwares que devem ser operados com facilidade, sem necessitar de profundos conhecimentos de programação, para usuários criarem seus próprios conteúdos, sem se adaptarem a sistemas fechados”<sup>19</sup>.

O *Autochatter* é uma ferramenta de autoria de *chatterbots* desenvolvida por um grupo de pesquisadores do Laboratório de Sistema de Conhecimento (LSC) da Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de permitir a criação de *chatterbots* por parte dos alunos, favorecendo o processo de aprendizagem de conteúdos específicos através da estruturação e reflexão sobre o conhecimento que deverá ser “ensinado” ao *chatterbot*.

A ferramenta foi implementada na linguagem de programação *Smalltalk*, no ambiente de desenvolvimento Mundo dos Atores [Mariani, 1998], e constitui-se em um protótipo de uma ferramenta a ser usada no projeto CNPq-ProTem-CC “Museu virtual” [WAZLAWICK, 2001].

#### 3.1. Apresentação dos Menus do *Autochatter*

A versão instalada do *Autochatter* apresentava 4 opções de menu descritas a seguir:

a) Menu Sobre

Exibe informações sobre a ferramenta e seus desenvolvedores.

b) Menu Repertório

Na ferramenta *AC* um repertório é constituído por um conjunto de frases de entrada (fornecidas pelo usuário), as frases de saída (respostas do *chatterbot* às frases de entrada do usuário) e os focos de assunto (ao qual estas frases podem ou não estar relacionadas).

Este menu apresenta opções para carregar repertório existente, editar repertório existente ou criar novo repertório. A opção Carregar Repertório Existente possibilita carregar um dicionário de frases/respostas no repertório do chatterbot. A opção Editar Repertório permite a atualização de um repertório já existente previamente carregado. A última opção, Criar Repertório Novo tem por finalidade a geração de um novo repertório a ser usado pelo chatterbot.

c) Menu Diálogo

Permite que o usuário tenha acesso a todo o diálogo mantido entre ele e o *chatterbot*.

d) Menu Conexão

No caso do *Autochatter* estar sendo usado em rede, possibilita a conexão com o servidor da aplicação<sup>20</sup>.

Além dos Menus, a ferramenta permite a utilização ou não de um *thesaurus*.

Uma outra característica desta versão é a presença de opções no palco a fim de avaliar o grau de satisfação da resposta apresentada pelo *chatterbot*. Estas opções aparecem após a questão do usuário ser respondida, e as alternativas são “plenamente satisfeito”, “parcialmente satisfeito” e “insatisfeito”.

### 3.2 Utilidade da ferramenta

O uso de *faqbots* na educação pode servir para auxiliar o aluno no aprendizado de determinados conceitos, utilizando-se de uma forma mais atrativa que a forma de *FAQ* tradicional. A interação com o robô buscando-se especificamente a informação desejada, exige do aluno uma participação mais ativa do que a leitura de um texto. Contudo, a construção do conhecimento não se dá através da interação passiva, onde os alunos fazem perguntas e obtêm respostas<sup>1</sup>. De acordo com SANTOS & GARCIA, “o uso da tecnologia de informática, no ensinar e no aprender, tem transformado significativamente os papéis dos atores em educação”<sup>21</sup>. Neste contexto, o aluno torna-se ator na construção de seu conhecimento através do uso da ferramenta de autoria de *chatterbot*. Ainda segundo SANTOS

& GARCIA, “o conhecimento na era da comunicação não é estático, pois nesta nada é definitivo e só ensina quem aprende<sup>21</sup>”.


Desta forma, a ferramenta de autoria proporciona ao usuário “ensinar” o *chatbot* sem ter que se envolver com técnicas complexas de programação, utilizando-se de linguagem natural para construção do mesmo.

### 3.3 Funcionamento

Ao iniciar a ferramenta uma caixa de mensagem é exibida, solicitando a identificação do usuário e em seguida é possível escolher se o diálogo que será mantido com o *chatbot* deverá ou não ser gravado.

A ferramenta constitui-se de um palco de conversação onde o usuário pode interagir com o *chatbot* através de texto, escrevendo seu questionamento em um campo de entrada e a resposta será exposta na tela, pelo *chatbot*. Vale ressaltar que é possível manter uma conversação de  $n$  usuários com o *bot*, através de uma rede de computadores. Neste caso, o diálogo ficará gravado no servidor.

Para conversar com o *chatbot*, o usuário deve, num primeiro passo, selecionar e carregar um repertório existente. Quando o usuário redige uma pergunta, o *chatbot* procura em sua base de conhecimento (repertório) a opção de resposta mais adequada à questão. Caso não encontre a resposta ao questionamento, o *bot* expressa: “ainda não tenho resposta para esta pergunta”. Após a resposta aparecer na tela, o usuário tem a possibilidade de avaliar o grau de satisfação da resposta apresentada pelo *chatbot*<sup>12,20,22</sup>.



**Figura 3.1 - Palco de conversação**

### 3.3.1- Criação do repertório

A ferramenta também permite ao usuário a criação de uma base de conhecimento. Para isto, a opção de menu Repertório apresenta o item criar novo repertório.

A base de conhecimento do *chatterbot* é formada por um conjunto de frases de entradas e respostas definido pelo usuário. As respostas podem ser definidas como uma resposta única, um conjunto de respostas em seqüência (respostas selecionadas de uma lista circular) ou um conjunto de respostas aleatórias (respostas selecionadas aleatoriamente).


As frases de entrada passam por um processo de retirada dos sufixos de palavras principais denominado *stemming*. Este processo baseia-se no algoritmo de Porter (1980), onde primeiramente são retiradas da frase as acentuações, letras maiúsculas, palavras da classe fechada (artigos, preposições, etc.), flexionadores e formadores verbais. Após esta etapa, as palavras restantes passam pelo *stemming* que deixa apenas o radical de cada palavra. Estes radicais são guardados na base de conhecimento do *chatterbot* associados ao conjunto de respostas definido pelo usuário<sup>12,22</sup>.

Frase original	Frase após o stemming
O que é HIV?	que hiv
Como ocorre o contágio da AIDS?	como ocorr contági aids
A mulher pode transmitir o HIV para o homem?	mulh pod transm hiv hom
Quais os sintomas do herpes genital?	quais sintom herp genit

**Tabela 3.1 - Frase Original x Frase após o stemming**

Assim, quando o usuário faz uma pergunta ao *chatbot*, a ferramenta efetua o processamento do *stemming* que deixa apenas os radicais das palavras principais da questão. Esses radicais são comparados com os radicais da base de conhecimento, a fim de identificar a entrada com maior número de radicais coincidentes e em seguida expor a resposta associada ao usuário. Caso exista mais de uma resposta para a questão formulada pelo usuário, o *chatbot* seleciona uma das respostas com base no método de seleção (circular ou aleatório) identificada pelo autor do repertório em tempo de criação do mesmo.

A figura 3.2 mostra a arquitetura de funcionamento da ferramenta AC<sup>12</sup>.



**Figura 3.2 - Arquitetura da ferramenta Autochatter**

### 3.3.2 Focos de Assunto

A base de conhecimento pode ser dividida em focos de assunto apresentados em uma janela para a visualização do dicionário de cada nível (em *Smalltalk*, um “dicionário” é uma estrutura de dados que permite associar um objeto “chave” a um “valor”. No caso, são associados conjuntos de seqüências de palavras-chave como “chave” e uma lista de frases resposta como “valor”). A partir da raiz da base de conhecimento - o nível de foco de assunto inicial - é possível atribuir uma mudança de estado de foco para uma associação frase/resposta do *chatbot*.

O objetivo da utilização dos focos de assunto é promover o diálogo ativo por parte do *chatbot*, onde este deixa de atuar como um *faqbot* - apenas respondendo às questões do usuário - e passa a conduzir o diálogo, instigando a conversação sobre um determinado assunto dentro de sua base de conhecimento.<sup>22</sup>

### 3.4 Thesaurus

O *thesaurus* é uma ferramenta complementar que tem por objetivo identificar similaridades entre radicais pertencentes a um conjunto de perguntas (respostas) de uma mesma resposta (pergunta). Assim, as perguntas e respostas únicas são desconsideradas neste processo<sup>12</sup>.

O funcionamento do *thesaurus* baseia-se na seguinte hipótese: se para cada ocorrência de um radical numa pergunta (resposta), encontra-se uma ocorrência de um outro radical numa outra pergunta (resposta) do mesmo conjunto de perguntas (numa outra frase da mesma resposta), então o significado desses radicais deve ser similar (isto é somente uma hipótese que nem sempre é verdadeira)<sup>23</sup>.

Portanto, para utilizar o *thesaurus* é preciso que o repertório possua várias frases de entrada (perguntas) para uma frase de saída (resposta), já que ele trabalha com similaridades entre palavras do conjunto de frases de entrada e do conjunto das frases de saída.



## 4. METODOLOGIA DA PESQUISA

### 4.1 Contexto da pesquisa

A pesquisa realizada para avaliação da ferramenta *Autochatter* teve como tema aplicado o “Estudo da Educação Sexual”. De forma a permitir análise do *chatbot* de acordo com a abrangência do assunto de domínio, subdividiu-se o tema em: AIDS, Doenças Sexualmente transmissíveis (DSTs) e Educação Sexual (ES).

Participaram da pesquisa 18 alunos de ensino médio, os quais foram distribuídos entre os temas. Optou-se por esta temática por se tratar de um assunto atraente para adolescentes e de bastante interesse escolar e social.

### 4.2 Metodologia

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como experimental. De acordo com GIL (1991) *apud* SILVA, fica caracterizada esta forma de pesquisa “quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto<sup>24</sup>”.

Assim, determinou-se para análise da ferramenta *autochatter* critérios que poderiam influenciar na avaliação, como abrangência do assunto de domínio e uso de um *thesaurus*.

Por outro lado, a ferramenta será usada em um contexto educacional. Portanto, é de fundamental importância que a ferramenta tenha uma ergonomia adaptada ao usuário, possibilitando o uso com o máximo de conforto, segurança e eficácia pelo maior número de pessoas.

Segundo Galvis *apud* SILVA (1992),

“...a interface é a zona de comunicação em que se realiza a interação entre o usuário e o programa. Nela estão contidos os tipos de mensagens compreensíveis pelos usuários (verbais, icônicas, pictóricas ou sonoras) e pelo programa (verbais, gráficas, sinais elétricos e outras), os dispositivos de entrada e saída de dados que estão disponíveis para a troca de mensagens (teclado, mouse, tela do monitor, microfone) e ainda as zonas de comunicação habilitadas em cada dispositivo (as teclas no teclado, os menus no monitor, barras de tarefas, área de trabalho)”<sup>25</sup>.

De forma a permitir uma análise sobre a ergonomia do AC, utilizou-se uma técnica de avaliação preditiva/analítica, a qual busca prever erros de projeto de interface sem a participação direta do usuário. Para tal, fez-se o uso de Checklists que são "ferramentas para avaliação da qualidade ergonômica de um software que se caracteriza pela verificação da conformidade da interface de um sistema interativo com recomendações ergonômicas provenientes de pesquisas aplicadas."<sup>26</sup>

O modelo de Checklists adotado, bem como, detalhes sobre a avaliação ergonômica da ferramenta, encontram-se no capítulo 6.

### **4.3 Fases da pesquisa**

A primeira etapa da experiência iniciou-se em Abril de 2002. A princípio foi exposto a todos os grupos em que consiste o trabalho e qual deveria ser a participação dos integrantes dos grupos. Cada aluno fez inicialmente 5 questões sobre o seu tema, tendo ao final desta etapa 30 questões / tema para serem acrescentadas a diferentes repertórios. O *thesaurus* foi usado em 50% de cada grupo, a fim de que fosse realizada uma avaliação da diferença de performance da ferramenta com e sem este item.

Após a primeira etapa foi criado um repertório para cada tema com as perguntas dos alunos e as respostas alimentadas por um especialista no assunto.

A segunda etapa iniciou com a entrega aos alunos das perguntas feitas por eles na etapa anterior, já respondidas. Foi então solicitada à turma a inclusão de cinco novas perguntas já com o uso do repertório criado. Um gráfico foi projetado para acompanhar a evolução das respostas com e sem *thesaurus*. Essas etapas se repetiram *n* vezes para cada grupo.

A terceira etapa consistiu da avaliação dos resultados obtidos nas fases anteriores, bem como, sugestões de melhorias para a ferramenta AC.

## 5. RESULTADOS DA PESQUISA

### 5.1 Considerações Iniciais

Para avaliação da ferramenta *Autochatter* utilizou-se como tema aplicado o “Estudo da Educação Sexual”. Este tema foi subdividido em AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e Educação Sexual, de forma a permitir analisar o *chatterbot* de acordo com a abrangência do assunto de domínio. Nesta pesquisa pretende-se mostrar:

- a) se existe uma relação entre o número de questões do repertório versus a quantidade de acertos do *chatterbot*
- b) se o uso do *thesaurus* possibilita um acréscimo do desempenho da ferramenta

Participaram da pesquisa, 18 alunos de ensino médio, sendo alocados seis alunos para cada tema. Em cada grupo, 50% fizeram uso do *thesaurus* a fim de que se pudesse avaliar a diferença de performance da ferramenta com e sem este item. A princípio foi exposto a todos os grupos em que consistia o trabalho e qual deveria ser a participação dos integrantes dos grupos. Foi solicitado que cada aluno fizesse inicialmente 5 questões sobre o seu tema, tendo ao final desta etapa 30 questões / tema para serem acrescentadas a diferentes repertórios. Após esta etapa foi criado um repertório para cada tema com as perguntas dos alunos e as respostas alimentadas por um especialista no assunto. Iniciou-se a segunda etapa com a entrega aos alunos das perguntas feitas por eles na etapa anterior, já respondidas. Solicitou-se à turma a inclusão de cinco novas perguntas. Como já contavam com o repertório criado, solicitou-se que todos carregassem primeiramente o repertório. Essas etapas se repetiram 11 vezes para cada grupo, sendo os resultados descritos abaixo.

### 5.2. Apresentação e análise dos resultados obtidos


#### 5.2.1 Aplicação do tema AIDS

A primeira aplicação foi realizada no dia 12 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP. Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre AIDS. Iniciou-se a construção do primeiro

repertório, com trinta perguntas a serem cadastradas. Como ainda não havia um repertório previamente criado, o *chatterbot* respondeu para todos os questionamentos “Ainda não tenho resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas as respostas foram computadas como “Insatisfeito”.

A segunda aplicação aconteceu no dia 15 de abril. Os alunos participantes receberam na forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não fizessem as mesmas perguntas ao *chatterbot*. Novamente foram cadastradas cinco perguntas por cada aluno. Nesta segunda aplicação já surgiram algumas mudanças com relação aos resultados obtidos, conforme a figura 5.1 abaixo.

2ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	0	2
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	14	13



**Figura 5.1 - Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema AIDS**

Em 18 de abril deu-se início à terceira aplicação, com um repertório de 62 questões. O esquema de trabalho se manteve o mesmo, ou seja, cada aluno cadastrou mais cinco perguntas, sendo os resultados obtidos mostrados na figura 5.2, a seguir.

3ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	1	3
<i>Parcialmente satisfeito</i>	0	2
<i>Insatisfeito</i>	14	10




Figura 5.2 - Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema AIDS

Neste estágio, pudemos observar que as aplicações SEM *thesaurus* obtiveram melhores resultados do que as COM *thesaurus*.

Em 22 de abril, efetuamos a 4ª aplicação, com um repertório de 88 questões cadastradas e analisando os resultados abaixo (figura 5.3), concluímos que tanto nas aplicações COM ou SEM *thesaurus* ainda atingiam níveis de 80% de insatisfação. Em relação à aplicação anterior, houve uma pequena melhora no desempenho da ferramenta COM o *thesaurus*, porém ocorreu uma queda do desempenho da ferramenta SEM o uso do *thesaurus*.

4ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	2	2
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	12	13




Figura 5.3 - Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema AIDS

Dia 29 deste mesmo mês, partiu-se para mais uma aplicação. Com um repertório já com 113 perguntas cadastradas, as aplicações COM *thesaurus* refletiram uma melhora, regredindo o nível de insatisfação para 53%. Ainda assim, o percentual de respostas “Plenamente Satisfeito” atingiu níveis que não superavam 27%. Na aplicação SEM *thesaurus*, o nível de insatisfação é alto (73%) – (Figura 5.4).

5ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	4	2
<i>Parcialmente satisfeito</i>	3	2
<i>Insatisfeito</i>	8	11




Figura 5.4 - Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema AIDS

A 6ª aplicação foi realizada em 6 de maio, contando com um repertório de 136 perguntas. Observou-se que o resultado de insatisfação SEM *thesaurus* manteve-se inalterado comparado com a aplicação anterior, ou seja, 73%. Porém, o resultado COM *thesaurus* que na aplicação anterior atingia um nível de regressão de 53% com relação ao grau de insatisfação, subiu novamente para 73%. Analisando sob a ótica das respostas “Plenamente Satisfeito”, a aplicação SEM *thesaurus* conseguiu obter resultado melhor do que COM *thesaurus* (27% contra 20%) – (Figura 5.5).

6ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito	3	4
Parcialmente satisfeito	1	0
Insatisfeito	11	11





Figura 5.5 - Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema AIDS

A 7ª aplicação foi realizada em 13 de maio com um repertório de 160 questões e, conforme se pode observar no gráfico abaixo, apesar do repertório vir aumentando em aproximadamente 30 perguntas por aplicação, o resultado final COM e SEM *thesaurus* permanece inalterado (Figura 5.6).




<b>7ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente satisfeito</i>	2	3
<i>Parcialmente satisfeito</i>	2	2
<i>Insatisfeito</i>	11	10



**Figura 5.6 - Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema AIDS**

A 8ª aplicação foi realizada em 20 de maio com um repertório de 184 questões e o cenário de respostas insatisfatórias permanece ainda na faixa de 2/3 das questões. Considerando o universo com apenas o 1/3 das questões restantes, observa-se que quase 100% das respostas COM e SEM *thesaurus* concentraram-se na faixa do “Plenamente satisfeito” (Figura 5.7).


<b>8ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente satisfeito</i>	5	6
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	9	9



**Figura 5.7 - Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema AIDS**

A 9ª aplicação ocorreu em 27 de maio e conforme se pode observar na figura 5.8 abaixo, os resultados mantiveram-se praticamente inalterados com relação à aplicação anterior. O repertório utilizado era de 204 questões.

9ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	4	5
<i>Parcialmente satisfeito</i>	2	0
<i>Insatisfeito</i>	9	10




**Figura 5.8 - Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema AIDS**

A 10ª aplicação ocorreu no dia 14 de junho com um repertório de 220 questões. As respostas avaliadas nas aplicações COM *thesaurus* tiveram uma melhora significativa em relação à aplicação anterior, passando de 27% para 53% as respostas avaliadas como “Plenamente Satisfeito”, de 60% para 40% as respostas avaliadas como “Insatisfeito” (Figura 5.9).

As aplicações SEM *thesaurus* mantiveram-se com 33% de respostas “Plenamente Satisfeito”, contudo, as respostas avaliadas como “Insatisfeito” passaram de 67% para 47% (Figura 5.9).


10ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	8	5
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	1	3
<i>Insatisfeito</i>	6	7



**Figura 5.9 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema AIDS**

A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto e conforme se observa no gráfico abaixo, nas aplicações COM *thesaurus* as respostas “Plenamente satisfeito” atingiram o nível de 66,7% e as respostas “Insatisfeito” chegaram a 33,3%. As aplicações SEM *thesaurus* chegaram a 73,3% de satisfação e 20% apenas de insatisfação (Figura 5.10).

11ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	10	11
<i>Parcialmente satisfeito</i>	0	1
<i>Insatisfeito</i>	5	3



**Figura 5.10 - Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema AIDS**

### 5.2.1.1 Análise final - tema AIDS

Nas aplicações com o uso do *thesaurus*, observa-se que os resultados obtidos da 2ª a 4ª aplicação mostraram uma regressão do grau de insatisfação das respostas obtidas e em paralelo um crescimento das respostas “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”. A 5ª aplicação, em particular, mostra-se como uma exceção das aplicações, registrando uma queda abrupta no gráfico das questões avaliadas como “Insatisfeito” e causando uma sensível melhora nos resultados obtidos como “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”. O cenário volta a se estabilizar na 6ª e 7ª aplicações, demonstrando que os resultados obtidos na 5ª aplicação foram ocasionais. A partir da 8ª aplicação, observam-se a queda gradativa das respostas “Insatisfeito” e o conseqüente crescimento das respostas “Plenamente Satisfeito”, chegando a atingir na 11ª aplicação o patamar de 66,7% de respostas “Plenamente Satisfeito”, contra apenas 33,3% de respostas “Insatisfeito” (Figura 5.11).

		Aplicações									
COM Thesaurus		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
Plenamente satisfeito		0	1	2	4	3	2	5	4	8	10
Parcialmente satisfeito		1	0	1	3	1	2	1	2	1	0
Insatisfeito		14	14	12	8	11	11	9	9	6	5




Figura 5.11 - Evolução dos resultados das aplicações realizadas COM o uso do *Thesaurus* - AIDS

Nas aplicações sem o uso do *thesaurus* observam-se regularidade na queda do grau de insatisfação e crescimento gradativo das respostas “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”, sendo que na 11ª aplicação as respostas “Plenamente Satisfeito” atingiram os níveis mais altos chegando a 73,3% contra apenas 20% de insatisfação (Figura 5.12).

Aplicações										
SEM Thesaurus	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	10 <sup>a</sup>	11 <sup>a</sup>
Plenamente satisfeito	2	3	2	2	4	3	6	5	5	11
Parcialmente satisfeito	0	2	0	2	0	2	0	0	3	1
Insatisfeito	13	10	13	11	11	10	9	10	7	3




Figura 5.12 - Evolução dos resultados das aplicações realizadas sem o uso do *Thesaurus* - AIDS

Avaliando a evolução das aplicações, não se observaram grandes mudanças tanto com o uso do recurso *thesaurus* quanto sem o uso deste recurso, pois em ambos os casos, o grau de insatisfação foi bastante alto. Nas aplicações COM o uso do *thesaurus*, observa-se que a partir da 8ª aplicação a curva de respostas “Plenamente Satisfeito” ganha tendência de ascendência. Nas aplicações SEM o uso do *thesaurus* a queda da ascendência do grau de Insatisfação somente começa a se desenhar na 10ª aplicação enquanto que a curva das respostas “Plenamente Satisfeito” começa a ganhar o sentido positivo somente a partir da 8ª aplicação.

Na avaliação deste tema de pequena abrangência, poder-se-ia concluir, observando somente as figuras acima apresentadas, que a medida que cresce o número de questões do repertório, aumenta a quantidade de respostas corretas. Não se observaram melhorias significativas quando a ferramenta AC foi utilizada com o uso do *thesaurus*. Por outro lado, ao analisar o banco de questões e respostas fornecidas pelo *chatterbot*, observaram-se *n* casos em que o *chatterbot* não foi eficiente no fornecimento da resposta correta, mesmo quando no repertório já existia uma pergunta similar à efetuada pelo usuário conforme se pode constatar nos exemplos abaixo:

Trecho de um diálogo ocorrido na 5ª aplicação.

Pergunta: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca?

Resposta: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação: Insatisfeito

No exemplo acima, a pergunta referente à transmissão da AIDS através do beijo na boca deveria ter sido associada à perguntas similares, que já faziam parte do repertório, como “Beijo na boca é um meio de transmissão do vírus HIV?” e “Beijo na boca pode passar o vírus?”. No entanto, durante a execução do *stemming* foram relacionados como equivalentes apenas os radicais da palavra boca e beijo. O substantivo transmissão e o verbo transmitir, apesar de serem palavras derivadas, não foram consideradas no processo, por possuírem radicais diferentes (transmitir = transmit e transmissão = transmissã). A resposta apresentada ao usuário refere-se à questão “Que teste deve um indivíduo fazer para detectar se ele tem ou não o HIV?”, onde também havia apenas dois radicais coincidentes.

Trecho de um diálogo ocorrido na 11ª aplicação

Pergunta: Podemos pegar aids durante uma doação de sangue?

Resposta: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe, mas é de menos que 1 para cada 50.000 transfusões. Esse risco se deve à existência da “janela imunológica”, ou seja, o tempo entre a infecção e a positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três meses).

Avaliação: Insatisfeito.

Neste exemplo, o *chatbot* possuía no repertório as opções mostradas na tabela 5.1, abaixo:

Perguntas	Radicais
Podemos pegar AIDS através de uma transfusão de sangue?	podem peg aids transfusã sangu
Uma pessoa pode pegar AIDS doando sangue?	peesso pod peg aids doand sangu

**Tabela 5.1 - Perguntas x Radicais**

Comparando-se com a raiz da pergunta do usuário (podem peg aids doaçã sangu), a resposta escolhida, sob a ótica do *stemming*, está correta por apresentar quatro radicais coincidentes contra três da segunda pergunta da tabela. Porém, como se observa acima, na obtenção do radical do verbo poder conjugado na 1ª pessoa do plural (podemos), o *stemming* retornou como resultado “podem”, enquanto que na obtenção do radical do mesmo verbo, mas na 3ª pessoa do singular, foi obtido como resultado “pod”, apesar de estarem no mesmo tempo verbal e de se tratar de um verbo que, no presente do indicativo, só se apresenta irregular na 1ª pessoa do singular.

Outro aspecto que vale ressaltar é novamente a presença de palavras derivadas, tais como o substantivo doação e o verbo doar.

Sendo assim, retifica-se a conclusão anterior, pois na verdade poderiam ter-se obtido melhores resultados com o *chatbot* se o processo de seleção de respostas (*stemming*) fosse aperfeiçoado. Logo, seria possível obter um nível de acertos maior mesmo com um repertório contando com uma quantidade menor de questões.


Sugere-se um estudo mais aprofundado da língua portuguesa de forma a se obterem métodos mais eficientes de extração de radicais e também avaliar a possibilidade de se considerar palavras derivadas com radicais equivalentes.

### 5.2.2 Aplicação do tema Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)

A primeira aplicação foi realizada no dia 12 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP – Centro de Serviços Educacionais do Pará. Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre DST. Iniciou-se a construção do primeiro repertório com trinta e três perguntas a serem cadastradas. Como ainda não havia um repertório previamente criado, o *chatbot* respondeu para todos os questionamentos “Ainda não tenho resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas as respostas foram computadas como “Insatisfeito”.

A segunda aplicação aconteceu no dia 15 de abril. Os alunos participantes receberam na forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não fizessem as mesmas perguntas ao *chatterbot*. Novamente foram cadastradas cinco perguntas por cada aluno. Nesta segunda aplicação já surgiram algumas mudanças com relação aos resultados obtidos, conforme descrito abaixo, na figura 5.13..

<b>2ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>Sem Thesaurus</b>
<i>Plenamente Satisfeito</i>	2	3
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	0	1
<i>Insatisfeito</i>	13	11




**Figura 5.13 - Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema DST**

Em 22 de abril, deu-se início à terceira aplicação, com um repertório de 60 perguntas/respostas. Os resultados obtidos estão expostos na tabela 5.14, a seguir:



3ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	6	3
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	2	1
<i>Insatisfeito</i>	7	11




**Figura 5.14 - Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema DST**

Nesta fase, a aplicação COM *thesaurus* obteve um aumento de 13% para 40% em relação às respostas “Plenamente satisfeito” e um declínio de 87% para 47% das respostas “Insatisfeito”. Na aplicação SEM *thesaurus* não se observaram modificações.

Em 06 de maio efetuou-se a 4ª aplicação, com repertório de 85 questões cadastradas. Analisando os resultados abaixo, concluiu-se que tanto nas aplicações COM ou SEM *thesaurus* atingiram níveis superiores a 80% de insatisfação (93% COM *thesaurus* e 80% SEM *thesaurus*) – (Figura 5.15).


4ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	1	3
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	0	0
<i>Insatisfeito</i>	14	12



**Figura 5.15 - Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema DST**

Dia 13 de maio, partiu-se para mais uma aplicação. Com repertório já com 111 perguntas cadastradas, as aplicações SEM *thesaurus* refletiram uma pequena melhoria, regredindo o nível de insatisfação de 80% para 60%, enquanto que o percentual de respostas “Plenamente Satisfeito” atingia níveis de 40% contra 20% da aplicação anterior. Na aplicação COM *thesaurus*, o nível de insatisfação ainda é alto (87%) – (Figura 5.16).


5ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	1	6
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	13	9



**Figura 5.16 -- Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema DST**

A 6ª aplicação foi realizada em 20 de maio, contando com um repertório de 134 perguntas. Observou-se que o resultado de insatisfação SEM *thesaurus* manteve-se praticamente inalterado, comparado com a aplicação anterior, variando de 60% para 67%. Porém, o resultado COM *thesaurus*, que na aplicação anterior atingia um nível de satisfação de 7%, aumentou para 20% (Figura 5.17).

6ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	3	5
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	0	0
<i>Insatisfeito</i>	12	10



**Figura 5.17 - Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema DST**

Com 156 questões no repertório, a 7ª aplicação iniciou-se dia 07 de junho e apresentou uma diminuição de respostas “Insatisfeito” e aumento das respostas “Plenamente Satisfeito”, tanto nas aplicações COM e SEM *thesaurus*, conforme a figura 5.18 abaixo:

7ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	4	6
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	2
<i>Insatisfeito</i>	10	7




Figura 5.18 - Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema DST

A 8ª aplicação ocorreu no dia 14 de junho e contava com um repertório de 177 questões cadastradas. As aplicações COM *thesaurus* passaram de 27% para 40% nas respostas “Plenamente satisfeito” e de 67% para 53% nas respostas “Insatisfeito”. As aplicações SEM *thesaurus* apresentaram resultados piores em relação à 7ª aplicação (Figura 5.19).

8ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	6	5
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	8	10




Figura 5.19 - Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema DST

A 9ª aplicação foi realizada no dia 21 de junho. O repertório contava com 197 questões. Novamente as aplicações COM *thesaurus* apresentaram melhoras e as SEM *thesaurus* voltaram a progredir. Os resultados podem ser observados abaixo (Figura 5.20):

9ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	10	7
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	0
<i>Insatisfeito</i>	4	8




Figura 5.20 - Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema DST

A 10ª aplicação aconteceu em 27 de junho, com um repertório de 211 questões. Conforme se observa na figura 5.21, os resultados mais uma vez regrediram.

10ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	6	6
<i>Parcialmente satisfeito</i>	2	1
<i>Insatisfeito</i>	7	8




Figura 5.21 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema DST

A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto com um repertório de 232 questões. Os resultados das aplicações COM e SEM *thesaurus* obtiveram melhoras em relação à aplicação anterior, conforme se observa abaixo (Figura 5.22):

11ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito	9	8
Parcialmente satisfeito	1	0
Insatisfeito	5	7




Figura 5.22 - Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema DST

#### 5.2.2.1 Análise final - tema DST

Na avaliação COM *thesaurus*, observa-se uma queda abrupta do nível de insatisfação na 3ª aplicação (e a subida da quantidade de respostas “Plenamente Satisfeito”). A 4ª aplicação praticamente repete os mesmos resultados obtidos na 2ª aplicação. A partir da 5ª aplicação ocorre uma queda constante das respostas avaliadas como “Insatisfeito” até a 9ª aplicação (onde alcançou um nível de insatisfação de 26,67%), voltando subir na 10ª aplicação (retornou para 46,67%) e caindo em seguida na 11ª aplicação (33,3%) demonstrando que o processo ainda está instável (Figura 5.23).

Aplicações										
COM Thesaurus	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	10 <sup>a</sup>	11 <sup>a</sup>
Plenamente satisfeito	2	6	1	1	3	4	6	10	6	9
Parcialmente satisfeito	0	2	0	1	0	1	1	1	2	1
Insatisfeito	13	7	14	13	12	10	8	4	7	5




Figura 5.23 - Evolução dos resultados das aplicações COM *thesaurus* – DST

Nas avaliações sem o uso do *thesaurus*, observa-se que da 2ª a 6ª avaliação, não houve mudança significativa na quantidade de respostas Insatisfeito. Na 7ª aplicação a quantidade de respostas “Insatisfeito” cai ao nível mais baixo, porém logo em seguida, esta volta a subir, mantendo-se no patamar dos 53%. Da 2ª a 4ª avaliação, as respostas “Plenamente satisfeito” mantiveram-se constantes no patamar dos 20%. A partir da 5ª aplicação as respostas “Plenamente satisfeito” variaram de 33% a 40%, tendo atingido o nível mais alto na 9ª aplicação quando atingiu 47%. Ao longo das 10 aplicações, a quantidade de respostas “Plenamente satisfeito” não conseguiu em nenhum momento ser superior às avaliadas como “Insatisfeito”.

Aplicações										
SEM Thesaurus	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	10 <sup>a</sup>	11 <sup>a</sup>
Plenamente satisfeito	3	3	3	6	5	6	5	7	6	8
Parcialmente satisfeito	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0
Insatisfeito	11	11	12	9	10	7	10	8	8	7




Figura 5.24 - Evolução dos resultados das aplicações SEM *thesaurus* – DST

Um dado interessante nesta aplicação em cima de um tema de média abrangência é que menos de 4% das respostas concentraram-se na faixa do “Parcialmente satisfeito”. Tal como no primeiro tema apresentado (AIDS), observou-se que o *chatbot* não conseguiu atingir níveis razoáveis de respostas “Plenamente satisfeito”.

Vale ressaltar que as respostas dadas neste tema (DST) foram respostas completas, procurando abranger o máximo sobre o assunto questionado, enquanto que no tema anterior (AIDS) as respostas se limitavam a responder o questionamento do usuário, conforme os exemplos abaixo:

Pergunta: O que é granuloma venéreo?

Resposta: A donovanose é uma doença crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente causador é a bactéria *Calymmatobacterium granulomatis*. Tem período de incubação de 30 dias a 6 meses. É mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possa haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada, a doença pode causar deformidades genitais,



elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman.

As respostas aos questionamentos o que é, os sintomas, os meios de transmissão, o tratamento, os exames, as complicações do granuloma venéreo foram todas registradas numa única resposta. Desta forma, quando o usuário efetua uma outra pergunta sobre o tema granuloma venéreo, por exemplo, Quais os sintomas do granuloma venéreo? Se o AC apresentar esta resposta, o usuário avaliará a resposta como satisfeito.

Pergunta: Quais os sintomas da AIDS?

Resposta: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal.

A resposta apresentada responde única e exclusivamente ao questionamento do usuário. Caso posteriormente uma questão como “Quando aparecem os primeiros sintomas da AIDS?” e o AC apresentasse a resposta acima, esta não atenderia ao usuário, aumentando a estatística das respostas “Insatisfeito”.

Na segunda aplicação do tema DST, observa-se o seguinte questionamento do usuário:

Pergunta: Quais os sintomas do herpes genital?

Resposta: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal-estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem.

O usuário classificou a resposta como “Plenamente satisfeito”. Esta, no entanto, trata dos sintomas da sífilis. Isto demonstra que o autor do repertório deve ter um cuidado maior na redação de suas respostas.

Uma opção para amenizar este problema seria que o *chatterbot* já trouxesse em sua estrutura de resposta padrão, as perguntas sem o pronome ou com mudança do estado verbal. Por exemplo, a pergunta acima “Quais são os sintomas do herpes genital?” apresentaria em sua estrutura de resposta “Os sintomas do herpes genital são...”. Outro exemplo: “Quem descobriu o Brasil ?” teria em sua estrutura de resposta: “O Brasil foi descoberto por...”


### 5.2.3. Aplicação do tema Educação Sexual

A primeira aplicação foi realizada no dia 29 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP – Centro de Serviços Educacionais do Pará. Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre Educação Sexual (ES). Avaliando os resultados parciais das aplicações dos temas anteriores, onde o grau de satisfação era baixo e variável, modificou-se a metodologia de trabalho, ou seja, neste grupo, solicitou-se que todos os alunos usassem o *thesaurus* e posteriormente, as mesmas perguntas foram aplicadas sem o *thesaurus*. Outro diferencial em relação às pesquisas acima foi a cronometragem do tempo de gravação, pois se percebeu que com o crescimento do número de perguntas, o tempo de gravação também crescia.

Iniciou-se a construção do primeiro repertório com trinta perguntas a serem cadastradas. Como ainda não havia um repertório previamente criado, o *chatterbot* respondeu para todos os questionamentos “Ainda não tenho resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas as respostas foram computadas como “Insatisfeito”.

A segunda aplicação aconteceu no dia 06 de maio. Os alunos participantes receberam na forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não fizessem as mesmas perguntas ao *chatterbot*. Novamente foram cadastradas cinco perguntas por cada aluno. As mudanças apresentadas estão representadas abaixo (Figura 5.25).


<b>2ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente satisfeito</i>	3	3
<i>Parcialmente satisfeito</i>	3	2
<i>Insatisfeito</i>	24	25



**Figura 5.25 - Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema ES**

Após a adição das novas perguntas, o repertório totalizou 58 perguntas/respostas cadastradas, as quais foram gravadas em 43 segundos. Em 13 de maio, deu-se início à terceira aplicação, mantendo o mesmo esquema de trabalho, ou seja, cada aluno cadastrou mais cinco perguntas, sendo os resultados obtidos mostrados a seguir (Figura 5.26).

<b>3ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente Satisfeito</i>	6	6
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	1	1
<i>Insatisfeito</i>	23	23



**Figura 5.26 - Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema ES**

Neste estágio, pode-se observar que as aplicações COM e SEM *thesaurus* obtiveram melhor resultado em relação à aplicação anterior, havendo um crescimento de 10% para 20% das respostas “Plenamente satisfeito” e um declínio de 80% e 83% respectivamente para 77% das respostas “Insatisfeito”. Adicionaram-se ao repertório 30 questões, totalizando 88 perguntas/respostas cadastradas. O tempo de gravação foi de 2 minutos e 10 segundos.

Em 20 de maio, efetuou-se a 4ª aplicação. Na aplicação SEM *thesaurus* não houve modificações. As aplicações COM *thesaurus*, porém, regrediram em relação aos resultados da segunda aplicação, passando de 20% para 7% as respostas avaliadas como “Plenamente satisfeito” e de 77% para 87% das respostas “Insatisfeito”, conforme se observa na figura 5.27, abaixo:

4ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente Satisfeito</i>	2	6
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	2	1
<i>Insatisfeito</i>	26	23





Figura 5.27 - Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema ES

O repertório passou de 88 para 110 questões e o tempo de gravação foi de 4 minutos e 23 segundos.

A 5ª aplicação ocorreu no dia 27 de maio. A aplicação COM *thesaurus* permaneceu com sua avaliação constante. Na aplicação COM *thesaurus*, as respostas avaliadas como “Plenamente satisfeito” chegaram a 17% e o nível de insatisfação continua elevado (80%). O novo repertório com 135 questões foi gravado em 7 minutos e 52 segundos (Figura 5.28).


<b>5ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente Satisfeito</i>	4	5
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	0	0
<i>Insatisfeito</i>	26	25



**Figura 5.28 - Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema ES**

A 6ª aplicação foi realizada em 7 de junho. O quadro permanece o mesmo, com níveis de insatisfação superiores a 80% e de satisfação agora reduzidos para 10%. O repertório foi gravado com 161 questões em 13 minutos e 40 segundos (Figura 5.29).


<b>6ª Aplicação</b>	<b>COM Thesaurus</b>	<b>SEM Thesaurus</b>
<i>Plenamente Satisfeito</i>	3	3
<i>Parcialmente Satisfeito</i>	2	1
<i>Insatisfeito</i>	25	26



**Figura 5.29 - Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema ES**

A 7ª aplicação ocorreu em 18 de junho. Observou-se uma pequena melhora em relação à aplicação anterior, conforme a figura 5.30, abaixo:

7ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	5	6
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	2
<i>Insatisfeito</i>	24	22



**Figura 5.30 - Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema ES**

O tempo de gravação do repertório foi de 24 minutos e 16 segundos, totalizando 186 perguntas/respostas cadastradas.

A 8ª aplicação ocorreu no dia 24 de junho. As aplicações COM *thesaurus* permaneceram praticamente inalteradas em relação ao grau de satisfação do usuário. Já nas aplicações SEM *thesaurus* o percentual de respostas “Insatisfeito” passou de 73% para 83% (Figura 5.31).

8ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	5	5
<i>Parcialmente satisfeito</i>	0	0
<i>Insatisfeito</i>	25	25




Figura 5.31 - Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema ES

Ao repertório foram acrescentadas 24 questões, ficando este com um total de 210 perguntas/respostas cadastradas. O tempo de gravação foi de 35 minutos.

Em 02 de julho iniciou-se a 9ª aplicação. Não ocorreu nenhuma mudança significativa. A figura 5.32 abaixo demonstra os resultados:

9ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	5	5
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	1
<i>Insatisfeito</i>	24	24




Figura 5.32 - Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema ES

O tempo de gravação do repertório se elevou para 45 minutos.

Com um repertório de 235 questões, no dia 04 de julho ocorreu a 10ª aplicação. Em ambas as situações foi observado um aumento das respostas “Plenamente Satisfeito” e uma redução do percentual de respostas “Insatisfeito” (Figura 5.33).

10ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
<i>Plenamente satisfeito</i>	7	8
<i>Parcialmente satisfeito</i>	1	1
<i>Insatisfeito</i>	22	21




Figura 5.33 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema ES

A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto e o repertório já contava com 258 questões cadastradas. As aplicações evoluíram positivamente. Porém, pelo tema ser de maior abrangência, o nível de respostas “Plenamente satisfeito” não ultrapassou os 34%. Outro aspecto a destacar é que não houve impacto relevante nos resultados obtidos quando se fez o uso da ferramenta *thesaurus* (Figura 5.34).



11ª Aplicação	COM Thesaurus	SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito	10	9
Parcialmente satisfeito	2	1
Insatisfeito	18	20




Figura 5.34 - Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema ES

### 5.2.3.1 Análise final - tema Educação Sexual

Na avaliação COM *thesaurus* não se atingiram limites razoáveis de performance, ficando as respostas avaliadas como insatisfeito com média de 75% e “Plenamente satisfeito” com média de 17% (Figura 5.35).

Aplicações										
COM Thesaurus	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
Plenamente satisfeito	3	6	2	5	3	5	5	5	7	10
Parcialmente satisfeito	3	1	2	1	2	1	0	1	1	2
Insatisfeito	24	23	26	24	25	24	25	24	22	18




Figura 5.35 - Evolução dos resultados das aplicações COM Thesaurus - ES

Na avaliação SEM *thesaurus*, os resultados foram equivalentes, ficando as respostas avaliadas como insatisfeito com média de 77% e “Plenamente satisfeito” com média de 19% (Figura 5.36).

Aplicações										
SEM Thesaurus	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
Plenamente satisfeito	3	6	6	6	3	6	5	5	8	9
Parcialmente satisfeito	2	1	1	1	1	2	0	1	1	1
Insatisfeito	25	23	23	23	26	22	25	24	21	20




Figura 5.36 - Evolução dos resultados das aplicações SEM *Thesaurus* - ES

De forma semelhante ao segundo tema da pesquisa, Doenças Sexualmente Transmissíveis, optou-se por criar um repertório com respostas completas. Devido ao tema ser de maior abrangência não foram obtidos melhores resultados, mesmo já tendo 258 questões cadastradas no repertório.

Acredita-se que melhores resultados poderiam ser obtidos caso a rotina de obtenção de resposta fosse refinada. O exemplo abaixo mostra claramente que o processo de escolha de respostas apresenta-se inconsistente:

Na 5ª aplicação COM *thesaurus*, um aluno fez a seguinte pergunta e obteve a resposta abaixo:

Pergunta: O que significa ser homossexual?

Resposta: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de

relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito à base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcoólicas.

Raiz: que signific ser homossexu.

No entanto, o repertório já possuía as seguintes opções de resposta:

Perguntas	Raízes
Por que há tanta discriminação com os homossexuais?	que há discriminac homossexu
O que quer dizer homossexual e bissexual?	que quer diz homossexu bissexu
O que é gonorréia?	que gonorré

**Tabela 5.2- Perguntas existentes no repertório da 5ª aplicação**

Comparando a raiz da pergunta do aluno com as raízes da tabela, supõe-se que o AC escolheria a primeira ou a segunda questão da tabela acima, visto que estas possuem duas raízes em comum com a raiz da pergunta do aluno (que, homossexu). Contudo, a resposta dada pelo AC foi a correspondente a 3ª pergunta da tabela, onde somente existia o radical “que” em comum.

Veja agora a mesma pergunta sendo respondida pelo AC sem o uso do *thesaurus*:

Pergunta: O que significa ser homossexual?

Resposta: É mesmo muito difícil para as pessoas enfrentarem uma situação diferente daquela que estão habituadas. Assim, ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, trocando carícias, é uma coisa que ainda choca e incomoda muito. Não adianta ficar encanado com isso e deixar de viver a sua vida do jeito que você acha melhor. As pessoas vão ter que aprender a respeitar você do jeito que você é. Se isso estiver sendo um problema muito grande vale a pena procurar a ajuda de um terapeuta. Ele pode dar uma força nesse momento mais difícil

(resposta cadastrada ao questionamento “Por que há tanta discriminação com os homossexuais?”).

Conclui-se, então, que em certos momentos o *thesaurus* pode até prejudicar a performance do *chatbot* criado no AC.

Para confirmar tal afirmativa, construiu-se um repertório teste onde buscou-se analisar a capacidade do *thesaurus* em detectar palavras sinônimas. As seguintes perguntas foram inseridas no repertório (Tabela 5.3):

<b>Perguntas</b>	<b>Raízes</b>	<b>Respostas</b>
Quais os sintomas da gonorréia?	quais sintom gonorré	Os sintomas mais freqüentes da gonorréia são: nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus.
Quais os sintomas da sífilis?	quais sintom sífil	Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue.
Quais os sintomas do granuloma?	quais sintom granulom	Os sintomas do granuloma venéreo são dor de cabeça, febre, secreção purulenta.
O que é donovanose?	que donovanos	É uma doença crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo,. Aparece na pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais. Pode ocorrer em outras regiões do organismo, inclusive órgãos internos.
O que é granuloma?	que granulom	

**Tabela 5.3 - Perguntas/respostas de um repertório de testes**

Utilizou-se a ferramenta com o *thesaurus* e fez-se então a seguinte pergunta ao *chatterbot* criado:

Pergunta gravada número: 1

Aug 7, 2002 - 16:51:19

Cynthia: Quais os sintomas da donovanose?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Cynthia: Insatisfeito

Esperava-se neste caso que o *thesaurus* considerasse sinônimas as palavras “donovanose” e “granuloma”, já que estas palavras encontravam-se em um conjunto de perguntas de mesma resposta. Portanto, o *thesaurus* não associou as palavras acima como era esperado, pois quando a pergunta acima (Quais os sintomas da donovanose?) foi efetuada, o *chatterbot* respondeu os sintomas da sífilis e não do granuloma.

Conforme se demonstra abaixo, ao repetir a pergunta, o *chatterbot* respondeu corretamente e posteriormente, em uma nova repetição, tornou a repetir erroneamente a resposta, mostrando que, apesar do *thesaurus* estar em uso, apenas o critério de escolha realizado pelo *stemming* prevaleceu.

Pergunta gravada número: 3

Aug 7, 2002 - 16:52:04

Cynthia: Quais os sintomas da donovanose?

Doutor: Os sintomas do granuloma venéreo são dor de cabeça, febre, secreção purulenta.

Avaliação da resposta por Cynthia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 7, 2002 - 16:52:39

Cinthia: Quais os sintomas da donovanose?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Cinthia: Insatisfeito

Refez-se então o repertório, incluindo agora mais três questões/respostas (Tabela 5.4):

Perguntas	Raízes	Respostas
Qual o tratamento para a donovanose?	qual tratament donovanos	O tratamento é feito à base de antibióticos e pomada no local afetado
Qual o tratamento para o granuloma?	qual tratament granulom	
Qual o tratamento da sífilis?	qual tratament sífil	O tratamento é feito à base de penicilina

**Tabela 5.4 - Perguntas/respostas incluídas no repertório de teste**

Ao aplicar novamente e repetir a pergunta ao *chatterbot*, o resultado foi o esperado, como se observa abaixo:

Pergunta gravada número: 1

Aug 8, 2002 - 14:59:50

Ci: quais os sintomas da donovanose?

Doutor: Os sintomas do granuloma venéreo são dor de cabeça, febre, secreção purulenta.

Avaliação da resposta por Ci: Plenamente Satisfeito

Refez-se a mesma pergunta e o *chatterbot* continuou dando a mesma resposta.

Portanto, o problema do *thesaurus* provavelmente está nos valores numéricos que controlam a quantidade de vezes que a palavra aparece no repertório para poder entrar no *thesaurus* e na porcentagem de semelhança que as palavras precisam ter para montar a tabela do *thesaurus*.

## 6. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DA FERRAMENTA

“Ergonomia é a disciplina que visa a adaptação do trabalho ao homem, por meio de sistemas e dispositivos que estejam adaptados a maneira como o usuário pensa e trabalha.”<sup>27</sup>

Para avaliar a ergonomia da ferramenta *Autochatter*, utilizou-se uma técnica de avaliação preditiva/analítica, a qual busca prever erros de projeto de interface sem a participação direta do usuário. A princípio adotou-se o uso de *Ckecklists* que são "ferramentas para avaliação da qualidade ergonômica de um software que se caracteriza pela verificação da conformidade da interface de um sistema interativo com recomendações ergonômicas provenientes de pesquisas aplicadas.”<sup>26</sup>

O modelo de *Checklist* adotado para avaliação ergonômica do AC foi o *Ergolist*. O *Ergolist* é um serviço disponível no site do Laboratório de Usabilidade (LabiUtil) da UFSC, composto por um *Checklist* para inspeção ergonômica de interfaces humano-computador e uma base de recomendações criada a partir de critérios ergonômicos de avaliação (Bastien & Scapin). As questões avaliadas e suas respectivas respostas encontram-se listadas no anexo<sup>28</sup>.

### 6.1 Avaliações baseadas em critérios ergonômicos<sup>26,27,28,29</sup>

O sistema de critérios ergonômicos definido por Dominique Scapin é o resultado de estudos visando a organização de conhecimentos sobre ergonomia de interfaces humano-computador, a fim de torná-los disponíveis, tanto para especialistas quanto para não especialistas nessa disciplina.

Em 1993, a atual lista de critérios foi definida por Dominique Scapin e Christian Bastien e apresenta um total de oito critérios principais, sendo que alguns deles se dividem em sub-critérios, que por sua vez se dividem em critérios elementares. O *Ergolist* está associado a 18 critérios elementares: Presteza, Agrupamento por Localização, Agrupamento por Formato, Feedback, Legibilidade, Concisão, Ações Mínimas, Densidade Informacional, Ações Explícitas, Controle do Usuário, Flexibilidade, Experiência do Usuário, Proteção contra erros, Mensagens de Erro, Consistência, Significados e Compatibilidade.



### 6.1.1-Condução

Refere-se a qualidade dos meios utilizados para orientar, alertar, aconselhar, informar e guiar o usuário na interação com o sistema (mensagens, alarmes, rótulos, avisos). Uma condução adequada facilita a aprendizagem e o uso do sistema, dando ao usuário requisitos para:

- saber, a qualquer momento, em que ponto da interação com o sistema ele se encontra;
- conhecer as ações permitidas bem como suas conseqüências;
- obter informação adicional.

#### 6.1.1.1 - Presteza

Este critério atenta aos mecanismos que o software oferece para:

- guiar o usuário na execução de determinadas tarefas, poupando-lhe o aprendizado de uma série de comandos;
- possibilitar ao usuário conhecer alternativas para a realização da tarefa;
- informar o usuário sobre o estado ou contexto atual do sistema;
- fornecer ajuda ao usuário.

A adoção de uma presteza adequada facilita a navegação no aplicativo e diminui a ocorrência de erros.

#### **Problemas observados:**

##### *Rótulo identificativo:*

No palco de conversação, a ferramenta não apresenta um rótulo identificativo no campo de entrada da questão do usuário, não ficando transparente a forma de realização desta tarefa

##### *Visualizador de repertório:*

Na tela Visualizador de repertório, o usuário não tem uma visão completa do repertório, devido a ausência de itens como o número de questões cadastradas

##### *Ajuda:*

A ferramenta não apresenta o módulo de ajuda. Este módulo é de essencial importância para o aprendizado da ferramenta pelo usuário, podendo inclusive relatar as formas mais eficientes de formulação de questões/respostas durante a criação de um repertório.

#### 6.1.1.2. Agrupamento/Distinção de Itens

Refere-se à organização visual dos itens de informação que se relacionam entre si através de características como similaridade, frequência de uso, contexto, localização, formato, determinando classes de itens as quais permitem agrupar as funções do sistema.


##### a) Agrupamento/Distinção por Localização

Refere-se ao posicionamento relativo dos itens, estabelecido para indicar se eles pertencem ou não a uma dada classe, ou o posicionamento relativo desses itens dentro de uma classe. A importância deste critério está no fato de que, a ordenação e organização dos objetos apresentados na tela influenciarão diretamente no entendimento da tela pelo usuário.

#### **Problemas observados:**

##### *Distribuição de atores no palco*

Após a entrada da pergunta do usuário, quatro informações são inseridas no palco: N° de perguntas formuladas, a resposta à pergunta do usuário, a imagem do chatterbot e avaliação da resposta. Com relação ao primeiro quesito, não há necessidade desta informação ser exibida diretamente no palco já que não tem relacionamento com a conclusão da tarefa em andamento. Esta informação poderia ficar sendo exibida de forma fixa no rodapé da tela. Com relação à resposta à pergunta do usuário, esta aparece no meio da tela, sem qualquer referência ou identificação. O chatterbot se apresenta fixo e imóvel no centro superior da tela e, de acordo com a configuração do monitor, sua cabeça aparece cortada. Quanto ao último quesito, este aparece de forma desproporcional na tela.



**Figura 6.1 - Distribuição de atores no palco de conversação**

### *Lógica de agrupamento*

O agrupamento de dados não usa nenhum critério lógico em seu agrupamento no visualizador de repertório, pois, ao entrar com um novo conjunto de pergunta/resposta, estas se distribuem de forma aleatória, no meio das demais questões cadastradas.


As opções de menu também não seguem um critério lógico. A primeira opção apresentada é *Sobre*, que apresenta informações sobre a versão do programa e seus desenvolvedores. Esta opção deveria ser a última já que seria a menos provável do usuário utilizar. A segunda opção – *Repertório* – deveria ser naturalmente a primeira opção de uso da ferramenta, visto que a ação imediata do usuário ao entrar no programa seria criar um novo repertório ou carregar um repertório existente.

### *Teclas aceleradoras*

O sistema não possui teclas aceleradoras de menus.

### *Botões de comando*

Os botões de comando estão desorganizados em algumas telas. Por exemplo, na tela visualizador de perguntas, o Cancela vem em cima do Ok. Algumas telas também não possuem um botão default.



**Figura 6.2 - Visualizador de perguntas**

### b) Agrupamento/Distinção por Formato

Este critério trata mais especificamente às características gráficas (formato, cor, etc.) que distinguem classes e elementos de diferentes classes.

### **Problemas observados:**

#### *Formatação de respostas*

O palco de escritório apresenta a resposta para o usuário de forma desalinhada e sem formatação. A ferramenta poderia possibilitar ao autor do repertório a formatação das suas respostas, facilitando, com isto, sua visualização e entendimento durante a conversa com o chatterbot.

#### *Opções não disponíveis e botão default*

O sistema não diferencia visualmente as opções de menu não disponíveis no momento, nem o botão selecionado por default. Todos os campos são exibidos com a mesma apresentação visual, não existindo distinção entre campos opcionais e obrigatórios.

### *Identificações destacadas*

Durante a avaliação da resposta pelo aluno, as opções de avaliação não se apresentam diferenciadas do restante da tela. Também não diferencia situações que precisem de atenção imediata, como por exemplo, quando o aluno não avalia a resposta e tenta fazer outro questionamento, o AC exibe um box de mensagem solicitando a avaliação da resposta, sem no entanto destacar visualmente onde efetuar a avaliação.

#### 6.1.1.3. Feedback Imediato

Este critério está relacionado às respostas fornecidas pelo sistema às ações dos usuários, sejam ações simples ou complexas. Em ambos os casos, a qualidade e a rapidez do feedback possibilitam ao usuário:

- um melhor entendimento do funcionamento do sistema;
- a satisfação e confiança em relação ao sistema;

A ausência de feedback imediato pode levar o usuário a realizar ações que prejudiquem os processos em andamento.

#### **Problemas observados:**

##### *Alterações de perguntas e respostas*

Ao alterar uma pergunta/resposta, o AC não fornece ao usuário nenhum indício de que este foi atendido em sua ação. No caso da alteração de perguntas, observa-se um erro no programa, conforme abaixo:

Para alterar uma pergunta o autor do repertório deve clicar na pergunta a ser alterada na janela “Visualizador de Repertório” e em seguida no botão “Inspecionar Pergunta”. Após a alteração observa-se que esta não é atualizada no Visualizador, gerando uma dúvida ao autor do repertório, se a pergunta foi ou não corrigida. Como exemplo, a mudança da pergunta *Como o vírus HIV age* (pergunta 53 da figura 6.3).




Figura 6.3 - Visualizador de repertório

Ao clicar sobre a pergunta, e seleccionar a opção *Inspecionar Pergunta* é apresentada a janela *Visualizador de perguntas*, mostrada na figura abaixo:




Figura 6.4 – Apresentação da questão no Visualizador de Perguntas

Na figura abaixo observa-se a alteração do texto da pergunta para “Como o vírus da AIDS age?”




Figura 6.5 - Pergunta alterada

Porém, mesmo após alterada, a pergunta no Visualizador de repertório continua como antes.

#### *Avaliação*

Quando da avaliação da resposta por parte do usuário, o AC não informa se esta operação foi realizada ou não com sucesso.


#### *Apagar pergunta/resposta*

Neste caso, além de não exibir mensagem registrando que o processo foi realizado com sucesso, ele não solicita a confirmação do procedimento.

#### *Gravação do repertório*

Um dos pontos críticos para o gestor do repertório é o tempo que o programa gasta na gravação do mesmo, conforme se observa no gráfico abaixo:

perguntas	tempo
30	2
58	43
88	130
110	263
135	472
161	820
186	1456
210	2100
235	2700



**Figura 6.6 - Gráfico demonstrativo do Tempo de Gravação x Quantidade de Perguntas**

Como se pode observar, o crescimento do número de questões é acompanhado do crescimento do tempo de gravação. Assim, para um repertório com um grande número de questões esse tempo de gravação será impraticável. Esse problema poderia ser minimizado se somente as novas questões fossem gravadas e não o repertório inteiro ser reprocessado.

Durante o processo de gravação do repertório, o AC fica indisponível ao usuário, deixando este sem informações sobre o andamento do processo. Neste caso, o sistema poderia apresentar uma estimativa do tempo de conclusão da tarefa e um retângulo graduado de 0 a 100% para indicar a progressão da tarefa.

#### *Definição do foco de ação*

Em algumas telas do AC, o sistema não define o foco das ações para objetos recém abertos ou criados, tais como no campo de entrada de perguntas do palco de escritório, no botão adicionar Frases/Respostas do visualizador de repertório no momento de sua criação, entre outros.

#### *Mudança de situação de objetos*

É recomendado que uma mudança na situação atual de objetos de controle seja apresentada visualmente de modo claro ao usuário. Observa-se, porém, conforme relatado em critérios anteriores, que botões de comando e opções de menus não se apresentam em formato habilitado/desabilitado. Por exemplo, durante a carga do repertório, o botão Ok deveria ficar desabilitado até que um repertório fosse selecionado. Se o usuário clicar no botão Ok, sem selecionar um repertório, nada acontece, ficando o usuário sem saber o que está fazendo de incorreto.




Figura 6.7 - Janela Carrega Repertório

#### 6.1.1.4. Legibilidade



A legibilidade trata dos aspectos lexicais das informações apresentadas na tela que possam dificultar ou facilitar a leitura desta informação, tais como:

- Brilho do caracter;
- Contraste letra/fundo;
- Tamanho da fonte;
- Espaçamento entre palavras;
- Espaçamento entre linhas;
- Espaçamento entre parágrafos;
- Tamanho da linha.

Uma legibilidade adequada melhora a performance, pois facilita a leitura da informação apresentada, favorecendo as características cognitivas e perceptíveis do usuário.

### **Problemas observados:**

#### *Largura dos mostradores de texto*

A tela Visualizador de repertório apresenta mostradores de texto com largura máxima de 30 caracteres (sendo que algumas posições são usadas pelo programa para identificação do idioma), não sendo possível a visualização da questão completa. O mesmo acontece nas telas visualizador de respostas, perguntas e editor de frases. Vale ressaltar que em nenhum local pode-se visualizar a questão com um todo na tela. Em alguns casos, como no momento de alterações de respostas, o item pode ser visualizado com o uso de setas direcionais. Nas demais telas a visualização restringe-se somente ao que é exibido.

#### *Rótulos*

Os rótulos de campos ferem o critério de legibilidade quando começam com as iniciais maiúsculas em todas as palavras que compõe o rótulo. Como exemplo tem-se: “Frase De Entrada” localizado na tela Editor de Frase.

#### *6.1.2. Carga de Trabalho*

Este critério trata da influência dos elementos de interface na redução da carga cognitiva e perceptiva do usuário e no aumento da eficiência do diálogo. A ascensão da carga de trabalho aumenta a possibilidade do usuário cometer erros. Alguns fatores podem reduzir a carga de

trabalho do usuário, tais como, redução da quantidade de elementos de interface que possam distrair o usuário e de ações necessárias na interação.

#### 6.1.2.1. Brevidade

Trata da carga de trabalho perceptiva e cognitiva do usuário, subdividindo-se em concisão, isto é, uma limitação de trabalho de entrada e leitura, tanto para entradas e saídas individuais quanto para conjunto de entradas (ou seja, conjunto de ações requeridas para alcançar algum objetivo ou executar uma tarefa), e ações mínimas, número de ações necessárias para executar uma tarefa ou alcançar um objetivo.

#### **Problemas observados:**

##### *Inserção*

Após a inserção e adição do texto na caixa Frase de Entrada, o mesmo é catalogado na caixa Conjunto de Frases de Entrada. A partir deste ponto, não se tem mais a visualização total da pergunta, nem tão pouco é possível alterá-la. Ainda com relação a esse tópico, para editar a frase incluída anteriormente, só temos como opção o botão “Retira do Conjunto”, obrigando a redigitação completa da frase de entrada, o que poderia ser evitado caso o conteúdo da caixa Conjunto de Frases de Entrada fosse ecoado na caixa Frase de Entrada, visto que nesta última caixa é possível navegar com o cursor e ajustar o texto.

##### *Auto-alimentação do chatterbot*

Seria importante configurar o *Autochatter* de forma a permitir que as perguntas respondidas insatisfatoriamente pudessem ser automaticamente catalogadas no repertório, para futura inclusão de respostas por parte do autor do repertório. Visando facilitar este processo de responder essas questões, sugere-se incluir na carga do repertório, um filtro para selecionar os questionamentos sem resposta ou o repertório como um todo.

##### *Tabulação*

Na tela Editor de Frases a ordem de tabulação não corresponde a ordem das tarefas, pois ao digitar uma pergunta na caixa Frases de entrada e clicar *tab*, o foco vai para o Ok e não para o Adicionar (botão que conclui o cadastramento da frase de entrada digitada).

### *Default*

Algumas telas não apresentam botão definido como default.

#### 6.1.2.2. Densidade Informacional

Este critério diz respeito à carga de trabalho cognitiva e perceptiva do usuário referente ao conjunto de informações apresentadas. Alguns fatores devem ser observados para que a densidade informacional não seja nem muito baixa, nem muito alta, tais como:

- Itens não relacionados a tarefa devem ser removidos;
- A carga de memorização do usuário deve ser minimizada;
- O usuário não deve ser obrigado a executar atividades complexas que não existiam na tarefa manual.

### **Problemas observados:**

#### *Palco de Conversação*

Considera-se como poluentes visuais desnecessários o número de perguntas formuladas no palco de conversação e o idioma no visualizador de repertório. Outro quesito não atendido neste item é a possibilidade de leitura das informações da tela em “Z”, onde no palco de conversação inicia-se a conversação com a entrada da pergunta no rodapé da tela, a exibição da resposta no meio e avaliação no lado superior direito.

#### 6.1.3. Controle Explícito

Aborda o processamento explícito das ações do usuário pelo sistema, bem como o controle que os usuários possuem sobre o processamento de suas ações pelo sistema. Está subdividido em ações explícitas do usuário e controle do usuário.

##### 6.1.3.1. Ações Explícitas do Usuário

Refere-se às relações entre o processamento executado pelo computador e as ações do usuário, devendo esta ser explícita, isto é, o computador deve processar exclusivamente as ações requeridas no momento solicitado pelo usuário. Este tipo de procedimento ajudam o usuário a entender melhor o funcionamento do sistema e a quantidade de erros é reduzida.

**Problemas observados:**

Em algumas ocasiões, como a avaliação da resposta dada pelo *Chatterbot*, a alteração de perguntas e a exclusão de frases/respostas, o sistema não exige do usuário uma ação explícita para dar início ao processamento.

## 6.1.3.2. Controle do Usuário

Enfoca a necessidade do usuário estar sempre no controle do processamento do sistema (ou seja, interromper, cancelar, suspender, continuar uma ação), favorecendo a aprendizagem e diminuindo a probabilidade de erros.

## 6.1.4. Adaptabilidade

Refere-se a capacidade do sistema reagir conforme o contexto, e conforme as necessidades e preferências do usuário. Este critério apresenta duas sub-divisões: flexibilidade e consideração da experiência do usuário.

## 6.1.4.1. Flexibilidade

Caracteriza-se pela diversidade de maneiras pelas quais o usuário pode alcançar um determinado objetivo., ou seja, é a capacidade da interface de se adaptar as variadas ações do usuário, através de meios colocados à disposição do usuário para personalizar a interface de acordo com suas estratégias e hábitos de trabalho.

**Problemas observados:***Possibilidade de personalizar a interface e ações*

Os usuários não têm a possibilidade de modificar ou eliminar itens irrelevantes das janelas. Como exemplo cita-se a possibilidade de não apresentação do número de questões no palco de escritório.

No editor de frases, não é possível definir um idioma default para o repertório. Isso é, se a primeiro conjunto de pergunta/resposta for definido para o idioma inglês, os demais deveriam vir com a opção inglês selecionada como padrão.

#### 6.1.4.2.Consideração da experiência do usuário

Trata-se dos meios implementados que permitem que o sistema respeite o nível de experiência do usuário.

#### **Problemas observados:**

O sistema foi construído sem levar em conta os diferentes níveis de experiência do usuário, não possuindo por exemplo teclas de atalho (o qual não permite agilidade de navegação para usuários experientes) bem como, não expõe de maneira visualmente clara algumas ações possíveis como alteração de perguntas e respostas, dificultando o uso do software por usuários novatos.

#### *6.1.5. Gestão de erros*

Relaciona-se aos mecanismos que permitem evitar ou reduzir a ocorrência de erros, tais como: entrada inválida de dados ou com o formato inadequado. As interrupções ocasionadas por erros prolongam as transações e diminuem a produtividade do usuário. Este critério se divide em: *proteção contra erros*, *qualidade das mensagens de erros* e *correção de erros*.

##### 6.1.5.1. Proteção contra os erros

Trata dos meios disponíveis para detecção e prevenção de erros decorrentes de entradas de dados, comandos, possíveis ações de consequências desastrosas e/ou não recuperáveis.

A detecção de erros é mais adequada quando feita durante a digitação, já que a perturbação do diálogo tende a ser menor neste momento.

#### **Problemas observados:**

##### *Ações desastrosas*

O sistema apresenta-se bastante vulnerável neste quesito. No visualizador de repertório, ao selecionar uma pergunta e em seguida a opção apagar pergunta o software não solicita confirmação da operação, executando de imediato a ação de exclusão, deixando assim como

única alternativa para o usuário, caso este deseje desfazer a ação, abandonar a operação sem gravar o repertório. Esta alternativa porém, só seria viável se outras ações não tivessem sido realizadas anteriormente.

#### 6.1.5.2. Qualidade das mensagens de erro

Este critério refere-se ao conteúdo das mensagens de erro: relevância, severidade, legibilidade, especificidade sobre a natureza do erro – sintaxe, formato, limites, etc. – e às ações necessárias à correção. A qualidade das mensagens de erro favorece o aprendizado do sistema, já que permite ao usuário conhecer seus erros e suas causas.

#### Problemas observados:

As mensagens de erros nem sempre são claras, limitando-se apenas a informar o usuário sobre a existência do erro, não fornecendo com precisão o local e causa específica ou provável do erro, bem como as ações que o usuário poderia executar para corrigi-lo. No exemplo abaixo, a mensagem apresentada não indica com precisão se o item a ser selecionado refere-se ao tipo de seleção ou à resposta.




Figura 6.8 - Qualidade das mensagens de erro

Outro fator a considerar é que a ausência de indicativos para o usuário de como corrigir o erro implica no crescimento de operações erradas. Para este caso, o sistema não apresenta mensagem diferenciada para reincidência de erro.

### 6.1.5.3. Correção dos erros

Refere-se aos meios proporcionados pelo sistema para correção de erros pelo usuário.

#### **Problemas observados:**

Na tela de edição de frases, o usuário não dispõe de uma opção para corrigir uma questão já adicionada ao conjunto. Esperava-se que o *botão* “Retira do Conjunto” espelhasse a questão na caixa Frase de Entrada, possibilitando assim a correção da mesma. Porém, como este processo não ocorre, o sistema obriga em caso de alteração ou exclusão indevida, a redigitação completa da frase de entrada, visto que a tela não tem a opção desfazer.

### 6.1.6. Homogeneidade/Coerência (Consistência)

Refere-se à regularidade com que conceitos de projeto (códigos, nomes, formatos, procedimentos, etc) são usados de maneira idêntica em contextos similares e de forma diferente em contextos distintos.

Um sistema consistente dá ao usuário a sensação de estabilidade diante da interface e reduz a aprendizagem devido sua previsibilidade.

#### **Problemas observados:**

##### *Botões de comando*

Os elementos das janelas do programa não são mantidos consistentes de uma tela para outra. Os botões de execução ora são organizados horizontalmente, ora verticalmente. Em particular, o botão de cancelamento recebe nomenclaturas diferenciadas, tais como Cancela, CANCEL e Cancelar. Algumas telas apresentam as seqüências de botão Ok – Cancelar, enquanto outras, Cancelar – Ok.

##### *Banco de questões*

O sistema também não apresenta de forma consistente a localização dos dados de uma tela para outra. Quando do cadastramento de uma nova pergunta, esta é inserida aleatoriamente no

banco de dados, não utilizando nenhum critério visível como ordem alfabética ou ordem de inserção. A questão simplesmente se mistura com as demais existentes, não ficando nem mesmo com seu campo de ação em foco.

#### *6.1.7. Significado dos códigos e denominações*

Trata da adequabilidade entre um termo ou a informação apresentada e a codificação usada para sua representação, devendo-se levar em conta que códigos significativos facilitam a recordação e o reconhecimento, enquanto que códigos e denominações pouco significativos podem levar o usuário a executar operações inadequadas, e por conseguinte, ao erro.

#### **Problemas observados:**

##### *Denominações dos títulos*

Os títulos de algumas janelas ou caixas de mensagens estão em inglês ou não são condizentes com seu objetivo. Por exemplo, ao clicar sobre uma resposta no visualizador de repertório, o usuário poderá entrar na tela de inspeção de respostas, onde poderá alterar, remover ou inserir respostas. O título desta tela, entretanto, é visualizador de respostas.

No palco de conversação, ao optar pelo criação ou edição de um repertório, em ambos os casos, o usuário será levado a tela de título Visualizador de repertório

#### *6.1.8. Compatibilidade*

Este critério está associado à adequação entre as características das tarefas e do usuário – memória, experiência, habilidades, idade, expectativas e outras -, e a organização da saída, entrada e do diálogo de uma aplicação. Aborda, também, a coerência entre ambientes e entre aplicações.

#### **Problemas observados:**

##### *Módulo de ajuda*

Conforme já citado anteriormente, o sistema não possui ajuda.



*Mensagens*

As mensagens não se apresentam na afirmativa. Como exemplo tem-se na figura 6.8 a mensagem “Não há item selecionado”.

*Ilustrações/animações*

O programa não utiliza animações/ilustrações para completar as respostas

## 7. CONCLUSÕES

A dissertação em questão abordou técnicas de construção e aplicações de ferramentas e tecnologias de *chatbots* em diversos contextos, apresentando alguns modelos de *bots*, áreas de atuação, exemplos de aplicações, entre outros. Mais especificamente, o trabalho procurou avaliar a eficiência da ferramenta *Autochatter* em seus aspectos técnicos e ergonômicos. Para tal, fez-se uso da pesquisa experimental onde se determinou critérios de avaliação, entre os quais: o uso de um *thesaurus* automático e a criação de três *chatbots* com assuntos de domínio de diferentes graus de abrangência .

Quanto ao primeiro objetivo proposto - a avaliação da técnica de construção de *chatbots* baseados em palavras-chave x respostas, através da ferramenta de autoria de *chatbots* – *Autochatter*, acredita-se que tenha sido plenamente atingido, visto que durante 11 aplicações fez-se um levantamento de situações que ocorrem frequentemente na ferramenta, contemplando desde falhas, interrupções, bem como aspectos do algoritmo, que poderiam ser implementados de forma a melhorar a performance da ferramenta. Como alternativa para aumentar a probabilidade de respostas corretas frente a novos questionamentos dos usuários, sugere-se:

- aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural, de forma a se obter métodos mais eficientes de extração de radicais e também avaliar a possibilidade de se considerar palavras derivadas com radicais equivalentes;
- atribuição de pesos às diferentes classes gramaticais visando melhorar a escolha de resposta durante o processo de *stemming*;
- um estudo para implementar na ferramenta um dicionário de sinônimos geral e específico;
- que o *chatbot* já trouxesse em sua estrutura de resposta padrão, a repetição da pergunta original sem o pronome ou com mudança do estado verbal;
- uma revisão dos valores numéricos que controlam a quantidade de vezes que a palavra aparece no repertório para poder entrar no *thesaurus* e na porcentagem de semelhança que as palavras precisam ter para montar a tabela do *thesaurus*.

Com relação ao segundo objetivo - análise detalhada da ergonomia da ferramenta - acredita-se que tal avaliação contribuirá bastante para melhorar a interface do AC, já que com as modificações sugeridas, possibilitará um aumento na facilidade de uso, adequando as tarefas tanto ao usuário final quanto ao autor do repertório. Essa avaliação levou em conta três prismas de visões, contemplando as falhas do programa, a operacionalidade por parte do usuário e por último a operacionalidade sob ótica do gestor do repertório. Resumem-se abaixo as sugestões propostas:

- padronização das caixas de comunicação para o português;
- melhor distribuição dos atores no palco;
- implementação de um editor de animação e um banco de imagens;
- reestruturação das telas de edição de frases, visualizador de repertório e visualizador de resposta, a fim de permitir maior comodidade ao usuário quando da inserção, alteração e visualização de perguntas/respostas;
- configuração do AC de forma a possibilitar que as perguntas respondidas insatisfatoriamente possam ser automaticamente catalogadas no repertório para futura inclusão de respostas por parte do autor;
- revisar a rotina de gravação do repertório de forma a reduzir o tempo demandado nesta tarefa;
- inclusão de uma função para localizar palavras em repertórios;
- inclusão de um módulo de ajuda interativo;

Quanto aos objetivos específicos, acredita-se que tenham sido atingidos visto que as variáveis usadas na análise contribuíram para identificar pontos positivos e negativos da ferramenta.

Quanto aos trabalhos futuros, acredita-se que várias aplicações ainda podem ser exploradas como:

- Avaliar se a implementação das melhorias propostas (aspectos da língua portuguesa e acesso a dicionários de apoio) na rotina de funcionamento do AC no processo de *stemming* e seleção de respostas poderão acarretar em aumento de performance da ferramenta;
- Avaliar a eficiência de outros algoritmos de extração de radicais.

- Projetar uma nova interface à ferramenta e fazer uma nova avaliação ergonômica;

Acredita-se que as sugestões apresentadas contribuirão para uma melhor adaptação da ferramenta ao processo de ensino/aprendizagem, possibilitando que, num futuro breve esta possa ser realmente inserida no contexto escolar, com uma ergonomia atraente e eficiente na tarefa de manter uma conversação com o usuário, sem que este, conforme previu Turing, consiga distinguir se está conversando com uma pessoa ou com uma máquina.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 01– PRIMO, Alex F.T.; COELHO, Luciano Roth; PAIM, Marcos F. R.; REICHEL, Dagmar. **Júnior, um Chatterbot para educação à distância.** Disponível em: <http://solaris.niee.ufrgs.br/ribie200/papers/255/index.html>. Consultado em Janeiro de 2002.
- 02 – CHAIBEN, Hamilton. **Inteligência Artificial na Educação.** Disponível em <http://www.cce.ufpr.br/~hamilton/iead/iead.htm>. Consultado em Janeiro de 2002
- 03 – PANONT, Fernando Sales; MARIO, Cleber Camargo. **Compreensão da fala.** Disponível em <http://www.din.uem.br/~ia/intelige/linguas/pagina/>. Consultado em Janeiro de 2002
- 04 - LAVEN, Simon. **The Simon Laven page.** Disponível em: <http://www.simonlaven.com/> Consultado em Janeiro de 2002.
- 05 - LÉVY, Pierre. Os três tempos do espírito: a oralidade primária, a escrita e a informática. In \_\_\_ **Tecnologia da Inteligência.** São Paulo, SP: Editora 34, 1999, 75 - 133.
- 06 – RIPPER, Afira Vianna. O preparo do professor para as novas tecnologias. In:\_\_\_\_\_ OLIVEIRA, Vera B.; e outros. **Informática em psicopedagogia.** São Paulo, SP: Editora Senac, 1996, 55-82.
- 07 - LÉVY, Pierre. As mutações da educação e a economia do saber. In \_\_\_ **Cibercultura.** São Paulo, SP: Editora 34, 2000, 171.
- 08- TEODORO, Victor D. **Educação e computadores.** Disponível em: <http://phoenix.sce.fct.unl.pt/vdt/textos/edcomp/cap1vdt.htm> Consultado em Janeiro de 2002
- 09 - LÉVY, Pierre. A nova relação com o saber. In \_\_\_ **Cibercultura.** São Paulo, SP: Editora 34, 2000, 157 – 167.

- 10 - DE ANGELI, Antonella; JOHNSON, Graham I.; COVENTRY, Lynne. **The unfriendly user: exploring social reactions to chatterbots.** Disponível em <http://alice.sunlitsurf.com/articles/> Consultado em Julho de 2002
- 11 - FRANKLIN, Stan; GRAESSER, Art. **Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agent.** Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, published as **Intelligent Agents III**, Verlag: Springer, 1997. Pg. 21-35. Disponível em: <http://www.msci.memphis.edu/~franklin/AgentProg.html>. Consultado em: Janeiro de 2002.
- 12 - CASTANHO, Carla. **A avaliação do uso de Chatterbots no ensino através de uma ferramenta de autoria.** 2002. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, UFSC, Florianópolis.
- 13 - LAUREANO, Eduardo Antonio Galvão Cavalcanti. **ConsultBot - Um Chatterbot Consultor para Ambientes Virtuais de Estudo na Internet.** Pernambuco: UFP-TCC de Graduação. 1999
- 14 - EDWARDS, Jeff. *Chatterbots and the Turing tests* Disponível em: <http://www.stetson.edu/departments/mathcs/students/research/cs/cs498/2000/jeffedwards.pdf>. Consultado em: Janeiro de 2002
- 15 - STORB, Bernd Heinrich. **Chatterbots, concurso de Loebner e estudos de implementações.** Disponível em <http://www.lsc.ufsc.br/~bernd/chatterbots/textoBots.html>. Consultado em Maio de 2002.
- 16 – FONER, Lenny. **What's na Agent Anyway? A Sociological Case Study.** Disponível em <http://foner.www.media.mit.edu/people/foner/Julia/Julia.html>. Acessado em Maio de 2002
- 17 – PRIMO, Alex. **Informações sobre o projeto de Cybelle.** Disponível em <http://cybelle.cjb.net/>. Acesso em abril de 2002. Consultado em Maio de 2002.

- 18 – HUTCHENS, Jason L.; ALDER, Michael D. **Introducing MegaHAL**. Disponível em <http://www.amristar.com.au/~hutch/phd/>. Consultado em junho de 2002
- 19 - VALLE FILHO, Adhemar Maria do; ALVES, João Bosco da Mota; SOUZA, Patrícia Cristiane de; WAZLAWICK, Raul Sidnei; LUZ, Rodolfo Pinto da. **Ferramentas de Autoria de Realidade Virtual – um estudo comparativo**. Disponível em <http://www.lrv.eps.ufsc.br/drv/artigos/>. Consultado em fevereiro de 2002.
- 20 – COSTA, Fabrício. **Autochatter:Uma ferramenta de autoria para a construção de chatterbots – Manual do usuário**. Disponível em [www.lsc.ufsc.br](http://www.lsc.ufsc.br). Consultado em Abril de 2002.
- 21 – SANTOS, Solange Capaverde; GARCIA, Vera Regina Real Lima. **A tecnologia da informação, o ensinar e o aprender: reflexões sobre o desenvolvimento cognitivo e sua relação com a prática escolar**. Disponível em <http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/papers/225/index.htm>. Consultado em Agosto de 2002.
- 22 - WAZLAWICK, Raul S.; STORB, Bernd H.; CASTANHO, Carla L. O.; COSTA, Fabrício A. **Chatterbots Aplicados ao Ensino – A Construção de Uma Ferramenta de Autoria**. XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação/VII Workshop de Informática na Escola. Fortaleza: UNIFOR – Universidade de Fortaleza.
- 23 - STORB, Bernd Heinrich. **Construção de um Thesaurus Automático**. Florianópolis. 5 páginas.
- 24 - SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3ª edição. Florianópolis – SC. Laboratório de Ensino à distância. 2001. 121 p
- 25 - SILVA, C.R.O. **Bases pedagógicas e ergonômicas para concepção e avaliação de produtos educacionais informatizados**. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis.

- 26 - RAMOS, Edla Maria Faust. **Um estudo sobre métodos/técnicas de avaliação.** Florianópolis, 34 páginas.
- 27 – CYBIS, Walter de Abreu. **Ergonomia de Interfaces Homem-Computador.** Disponível em <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/apostila/apostila.htm>. Consultado em Outubro de 2002.
- 28 – **ErgoList.** Disponível em <http://www.labiutil.inf.ufsc.br>. Consultado em Novembro de 2002.
- 29 – BASTIEN, C. SCAPIN, D. **Critérios Ergonômicos para Avaliação de Interfaces Homem – Computador.** Disponível em <http://www.labiutil.inf.ufsc.br>. Consultado em Outubro de 2002



## 9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TURING, A.M. **Computing machinery and intelligence**. Mind, v.59, p. 433-560, 1950.  
Disponível em: <<http://www.loebner.net/Prizef/TuringArticle.html>> Consultado em:  
Dezembro de 2001.

STORB, Bernd Heinrich. **Chatterbots**. Disponível em  
<http://wwwedit.inf.ufsc.br:1114/Tecnologia/Chatterbots.htm>. Consultado em Janeiro de  
2002

PRIMO, A.F.T. **Chatterbots: Robôs de conversação**. Disponível em:  
<http://www.cybelle.cjb.net/>. Consultado em: Maio de 2002.

ZILLMAN, Marcus. **State-of-the-Art in Bot Technology on the Internet**. Disponível em:  
[http://www.bottechnology.com/message/executive\\_summary.htm](http://www.bottechnology.com/message/executive_summary.htm). Consultado em:  
Fevereiro de 2002.

RAMOS, E. M. F. & MENDONÇA, I. J. **O Fundamental na Avaliação da Qualidade do Software Educacional**. II Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Porto Alegre: SBC. 1991.

KOWALIK, John M. **Alan Turing**. Disponível em <http://ei.cs.vt.edu/~history/turing.html>.  
Consultado em Janeiro de 2002.

SEVERINO, Antônio Joaquim **Metodologia do trabalho científico**. 21<sup>a</sup> edição. São Paulo, SP:Editora Cortez, 278 págs.

WAZLAWICK, Raul S.; STORB, Bernd H **Etiquetagem automática de textos no mundo dos atores**. Disponível em <http://www.lsc.inf.ufsc.br/soo/bernd/tagger.html> . Consultado em Maio de 2002.

STORB, Bernd H. **Um modelo difuso de recuperação de documentos utilizando processamento morfológico.** 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis.

BAER, Jeremy; MORGAN, Chenoah. **Educational applications of conversational agents.** Disponível em <http://www.cs.washington.edu/homes/jbear/pubs/edmediachat.html>. Consultado em Janeiro de 2002.

ANDRADE, Adja Ferreira; WAZLAWICK, Raul S. **Sistema de autoria para criação de tutores aplicado a mundos virtuais.** Disponível em <http://www.lsc.inf.ufsc.br/trabalhosemcongressos/sbieAdja/art40.html>. Consultado em Março de 2002.

PEREIRA, Marcel Brito; NUNES, Maria das Graças V. **Algoritmos de extração de palavras-chave de textos em português.** Série de relatórios do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional – NILC – ICMC – USP. São Carlos, SP. Consultado em Outubro de 2001.

## 10. ANEXOS

### 10.1 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema AIDS

#### 10.1.1 Questionamentos da 1ª aplicação

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:32:49

Bianca: Qual a origem da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:33:21

Bianca: Quais os tipos de transmissão que estão cada vez mais em alta?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:34:06

Bianca: Existe algum tipo de transmissão que já está praticamente erradicada?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:35:08

Bianca: Uma criança gerada por uma mãe aidética pode nascer sem o vírus?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:35:32

Bianca: Quais os tipos de tratamentos mais eficazes?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:35:01

Gustavo: Qual o significado da sigla HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:36:07

Gustavo: Quais são os tipos de transmissão do vírus da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:37:05

Gustavo: Qual o tipo de transmissão que mais cresceu nestes últimos anos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:37:50

Gustavo: O vírus da AIDS tem cura?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:38:11

Gustavo: O vírus da AIDS tem cura?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

Apr 12, 2002 - 14:38:49

Gustavo: Qual o nome dado ao remédio que contém o vírus da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:27:58

Juli: É possível mulheres aidéticas gerarem filhos sem AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:28:19

Juli: O que é AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:29:01

Juli: Por que razão nunca se conseguiu uma vacina contra a AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:29:42

Juli: Como é o nome da enzima que o RNA do vírus da AIDS contém?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:30:05

Juli: Por que o HIV é um retrovírus?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

NOME DO USUÁRIO: Leticia

Apr 12, 2002 - 14:32:16

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:32:48

Leticia: Qual a constituição do vírus da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:33:29

Leticia: Que consequência sofre o organismo quando é parasitado pelo HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:34:15

Leticia: Quais são os tratamentos existentes para a AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:34:44

Leticia: Qual a finalidade do AZT no tratamento da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:35:27

Leticia: Que teste um indivíduo deve fazer para detectar se ele tem ou não AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:33:54

Maria: Quais são os sintomas mais comuns da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 2  
 Apr 12, 2002 - 14:34:49  
 Maria: Quais são os exames necessários para detectar a doença?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 3  
 Apr 12, 2002 - 14:35:43  
 Maria: Como é o tratamento da AIDS?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 4  
 Apr 12, 2002 - 14:36:42  
 Maria: Quais os medicamentos que fazem parte do coquetel?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 5  
 Apr 12, 2002 - 14:37:30  
 Maria: Tem a possibilidade de alguém ter o vírus e não desencadear a doença?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 1  
 Apr 12, 2002 - 14:45:08  
 Rosane1: Quando o vírus da AIDS se propagou no BRASIL?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 2  
 Apr 12, 2002 - 14:45:59  
 Rosane1: Por que quando o vírus se introduz no nosso corpo, ele não apresenta logo os sintomas?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 3  
 Apr 12, 2002 - 14:46:48  
 Rosane1: Existe algum tipo de transmissão que ainda não conhecemos?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 4  
 Apr 12, 2002 - 14:51:26  
 Rosane1: Quais os tipos de remédios que formam o chamado coquetel de remédios?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 5  
 Apr 12, 2002 - 14:53:05  
 Rosane1: Por que muitos de nós colocamos várias dificuldades para discutir sobre o assunto?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito

### *10.1.2 Questionamentos da 2ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1  
 Apr 15, 2002 - 15:03:23  
 Bianca: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito  
 Pergunta gravada número: 2  
 Apr 15, 2002 - 15:03:49  
 Bianca: Quando se tem AIDS é preciso ficar internado num hospital?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:04:11

Bianca: Até quantos anos o paciente pode resistir vivo com o vírus da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:04:32

Bianca: Quanto tempo leva para um soropositivo apresentar os sintomas da AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal

Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:05:05

Bianca: Quais os sintomas da AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal

Avaliação da resposta por Bianca: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:04:21

Rosane: olá.

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:04:37

Rosane: A camisinha realmente previne a infecção pelo HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:04:53

Rosane: O que significa AZT?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:05:17

Rosane: Como o vírus se introduz no nosso organismo?

Doutor: Na década de 80 através das relações homossexuais masculinas

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:05:37

Rosane: Por que se encontra dificuldade na produção da vacina?

Doutor: Porque o vírus sofre constantes mutações

Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 6

Apr 15, 2002 - 15:06:03

Rosane: Beijo na boca pode passar o vírus?

Doutor: Sim, muito raramente e desde que elas façam tratamento com AZT

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:06:48

juli: De onde veio o vírus da AIDS?

Doutor: Ainda não

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:07:08

juli: Quanto tempo vive uma pessoa que tem aids?

Doutor: Ainda não

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:07:30

juli: Em quanto tempo o vírus HIV se desenvolve?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:07:47

juli: Só a camisinha pode evitar a aids na relação sexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:08:05

juli: Se duas pessoas que contém a doença mantiverem relação sexual o que acontece?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:12:46

Maria: Pode-se comparar a AIDS ao Câncer?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:13:01

Maria: Se pega Aids no dentista?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:13:42

Maria: Uma pessoa pode ter o vírus e não transmitir para outra durante o ato sexual?

Doutor: tem , porque o sistema imunológico das pessoas é diferente e portanto, as respostas orgânicas são diferentes. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:13:58

Maria: O que é janela imunológica?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:14:14

Maria: Se pega Aids pela saliva?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:01:37

Gustavo: Há diferença entre soropositivo e Aidético?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:02:25

Gustavo: Que tipo de preconceito esse vírus causa?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:02:54

Gustavo: Como a escola deve se comportar quando sabe que um de seus alunos é portador da doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:03:39

Gustavo: Beijo na boca é um meio de transmissão do vírus HIV?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:04:03

Gustavo: Já existe algum remédio para prevenir a doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:07:24

Leticia: O que quer dizer ser Soropositivo ?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:07:55

Leticia: Por que durante o ato sexual é importante o uso de preservativos como a camisinha?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:08:26

Leticia: Como andam os tratamentos para a Aids hoje?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símbia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:08:51

Leticia: O que é o coquetel do dia seguinte?

Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir (Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epiriv ou 3TC); combivir (AZT + 3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor)

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:09:07

Leticia: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

### *10.1.3 Questionamentos da 3ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:35:25

Bia: O que é terapia combinada?



Doutor: Janela Imunológica é o período que a pessoa demora para desenvolver os anticorpos Anti-HIV. Este período é de até 6 meses após o contágio e neste tempo o exame para saber se a pessoa teve contato e está infectada poderá dar negativo.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:35:50

Bia: Como o homem pode pegar um vírus de um animal?

Doutor: Através de relações sexuais (anal, oral e vaginal), transfusão de sangue contaminado, seringas e agulhas contaminadas, de mãe para filho, durante o a gestação, parto ou aleitamento materno

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:36:08

Bia: Que exames são necessários para detectar a doença?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:36:39

Bia: Que remédios fazem parte do Coquetel?

Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir (Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor)

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:37:05

Bia: O coquetel de medicamentos pode causar vômito ou enjôo?

Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir (Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor)

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:38:06

Juli: Quais os sintomas da AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:38:42

Juli: Qual o tratamento existente?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:38:59

Juli: O que é um vírus?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:42:51

Juli: Podemos pegar AIDS com alicate ou tesourinha de unha?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Juli: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:43:08

Juli: Qual a diferença entre o HIV-1 e o HIV-2?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:31:46

Gustavo: O que é o HIV-2?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:32:05

Gustavo: Como o HIV age?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:33:12

Gustavo: Quanto tempo leva para o vírus aparecer no exame?

Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida.

Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:34:00

Gustavo: Dá para fazer o exame anti-HIV de graça?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:34:30

Gustavo: A camisinha é cem por cento segura?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:36:32

Leticia: O que permite a uma pessoa conviver anos e anos com o HIV, sem que se desencadeie o processo de AIDS?

Doutor: Cada pessoa tem uma resposta imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. Hoje, entretanto, é necessário acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:37:24

Leticia: O que são infecções oportunistas?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:38:10

Leticia: Existe mais de um tipo de HIV?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:39:49

Leticia: O uso do coquetel do dia seguinte por uma pessoa que transou com um soropositivo impede a contaminação pelo vírus?

Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:41:22

Leticia: o uso da camisinha feminina e masculina ao mesmo tempo protege mais contra a aids?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:32:20

Maria: Pode-se contrair o HIV ao manipular secreções de uma pessoa infectada?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:33:19

Maria: Qual o estado brasileiro com maior número de casos de aids?

Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:34:10

Maria: O que é grupo de risco?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:34:37

Maria: Qual a diferença entre uma pessoa portador do HIV e ter AIDS?

Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:35:30

Maria: Quais os países com maior número de casos de AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 18, 2002 - 14:30:14

Rosane: Durante o tratamento com as drogas antiretrovirais, pode-se tomar bebida alcoólica?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 18, 2002 - 14:31:13

Rosane: O lança perfume traz algum interferência no tratamento da AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 18, 2002 - 14:32:12

Rosane: Por que muitos aidéticos são super magros?

Doutor: Por várias razões: tabus adquiridos, falta de educação sexual

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 18, 2002 - 14:32:59

Rosane: Qual tipo de contágio é mais freqüente no Brasil?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 18, 2002 - 14:33:31

Rosane: Se a camisinha estourar durante o ato sexual com um soropositivo, o que devo fazer?

Doutor: Para evitar a transmissão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

#### *10.1.4 Questionamentos da 4ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:04:18

Bia 4: Existe risco de o paciente se infectar com o vírus da AIDS durante o tratamento odontológico?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:05:26

Bia 4: Como agem os medicamentos?

Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV – um vírus citopático, ou seja, capaz de destruir células – chama-se CD4, e é o responsável por "soar o alarme", isto é, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os pacientes com Aids mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas.

Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:05:56

Bia 4: Qual o risco de uma contaminação quando se recebe uma transfusão de sangue?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:06:13

Bia 4: Sexo oral com camisinha é necessário?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:06:58

Bia 4: O homossexual ainda faz parte do principal grupo de risco?

Doutor: Não está correto falar em "grupos de risco", atualmente. No início da epidemia era de fato limitado a homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o "comportamento de risco" e amplia-se isto hoje pelo conceito da "vulnerabilidade" individual das pessoas ao HIV.

Avaliação da resposta por Bia 4: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:02:36

Gustavo: Pra que serve o tratamento da AIDS?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a Síndrome

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:03:56

Gustavo: Relação sexual com mulher pode transmitir o HIV?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A

camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:05:05

Gustavo: Onde ocorreram os primeiros casos de AIDS no Brasil?

Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo que destes 6,4 milhões já faleceram.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:07:16

Gustavo: O que é infecção aguda pelo HIV?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:07:58

Gustavo: Que exames detectam a aids?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:02:33

Maria: O HIV pode tornar-se resistente aos medicamentos?

Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarreia, febre medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal, dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:03:21

Maria: O coquetel de drogas tem realmente produzido resultados positivos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:03:52

Maria: De que maneira uma mulher grávida transmite o vírus do HIV ao filho em gestação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:04:15

Maria: Bebês de uma mulher com AIDS podem não se infectar pelo vírus?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:04:40

Maria: Como posso exigir o uso da camisinha e não estimular a desconfiança com o parceiro?

Doutor: Para evitar a transmissão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:11:22

Rosane: Uma mulher pode engravidar de um homem soropositivo sem que o filho nasça com o HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:11:51

Rosane: Quais as praticas sexuais de maior risco para ser contaminado pelo HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:12:46

Rosane: Quais são os principais benefícios do coquetel de medicamentos para um portador do HIV?

Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir (Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor)

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:14:22

Rosane: Quais os sintomas mais frequentes da AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:15:49

Rosane: O portador de uma DST tem mais chance de transmitir o vírus?

Doutor: Ainda não

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:08:28

Leticia: Qual o tipo de HIV mais forte, o HIV-1 ou o HIV-2?

Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:09:12

Leticia: Como andam as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:09:57

Leticia: Por que a AIDS não pode ser passada pela saliva?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:10:41

Leticia: O que é janela imunológica?

Doutor: Janela Imunológica é o período que a pessoa demora para desenvolver os anticorpos Anti-HIV. Este período é de até 6 meses após o contágio e neste tempo o exame para saber se a pessoa teve contato e está infectada poderá dar negativo.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:11:14

Leticia: Pode acontecer desse período da janela imunológica ultrapassar os 6 meses?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:05:36

Juli: Quanto tempo leva um portador do HIV para apresentar os sintomas da AIDS?

Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:06:48

Juli: O tratamento para o HIV-2 é o mesmo que o HIV-1?

Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:07:44

Juli: O aborto é permitido para soropositivos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:08:56

Juli: Depois de quanto tempo de ter mantido relação sexual com uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS poderei transmitir o vírus para outra pessoa?

Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:09:22

Juli: Como evitar ou diminuir o risco de contaminação durante o sexo oral?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

### *10.1.5 Questionamentos da 5ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:36:56

Bia: Qual é a diferença entre o período de incubação e a janela imunológica?

Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não foram confirmados posteriormente pelos próprios autores.

Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:38:09

Bia: Como existe AIDS no esperma, há risco no sexo oral se não ejacular na boca?

Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem risco algum. Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, deve evitar fazê-lo durante o período menstrual.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:38:55

Bia: O suor de uma pessoa com AIDS transmite o vírus HIV para outra pessoa?

Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aitético, ou seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS. Significa estar na fase da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:40:20

Bia: Se uma mosquito pica uma pessoa com AIDS pode transmitir para outra pessoa?

Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:40:38

Bia: A AIDS sempre é adquirida em qualquer sexo sem camisinha?

Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem risco algum. Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de PVC, usado na cozinha (rolpac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, deve evitar fazê-lo durante o período menstrual.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:33:35

Gustavo: Que sintomas um aidético apresenta?

Doutor: Primeiro porque o emagrecimento faz parte da sintomatologia do aidético. Secundariamente, porque eles apresentam diarreia e infecções oportunistas que levam também ao emagrecimento

Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:34:56

Gustavo: O uso da vaselina no sexo anal diminui os risco de contaminação?

Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem risco algum. Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de PVC, usado na cozinha (rolpac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, deve evitar fazê-lo durante o período menstrual.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:35:51

Gustavo: Que tipo de transmissão é mais comum entre adolescentes?

Doutor: Todos os tipos de transmissão são bastante divulgados, como sexual (hétero, homo ou bissexual), transfusão de sangue contaminado, leite materno, agulhas e seringas contaminadas

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:36:34

Gustavo: O sexo oral transmite AIDS?

Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem risco algum. Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de PVC, usado na cozinha (rolpac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, deve evitar fazê-lo durante o período menstrual.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:37:07



Gustavo: Uma pessoa pode pegar AIDS doando sangue?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:35:12

Juli: Quando o vírus da AIDS foi identificado pela primeira vez?

Doutor: Na década de 80 através das relações homossexuais masculinas

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:37:40

Juli: A pessoa corre risco de pegar AIDS mesmo usando camisinha?

Doutor: Não, pois o atrito entre elas aumenta muito o risco de rasgar durante a transa. É muito mais seguro escolher uma só e ir em frente.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:38:07

Juli: Eu tenho que fazer o teste anti-HIV se estiver grávida?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:38:51

Juli: Se eu já tiver alguma doença por causa da Aids faz alguma diferença para a gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:39:24

Juli: É mais provável a transmissão do HIV através do parto normal ou da cesariana?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:31:53

Rosane: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:33:15

Rosane: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:33:53

Rosane: O que posso fazer para evitar a transmissão do HIV?

Doutor: Trata-se de alguns sintomas que aparecem logo depois da transmissão do vírus. Acontece em 50% a 90% dos pacientes, sendo que alguns sintomas podem ser confundidos com uma simples gripe: febre alta, dores musculares e articulares, gânglios, dor de garganta, vermelhidão no corpo e perda de peso figuram entre eles. Tendem a desaparecer espontaneamente após aproximadamente 14 dias.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:35:28

Rosane: O portador de uma DST tem mais chance de ser contaminado durante o ato sexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:36:08

Rosane: O que são infecções oportunistas?

Doutor: O HIV danifica o sistema de defesa do organismo contra agentes agressores. Se esse sistema falha, muitas doenças aproveitam-se disso e por isso são denominadas oportunistas

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:37:03

Rosane: QUANTOS CASOS DE AIDS TEM NO MUNDO E NO BRASIL?

Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual. Até o início de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:32:38

Leticia: Quais são as camisinhas mais seguras?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta

Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:36:52

Leticia: Tem algum risco na prática de sexo anal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:38:33

Leticia: Até quanto tempo a pessoa infectada pelo vírus resiste a morte?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:39:08

Leticia: O que é carga viral?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:39:48

Leticia: As campanhas de prevenção tem ajudado modificar os hábitos sexuais das pessoas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:32:05

Maria: O que é terapia combinada?

Doutor: Significa usar duas ou mais drogas juntas, o que popularmente se conhece como coquetel. Monoterapia é o uso de uma droga por vez. Foi provado que terapia combinada é muito mais eficaz e duradoura do que monoterapia, na tarefa de reduzir a quantidade de HIV presente no organismo, prevenindo, assim, o desenvolvimento dos sintomas da Aids: quando uma população de vírus é combatida por mais de uma droga, torna-se mais raro o surgimento de vírus mutantes ou resistentes.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 29, 2002 - 14:33:02

Maria: POR QUE SE FALA TANTO EM AIDS?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 29, 2002 - 14:34:40

Maria: as pesquisa com vacinas no Brasil estão funcionando?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 29, 2002 - 14:35:42

Maria: Viciados em drogas fazem parte de um grupo de risco?

Doutor: Não está correto falar em “grupos de risco”, atualmente.No início da epidemia era de fato limitado a homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas ao HIV.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 29, 2002 - 14:36:44

Maria: O que é comportamento de risco?

Doutor: Não está correto falar em “grupos de risco”, atualmente.No início da epidemia era de fato limitado a homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas ao HIV.

Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito

### *10.1.6 Questionamentos da 6ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:29:57

Bia: Se meu parceiro omitiu que era soropositivo e me infectou, o que posso fazer?

Doutor: Usar camisinha nas relações sexuais, Exigir que o sangue e os hemoderivados sejam testados para o HIV. Não compartilhar agulhas e seringas. E, sobretudo, conversar sobre o assunto com os amigos, principalmente com seu(a) parceiro(a) sexual.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:32:07

Bia: Se o meu companheiro for soropositivo e eu não, posso ter filhos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:32:45

Bia: O que é HIV?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:33:59

Bia: O que é grupo de risco?

Doutor: Não está correto falar em grupos de risco, atualmente.No início da epidemia era de fato limitado a homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas ao HIV.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:34:36

Bia: O que é comportamento de risco?

Doutor: Durante a década de 1980 foi usada a expressão “grupo de risco” e depois passou-se a usar o conceito do “comportamento de risco”, que era composto pelas pessoas que tinham mais possibilidade de se contaminar, por estarem mais expostas aos riscos de transmissão. Como agora o vírus se espalhou de forma geral fala-se em “vulnerabilidade” das pessoas e da sociedade ao vírus.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:37:42

Juli: Por que a AIDS não tem cura?

Doutor: Ainda não

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:38:27

Juli: Um aidético pode se aposentar por ter a doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:38:52

Juli: Por que dizem que a aids não se transmite pela saliva?

Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:39:31

Juli: O vírus pode ter tido origem em laboratórios?

Doutor: Tem várias idéias populares sobre isto. Vai do cientista maluco que manipulou o vírus, até o mais provável, que é a mutação do vírus que originalmente estava na população dos macacos na África. Pela proximidade da população local com os animais é fácil imaginar a transmissão para os seres humanos de um vírus que teve uma mutação e adaptou-se aos seres humanos.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:40:07

Juli: Qual o motivo da queda de cabelo e emagrecimento de um aidético?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:04

Rosane: Se eu for soropositiva posso continuar tendo relações sexuais?

Doutor: O uso do preservativo é essencial porque, com o passar dos anos, os anticorpos do soropositivo vão perdendo sua capacidade de neutralizar o HIV. Além disso, quando ocorre reinfecção pelo vírus da Aids pode-se receber espécies de vírus diferentes das de origem, que, eventualmente, têm maior poder de infectividade, causando maiores danos, podendo, inclusive, dificultar o controle da doença. Outro problema é ser recontaminado com vírus que já sejam resistentes a medicamentos ainda não utilizados, impedindo o seu emprego futuro.

Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:31:35

Rosane: Uma pessoa com AIDS pode amamentar?

Doutor: Picadas de mosquito, pulgas, piolhos, percevejos e outros insetos que possam estar presentes na casa de um portador ou doente de Aids não transmitem AIDS. Os mosquitos não podem transmitir o vírus, pois: primeiro, sugam sangue e injetam saliva; segundo, o HIV morre ao penetrar no organismo destes insetos;

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:32:05

Rosane: Como pode ocorrer a transmissão do HIV para o bebê?

Doutor: Não se tem conhecimento de transmissão pelo beijo. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos definitivamente não transmitem o HIV

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:33:00

Maria: Quais os tipos de transmissão da AIDS?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:33:42

Maria: Relação anal transmite AIDS?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:34:37

Maria: É verdade que os riscos de se pegar aids com o sexo oral é pequeno?

Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não foram confirmados posteriormente pelos próprios autores.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:34:58

Maria: Como funciona a testagem do sangue que servirá para transfusão?

Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não foram confirmados posteriormente pelos próprios autores.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:35:23

Maria: Em que momento deve-se fazer o teste anti-HIV?

Doutor: É muito importante que você queira fazer o teste. Você poderá conversar com o seu médico do pré-natal sobre o teste anti-HIV, se informar nas Organizações Não Governamentais (ONGs) que lutam contra a Aids ou nos Centros de Testagem Anônima, mas a decisão é sua. O teste anti-HIV não pode, em hipótese alguma, ser obrigatório, mas deve estar disponível e oferecido a todas as gestantes.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:32:58

Gustavo: Sexo entre soropositivos precisa de proteção?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:33:49

Gustavo: já existem casos de pessoas contaminadas com o HIV-2 no Brasil?

Doutor: Até o final de 1996, a Organização Mundial de Saúde anunciou que havia no mundo 22.6 milhões de pessoas vivendo com HIV com um aumento anual de mais de 3 milhões de pessoas. O número de Aids, foi desde início da epidemia de 8.4 milhões casos de Aids sendo que 6.4 milhões já faleceram. Dados do Brasil, que foram notificados ao Ministério da Saúde até fevereiro de 1997, mostra que 103.262 pessoas tenham sido notificados com uma razão de três homens para cada mulher. Os Estados com mais casos notificados são em: São Paulo (53 mil), Rio de Janeiro (15 mil), Minas Gerais (6.7 mil), Rio Grande do Sul (5.2 mil) e Santa Catarina (3.2 mil).

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:34:37

Gustavo: Qual a média de vida de um aidético?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:35:00

Gustavo: Quem descobriu o vírus HIV?

Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:36:32

Gustavo: Por que a Aids deixa o organismo da pessoa indefeso?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:34:01

Leticia: Posso pegar AIDS no dentista?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:35:24

Leticia: Como uma pessoa pode pegar AIDS através de um transplante de órgão?

Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:36:46

Leticia: Existem casos de inseminação artificial com sêmen contaminado?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:37:32

Leticia: O que é triagem para o HIV?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:37:56

Leticia: Quanto tempo o vírus da AIDS permanece vivo no meio ambiente?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

### *10.1.7 Questionamentos da 7ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:02:21

Bia: Como estão as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS?

Doutor: As pesquisas continuam aumentando o conhecimento do HIV. Como resultado disso, tratamentos recomendados têm mudado muitas vezes. Estudos recentes realizados por pesquisadores americanos mostram que o HIV pode ser neutralizado totalmente com uma terapia genética capaz de informar às células infectadas como devem impedir que o vírus se multiplique. Em relação aos estudos brasileiros, nos últimos congressos mundiais de Aids, tem sido elevado o número de trabalhos científicos conduzidos por brasileiros. Em 1990, por exemplo, no Congresso de São Francisco, o Brasil foi o 3º país com maior número de trabalhos na área da epidemiologia.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:03:14

Bia: As drogas contra o vírus da Aids são realmente eficientes?

Doutor: Por material genético (RNA) e por proteínas

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:04:17

Bia: Em relação à transmissão heterossexual, quem adquire o HIV com mais facilidade, o homem ou a mulher?

Doutor: A primeira coisa a ser esclarecida é sobre a transmissão da infecção para o bebê. Não é o pai que transmite e sim a mãe. Desta forma, se a mãe do bebê não for portadora da infecção pelo HIV não haverá transmissão. A outra coisa importante é que, quando a mulher não é portadora da infecção pelo HIV e o parceiro dela é infectado, se eles tiverem relações sexuais sem preservativo na tentativa de engravidar a transmissão para a mulher pode ocorrer. Atualmente está sendo utilizada uma técnica, que ainda é experimental, que consiste na lavagem do esperma para a diminuição da quantidade de vírus. Depois que o esperma é lavado é realizada uma inseminação artificial. No entanto, apesar de várias inseminações utilizando esta técnica terem sido feitas com sucesso, não existe como garantir segurança de 100% para a mulher.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:05:16

Bia: Existem restrições à prática de esportes para o soropositivo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 16:05:37

Bia: Existem outros vírus que causam AIDS no ser humano?

Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:01:24

Maria: Após constatar que a pessoa é soropositiva, deve ser internada?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:01:49

Maria: Uma gripe pode ser fatal para um soropositivo?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:02:20

Maria: Podemos pegar AIDS através de uma transfusão de sangue?

Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:02:36

Maria: Como se dá a infecção no caso de agulha e seringa contaminadas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 16:02:59

Maria: Há transmissão do vírus através do inseto?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluidos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:08:18

Ieticia: Pode-se contrair o HIV mesmo usando o preservativo?

Doutor: Quando existir o contato da pele com fluidos corporais ou secreções (sangue, sêmen, secreção pré-seminal, secreção vaginal e leite materno) a transmissão do HIV só poderá ocorrer se houver uma "porta de entrada", como ferida aberta, lesão ou perda da integridade da pele tipo úlcera, escoriação, sangramento ou qualquer situação em que possa haver a absorção destes líquidos

Avaliação da resposta por letícia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:08:48

letícia: Que grau de certeza podemos ter de que sangue ou hemoderivados não mais transmitem o HIV?

Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos.

Avaliação da resposta por letícia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:09:14

letícia: Quais as doenças mais comuns de um aidsético pegar?

Doutor: Todas aquelas doenças que têm relação com a imunidade, ou seja, qualquer tipo de infecção, principalmente pneumonia, tuberculose, diarreia e outras

Avaliação da resposta por letícia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:09:30

letícia: Manchas na pele são comuns em aidséticos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por letícia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 16:10:27

letícia: O vírus transmitido por soropositivo ou pacientes de aids tem conseqüências diferentes, isto é, mais perigoso quando a pessoa já evoluiu para aids?

Doutor: Não necessariamente, a não ser que o paciente esteja muito debilitado, com alguma infecção e nos estágios finais da doença. Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem diminuído a possibilidade de internação do paciente.

Avaliação da resposta por letícia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:03:11

Gustavo: É possível que antes de 1981 pessoas tenham morrido de aids?

Doutor: Sempre que há lesões na pele ou mucosas, aumenta o risco de adquirir o HIV. Na saliva, porém, a eliminação de vírus é muito baixa. Desta forma, o risco com beijo na boca é praticamente zero.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:04:00

gustavo: Quais os primeiros países em casos de aids?

Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo que destes 6,4 milhões já faleceram.

Avaliação da resposta por gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:04:38

gustavo: O que é janela imunológica?

Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não foram confirmados posteriormente pelos próprios autores.

Avaliação da resposta por gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:05:24

gustavo: Os exames anti-HIV são eficientes?

Doutor: Sim. Ele pode ser feito de graça nos Centros de Testagem Anônima; Postos de Saúde e Hospitais Públicos. Os médicos devem sugerir às grávidas que se submetam ao exame durante o pré-natal, conforme determina o Ministério da Saúde.

Avaliação da resposta por gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5



May 13, 2002 - 16:06:05

gustavo: Em que momento deve-se fazer o teste anti-HIV?

Doutor: A partir do momento que achar que teve contato com o vírus, deve procurar um médico para esclarecer suas dúvidas e orientá-lo quanto aos procedimentos que deve adotar.

Avaliação da resposta por gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:03:04

Rosane: Quais as perspectivas de uma vacina para aids?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:03:38

Rosane: Caso uma pessoa tenha certeza de ser portador do vírus e, conscientemente, transmitir para os outros, é considerado crime?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:04:07

Rosane: Um soropositivo pode transmitir AIDS mesmo sem ter desenvolvido a doença?

Doutor: A partir de uma observação clínica e realização de perícia médica pelo INSS, o portador de HIV que já tenha desenvolvido qualquer doença incapacitante, é que poderá se aposentar por invalidez.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:04:50

Rosane: Como se dá a evolução da aids?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantêm os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 16:05:30

Rosane: Quais as forma de contágio com o vírus?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 16:06:38

Juli: Se beijo na boca de uma pessoa soropositiva e tenho um ferimento na boca, posso me infectar?

Doutor: Sempre que há lesões na pele ou mucosas, aumenta o risco de adquirir o HIV. Na saliva, porém, a eliminação de vírus é muito baixa. Desta forma, o risco com beijo na boca é praticamente zero.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 16:07:09

Juli: Num contato sexual com soropositivo há possibilidade de não haver infecção?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 16:07:47

Juli: O HIV sobrevive no meio ambiente?

Doutor: São os exames laboratoriais que se fazem no sangue de um doador de sangue ou de órgãos, antes da transfusão ou do transplante, no sentido de verificar se este doador está ou não contaminado pelo HIV

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 16:08:24

Juli: A camisinha feminina pode se utilizada mais de uma vez?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebe com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 16:08:46

Juli: Qual o melhor preservativo: a camisinha feminina ou a masculina?

Doutor: Não, pois o atrito entre elas aumenta muito o risco de rasgar durante a transa. É muito mais seguro escolher uma só e ir em frente.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

### *10.1.8 Questionamentos da 8ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 15:03:17

Bia: O que é imunodeficiência?

Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS, penetra no corpo humano por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 15:03:58

Bia: Quando ocorreu o primeiro caso de AIDS no Brasil?

Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual. Até o início de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:04:41

Bia: O vírus da AIDS sobrevive no meio ambiente?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:06:00

Bia: Quais os meios de transmissão do HIV?

Doutor: Não se tem conhecimento de transmissão pelo beijo. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos definitivamente não transmitem o HIV

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:06:39

Bia: Se uma mulher grávida tem relação sexual com o portador do vírus, a criança pode ser infectada?

Doutor: Antes da existência do medicamento AZT, o risco da mãe transmitir o HIV para o bebê era de 30% para a infecção da criança. Ou seja 70% não eram infectados. Com a introdução do teste na rotina do prenatal (que deve ser solicitado sempre) as mães infectadas devem receber o medicamento e com isto o risco diminui para menos de 10%. Há esperança que com as novas drogas (ainda em fase de estudos) este numero fica em torno de 2%.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 15:01:15

Gustavo: Num contato sexual com soropositivo há possibilidade de não haver infecção?

Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 15:01:34

Gustavo: Qual a importância do AZT para o tratamento da AIDS?

Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:01:57

Gustavo: O que é transcriptase reversa?

Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS, penetra no corpo humano por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:02:16

Gustavo: Onde uma pessoa pode fazer o exame para saber se está com AIDS?

Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:02:31

Gustavo: Ao detectar que o sangue doado está contaminado pelo HIV, o doador é avisado?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 15:03:58

Leticia: Quem doa sangue corre o risco de se contaminar com o HIV

Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: Abstinência sexual, carície, beijo, etc.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 15:04:31

Leticia: Pode demorar anos até a pessoa perceber que foi contaminada pelo vírus da Aids?

Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:04:49

Leticia: Como saber se somos soropositivos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:05:29

Leticia: Um dentista pode pegar AIDS de um paciente?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:06:12

Leticia: De onde veio o vírus da AIDS?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 14:58:59

Rosane: Quem só transa com uma pessoa de sua confiança está sujeito a contaminação pelo HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 14:59:35

Rosane: O coquetel de medicamentos está acessível a todas as camadas sociais?

Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarreia, febre medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal, dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:00:07

Rosane: Se pega Aids pela saliva?

Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:00:25

Rosane: Qual o meio de transmissão que mais cresceu nesses últimos anos?

Doutor: A transmissão entre adolescentes

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:00:59

Rosane: Se uma pessoa pegou aids através de uma transfusão, ela tem direito a alguma indenização?

Doutor: O uso da camisinha é sexo mais seguro. Não é uma garantia absoluta mais faz a relação sexual ser muito mais seguro e é a única opção que existe além da abstinência sexual. Tomando o seu tempo para aprender o uso correto da camisinha, saber negociar o uso com o seu parceiro e fazer a camisinha parte do jogo erótico você diminuirá em muito o seu risco.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 15:07:58

Juli: Quais os sintomas da AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 15:08:28

Juli: Qual o país com o maior número de casos de AIDS?

Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo que destes 6,4 milhões já faleceram.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:09:01

Juli: Por que os aidéticos são discriminados?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:09:19

Juli: Um só relacionamento sexual é suficiente para se contaminar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:09:50

Juli: Qual a melhor forma de prevenção da aids?

Doutor: Por material genético (RNA) e por proteínas

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 23, 2002 - 15:03:20

Maria: O vírus só sobrevive no corpo humano?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 23, 2002 - 15:03:44

Maria: Quais os efeitos colaterais que o coquetel de medicamentos pode causar?

Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarreia, febre medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal, dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 23, 2002 - 15:05:04

Maria: Quantos tipos de vírus da AIDS existem?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 23, 2002 - 15:05:53

Maria: Qual a diferença entre o HIV-1 e o HIV-2?

Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 23, 2002 - 15:06:45

Maria: Qual vírus é mais nocivo, o HIV-1 ou o HIV-2?

Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

### *10.1.9 Questionamentos da 9ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:18

Bia: O que é sexo seguro?

Doutor: AZT significa azidotimidina

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:48

Bia: Propor o uso de camisinha a parceira, não intimidaria ou geraria desconfiança no parceiro?

Doutor: Numa relação nova é mais fácil porque se pode estabelecer as normas na nova relação. No caso de uma relação duradoura fica mais complicado pela desconfiança que pode surgir. A única solução viável é o dialogo sobre um assunto importante e se lembrando da vulnerabilidade/responsabilidade individual e a nossa relação com a coletividade (neste caso o parceiro).

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:21

Bia: É verdade que tem aumentado o número de mulheres casadas que pegam Aids dos maridos?

Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem risco algum. Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, deve evitar fazê-lo durante o período menstrual.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:33:37

Bia: O coquetel de medicamentos pode curar ?

Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarreia, febre medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal, dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:33:55

Bia: O que é HIV?

Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS, penetra no corpo humano por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:34:28

Leticia: Mulheres são mais vulneráveis ao vírus do que homens?

Doutor: São microorganismos de dimensões minúsculas, destituídos de metabolismo autônomo, capazes de se reproduzir e de se adaptar ao meio através de mutações. Possuem ácido nucléico no seu interior, ou seja, RNA ou DNA isoladamente, dependendo do tipo de vírus

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:35:39

Leticia: O que é mais arriscado, sexo anal ou vaginal?

Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: Abstinência sexual, carície, beijo, etc.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:36:10

Leticia: Posso pegar AIDS por usar o mesmo vaso sanitário de um aidético?

Doutor: O uso da camisinha é sexo mais seguro. Não é uma garantia absoluta mais faz a relação sexual ser muito mais seguro e é a única opção que existe além da abstinência sexual. Tomando o seu tempo para aprender o uso correto da camisinha, saber negociar o uso com o seu parceiro e fazer a camisinha parte do jogo erótico você diminuirá em muito o seu risco.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:37:10

Leticia: Uma mulher soropositiva que engravidou por acidente pode fazer um aborto?

Doutor: A primeira coisa a ser esclarecida é sobre a transmissão da infecção para o bebê. Não é o pai que transmite e sim a mãe. Desta forma, se a mãe do bebê não for portadora da infecção pelo HIV não haverá transmissão. A outra coisa importante é que, quando a mulher não é portadora da infecção pelo HIV e o parceiro dela é infectado, se eles tiverem relações sexuais sem preservativo na tentativa de engravidar a transmissão para a mulher pode ocorrer. Atualmente está sendo utilizada uma técnica, que ainda é experimental, que consiste na lavagem do esperma para a diminuição da quantidade de vírus. Depois que o esperma é lavado é realizada uma

inseminação artificial. No entanto, apesar de várias inseminações utilizando esta técnica terem sido feitas com sucesso, não existe como garantir segurança de 100% para a mulher.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:37:48

Leticia: Quais os sintomas da doença?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:31:38

Gustavo: Qual a causa do emagrecimento de aidéticos?

Doutor: Toda a sintomatologia da AIDS é decorrente de imunodeficiência orgânica causada pelo HIV no organismo

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:14

Gustavo: Os homossexuais ainda fazem parte de um grupo de risco?

Doutor: Não está correto falar em grupos de risco, atualmente.No início da epidemia era de fato limitado a homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o comportamento de risco e amplia-se isto hoje pelo conceito da vulnerabilidade individual das pessoas ao HIV.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:32:50

Gustavo: É possível viver normalmente com o vírus HIV?

Doutor: Alguns estudos apresentados em 1998 mostraram uma maior redução da transmissão vertical do HIV, com a cesariana eletiva (realizada antes de entrar em trabalho de parto), em comparação com o parto normal (vaginal). O médico obstetra e a paciente devem avaliar os riscos e benefícios envolvidos com cuidado, para então decidir o que fazer.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:33:25

Gustavo: Por que alguns aidéticos apresentam manchas vermelhas no corpo?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:33:48

Gustavo: Como pode ocorrer a transmissão para o bebê?

Doutor: O vírus passa pela placenta, mais o risco aumenta durante o parto (sempre há uma troca de pouco sangue neste momento entre a mãe e a criança) e no período do aleitamento materno pela presença do vírus no leite.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:05

Rosane: Existe entidades de apoio aos Aidéticos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:32

Rosane: O que o governo pode fazer para diminuir os casos de aids no país?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:36

Rosane: Por que se fala que a mulher se infecta mais facilmente do que o homem nas relações heterossexuais?

Doutor: Em uma relação heterossexual entre parceiros discordantes existe maior probabilidade de a mulher soronegativa ser contaminada pelo parceiro soropositivo para o HIV do que o contrário. A maioria destes estudos é realizada através do acompanhamento de casais discordantes em relação à contaminação pelo HIV e, em geral, abrangem um número muito maior de casais em que o elemento infectado pelo HIV, é o homem. A taxa de soroc conversão entre as parceiras inicialmente negativas de homens soropositivos oscila em torno de 40% nos diferentes trabalhos. Quando o caso índice é a mulher, a taxa de conversão do parceiro varia entre os diferentes trabalhos, de 0 até em torno de 15 a 20%.

Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:34:25

Rosane: Como estão as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS?

Doutor: As pesquisas continuam aumentando o conhecimento do HIV. Como resultado disso, tratamentos recomendados têm mudado muitas vezes. Estudos recentes realizados por pesquisadores americanos mostram que o HIV pode ser neutralizado totalmente com uma terapia genética capaz de informar às células infectadas como devem impedir que o vírus se multiplique. Em relação aos estudos brasileiros, nos últimos congressos mundiais de Aids, tem sido elevado o número de trabalhos científicos conduzidos por brasileiros. Em 1990, por exemplo, no Congresso de São Francisco, o Brasil foi o 3º país com maior número de trabalhos na área da epidemiologia.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:45

Rosane: Quantos tipos de vírus existem?

Doutor: Existem dois tipos: o HIV1 e o HIV2, o mais comum é o HIV1. Os casos com o HIV2 são bastante raros e de conseqüências clínicas menos graves que o primeiro. Praticamente não temos levantamento epidemiológico sobre número de casos pelo HIV2, no Brasil.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:52

Maria: Qual vírus atinge mais o sistema imunológico, o HIV-1 ou o HIV-2?

Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família.

Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:33:29

Maria: Qual a porcentagem de homens e mulheres com o vírus?

Doutor: O HIV-2 é provavelmente um vírus um pouco mais adaptado ao ser humano. Um vírus adaptado é aquele que não mata o seu hospedeiro rapidamente e tem portanto a chance de sobreviver mais longamente. O HIV-2 tem período de latência maior, transmissibilidade menor, carga viral menor e provavelmente previne superinfecção pelo HIV-1. No Brasil não há nenhum caso de infecção pelo HIV-2

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:56

Maria: O que significa AIDS?

Doutor: AZT significa azidotimidina

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:34:24

Maria: O que são doenças oportunistas?

Doutor: AZT significa azidotimidina

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:31

Maria: O que são doenças oportunistas?

Doutor: AZT significa azidotimidina

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

Jun 7, 2002 - 15:35:01

Maria: Quais as doenças oportunistas que em geral atingem um aidético?



Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:31:26

Juliana: Se uma empresa demitir um funcionário por ele ser soropositivo, ela pode ser processada?

Doutor: Não, se o indivíduo possuir um sistema imunológico equilibrado. Um paciente que evoluiu para aids e se encontra muito debilitado qualquer infecção pode comprometer o quadro clínico do paciente

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:31:48

Juliana: Por que tantas pessoas se contaminam com a AIDS?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:04

Juliana: Preciso contar ao meu parceiro que sou soropositiva?

Doutor: Você pode abrir um processo penal contra ele, seja seu marido, companheiro ou simplesmente parceiro. Mas existem divergências. Ele poderá ser enquadrado em crime de perigo de contágio venéreo/perigo de contágio de moléstia grave (artigos 130 e 131 do Código Penal), lesão corporal (artigo 129 do código penal) e homicídio (artigo 121 do Código Penal). É possível ainda, um processo cível objetivando indenização por perdas e danos.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:33:53

Juliana: A AIDS pode nunca se manifestar?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:50

Juliana: Planos de saúde são obrigados a cobrir despesas de um aidético?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

### *10.1.10 Questionamentos da 10ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:18:32

Leticia: Quais as formas de contágio da aids?

Doutor: Certos ensaios clínicos com algumas preparações vacinais, até a presente data, estão em fase de estudos em voluntários, para avaliação da segurança, tolerabilidade e toxicidade e para obtenção de informações iniciais sobre imunogenicidade (capacidade de gerar resposta imune). Por outro lado, há possibilidade de pior evolução da doença nas pessoas que eventualmente contraíam o vírus após vacinadas e isto se baseia no fato de a vacina poder desencadear a produção de anticorpos ineficazes ou não neutralizantes. Os anticorpos não neutralizantes poderiam aumentar a taxa de replicação viral, provavelmente por facilitar a penetração do HIV no interior dos macrófagos. O aumento da taxa de replicação viral na presença destes anticorpos ineficazes já foi detectado in vitro. Entretanto, até a presente data, não há evidências de que estes fenômenos tenham qualquer significado in vivo, ou seja, nos ensaios com humanos. Apesar destas preocupações serem especulativas, são de grande importância para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura.

Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:19:05

Leticia: Quem descobriu o vírus HIV?

Doutor: O francês Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:20:09

Leticia: Por que os sintomas da AIDS não aparecem logo depois que o vírus se introduz no nosso organismo?

Doutor: Porque todos os vírus apresentam um período de latência chamada de "janela Imunológica", onde ainda não são produzidos anticorpos contra eles

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:20:38

Leticia: Os exames para se detectar a aids são seguros?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:21:06

Leticia: O que é melhor para uma o bebê de um soropositivo: Parto normal ou cesariana

Doutor: Alguns estudos apresentados em 1998 mostraram uma maior redução da transmissão vertical do HIV, com a cesariana eletiva (realizada antes de entrar em trabalho de parto), em comparação com o parto normal (vaginal). O médico obstetra e a paciente devem avaliar os riscos e benefícios envolvidos com cuidado, para então decidir o que fazer.

Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:16:40

Juli: Pra que serve o coquetel do dia seguinte?

Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado.

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:17:34

Juli: Campanhas de prevenção podem ajudar a diminuir os casos de AIDS?

Doutor: Proporcionar educação e valores sobre sexualidade e prática de sexo seguro de acordo com o grupos alvos na sociedade; facilitar acesso da população aos preservativos; distribuir seringas para evitar o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas; melhorar a qualidade de serviço de bancos de sangue.

Avaliação da resposta por Juli: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:18:02

Juli: O que é o sarcoma de Kaposi?

Doutor: retrovírus é um tipo de vírus

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:18:51

Juli: Como se transmite o vírus?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:19:22

Juli: Existe a possibilidade de o HIV não ser a causa da Aids?

Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:15:41

Rosane: O que quer dizer ser soropositivo?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:16:49

Rosane: O que quer dizer soroconversão?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:17:15

Rosane: Por que a aids deixa o organismo da pessoa indefeso?

Doutor: Porque o HIV ataca os linfócitos T do organismo, que são células encarregadas da defesa orgânica.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:17:37

Rosane: O que é AIDS?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:18:26

Rosane: Pra que um aidético deve fazer tratamento se a AIDS não tem cura?

Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:18:09

Bia: O que é o HIV-2?

Doutor: O HIV-2 é um outro retrovírus humano que é encontrado principalmente na África. Ele é menos transmissível do que o HIV-1, está associado com uma menor carga viral e uma taxa menor de redução do CD4 e da progressão clínica da doença, sendo, portanto, menos lesivo do que o HIV-1

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:19:48

Bia: Quais os estados Brasileiros com maior número de casos de AIDS?

Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual. Até o início de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:20:38

Bia: Como o Pará se apresenta em números de casos de AIDS?

Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo que destes 6,4 milhões já faleceram.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:21:46

Bia: O coquetel de drogas tem realmente produzido resultados positivos?

Doutor: Ainda sabemos relativamente pouco sobre os efeitos dessas drogas. Sabemos que muitos pacientes reagem de forma positivo ao coquetel de medicamentos. São muito comprimidos e há efeitos colaterais importantes e existirá sempre a possibilidade de resistência a estas drogas. Por outro lado, pelo seu preço elevadíssimo, é difícil que isto seja uma realidade para saúde pública em geral em quanto não foi feita uma

avaliação clara dos benefícios das drogas (como a melhora dos pacientes e diminuição das internações) enquanto que outras prioridades na saúde pública são esquecidas.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:22:20

Bia: Quais os modos mais freqüentes de contaminação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:17:44

Gustavo: Animais podem ser contaminados pelo vírus?

Doutor: Tem várias idéias populares sobre isto. Vai do cientista maluco que manipulou o vírus, até o mais provável, que é a mutação do vírus que originalmente estava na população dos macacos na África. Pela proximidade da população local com os animais é fácil imaginar a transmissão para os seres humanos de um vírus que teve uma mutação e adaptou-se aos seres humanos.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:18:40

Gustavo: Qual o tempo para aparecerem os primeiros sintoma da doença?

Doutor: Para saber se está infectado ou não, o indivíduo deve esperar, em média, três meses após à exposição a uma situação de risco, para só depois submeter-se ao teste anti-HIV. Este período é chamado pelos médicos de “janela imunológica”, isto é, trata-se do tempo necessário para que o organismo produza quantidade suficiente de anticorpos contra o vírus, ao ponto de ser detectada pelos exames de sangue.

Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:19:32

Gustavo: Por que muitas pessoas, mesmo sabendo da gravidade da doença, não se previnem?

Doutor: 75% dos bebês que apresentam um teste HIV positivo ao nascer se tornam soro-negativos nos primeiros 18 meses de vida sem qualquer medicação. Isto acontece porque as crianças nascem sem sistema imunológico próprio e, quando desenvolvem o seu sistema imunológico, em 75% dos casos descartam naturalmente os anticorpos recebidos da mãe.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:20:13

Gustavo: É possível contrair o vírus HIV por beber do mesmo copo ou utilizar os talheres de uma pessoa infectada pelo vírus?

Doutor: Quando existir o contato da pele com fluídos corporais ou secreções (sangue, sêmen, secreção pré-seminal, secreção vaginal e leite materno) a transmissão do HIV só poderá ocorrer se houver uma “porta de entrada”, como ferida aberta, lesão ou perda da integridade da pele tipo úlcera, escoriação, sangramento ou qualquer situação em que possa haver a absorção destes líquidos

Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:20:40

Gustavo: Por que tomar medicamentos anti-HIV?

Doutor: A partir do momento que achar que teve contato com o vírus, deve procurar um médico para esclarecer suas dúvidas e orientá-lo quanto aos procedimentos que deve adotar.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:17:52

Maria: A aids é fatal?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:18:20

Maria: Que médico trata a AIDS?

Doutor: AIDS tem provocado muita discussão sobre aspectos éticos, legais e dos direitos humanos. Isto é bom e tem funcionado como modelo para pensar sobre como solucionar problemas ligados a outras doenças (com as outras DSTs). Como exemplo, podemos mencionar os testes obrigatórios em certas populações, discriminação

nos hospitais e nos planos de saúde, tratamento oferecido pelo estado; aspetos confidenciais sobre registros de pacientes, etc.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:18:57

Maria: O resultado do teste anti-HIV indica que a pessoa tem aids?

Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevivência do paciente.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:19:45

Maria: Existe sangue artificial?

Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovírus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:20:18

Maria: Relação sexual com mulher pode transmitir o HIV?

Doutor: A secreção vaginal também transmite o vírus. Os homens são menos vulneráveis a infecção pelo HIV do que as mulheres, no que se refere à transmissão heterossexual: a área da mucosa peniana é menor do que a da vagina, ficando, portanto, menos exposta durante a relação sexual, dificultando a penetração do vírus. Somando-se a esse fato, o contingente feminino é mais vulnerável visto que, após à ejaculação, o esperma fica algum tempo dentro da vagina e do útero.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

### *10.1.11 Questionamentos da 11ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:08:49

Bia: Pode acontecer do vírus da AIDS ultrapassar a camisinha?

Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com frequência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual.

Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:09:22

Bia: O que é a AIDS?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a Síndrome

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:09:44

Bia: Podemos pegar aids fazendo uma transfusão?

Doutor: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe e é de menos que 1 para cada 50.000 transfusões. Esse risco se deve à existência da "janela imunológica", ou seja, o tempo entre a infecção e a positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três meses).

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:10:24

Bia: Quais os sintomas da doença?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:11:50

Bia: O que é o coquetel do dia seguinte?

Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:07:48

Maria: Como acontece a transmissão do HIV para o feto?

Doutor: O vírus passa pela placenta, mais o risco aumenta durante o parto (sempre há uma troca de pouco sangue neste momento entre a mãe e a criança) e no período do aleitamento materno pela presença do vírus no leite.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:08:49

Maria: Por que o recém nascido não apresenta logo que nasce a doença?

Doutor: 75% dos bebês que apresentam um teste HIV positivo ao nascer se tornam soro-negativos nos primeiros 18 meses de vida sem qualquer medicação. Isto acontece porque as crianças nascem sem sistema imunológico próprio e, quando desenvolvem o seu sistema imunológico, em 75% dos casos descartam naturalmente os anticorpos recebidos da mãe.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:09:30

Maria: O que é janela imunológica?

Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não foram confirmados posteriormente pelos próprios autores.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:10:42

Maria: A aids pode causar infertilidade?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais (orais, anais e vaginais) sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos não transmitem o HIV. O beijo na boca também não transmite o HIV, pois, na saliva existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:12:29

Maria: Existem perspectivas para se encontrar a cura da aids?

Doutor: Certos ensaios clínicos com algumas preparações vacinais, até a presente data, estão em fase de estudos em voluntários, para avaliação da segurança, tolerabilidade e toxicidade e para obtenção de informações iniciais sobre imunogenicidade (capacidade de gerar resposta imune). Por outro lado, há possibilidade de pior evolução da doença nas pessoas que eventualmente contraíram o vírus após vacinadas e isto se baseia no fato de a vacina poder desencadear a produção de anticorpos ineficazes ou não neutralizantes. Os anticorpos não neutralizantes poderiam aumentar a taxa de replicação viral, provavelmente por facilitar a penetração do HIV no interior dos macrófagos. O aumento da taxa de replicação viral na presença destes anticorpos ineficazes já foi detectado in vitro. Entretanto, até a presente data, não há evidências de que estes fenômenos tenham qualquer significado in vivo, ou seja, nos ensaios com humanos. Apesar destas preocupações serem especulativas, são de grande importância para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura.

Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:04:31

Gustavo: Quais as principais formas de transmissão da AIDS?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais (orais, anais e vaginais) sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos não transmitem o HIV. O beijo na boca também não transmite o HIV, pois, na saliva existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:04:58

Gustavo: Magreza é sintoma de AIDS?

Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarreia prolongada (por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunistas que acometem esses indivíduos

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:05:22

Gustavo: O que é transcriptase reversa?

Doutor: Transcriptase reversa é o nome da enzima que o RNA do vírus contém.

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:05:37

Gustavo: Quem descobriu o HIV?

Doutor: O francês Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris

Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:05:59

Gustavo: Posso transar com uma aidética e não contrair o vírus?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:07:07

juli: Qual a diferença entre AIDS e HIV?

Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aidético, ou seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS. Significa estar na fase da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus.

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:07:23

juli: O que significa soroconversão?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:07:58

juli: Qual país possui o maior número de casos de AIDS?

Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo que destes 6,4 milhões já faleceram.

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:08:24

juli: Usuários de drogas injetáveis fazem parte de um grupo de risco?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:08:47

juli: Como é feito o tratamento da AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de distribuição.

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:16:20

Rosane: De onde veio a AIDS?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:17:22

Rosane: O coquetel de medicamentos está acessível a todas as classes sociais?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de distribuição.

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:17:55

Rosane: Quais efeitos colaterais podem ocorrer durante o tratamento?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de distribuição.

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:21:25

Rosane: que exames detectam a aids?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:22:04

Rosane: Podemos pegar aids durante uma doação de sangue?

Doutor: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe e é de menos que 1 para cada 50.000 transfusões. Esse risco se deve à existência da "janela imunológica", ou seja, o tempo entre a infecção e a positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três meses).

Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:03:45

leticia: Qual vírus é mais perigoso, o HIV-1 ou o HIV-2?



Doutor: O HIV-2 é provavelmente um vírus um pouco mais adaptado ao ser humano. Um vírus adaptado é aquele que não mata o seu hospedeiro rapidamente e tem portanto a chance de sobreviver mais longamente. O HIV-2 tem período de latência maior, transmissibilidade menor, carga viral menor e provavelmente previne superinfecção pelo HIV-1. No Brasil não há nenhum caso de infecção pelo HIV-2

Avaliação da resposta por letícia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:05:06

letícia: quanto tempo leva para um exame tornar-se positivo?

Doutor: Para saber se está infectado ou não, o indivíduo deve esperar, em média, três meses após à exposição a uma situação de risco, para só depois submeter-se ao teste anti-HIV. Este período é chamado pelos médicos de “janela imunológica”, isto é, trata-se do tempo necessário para que o organismo produza quantidade suficiente de anticorpos contra o vírus, ao ponto de ser detectada pelos exames de sangue.

Avaliação da resposta por letícia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:06:13

letícia: Em relação à transmissão heterossexual, quem adquire o HIV com mais facilidade, o homem ou a mulher?

Doutor: Em uma relação heterossexual entre parceiros discordantes existe maior probabilidade de a mulher soronegativa ser contaminada pelo parceiro soropositivo para o HIV do que o contrário. A maioria destes estudos é realizada através do acompanhamento de casais discordantes em relação à contaminação pelo HIV e, em geral, abrangem um número muito maior de casais em que o elemento infectado pelo HIV, é o homem. A taxa de soroconversão entre as parceiras inicialmente negativas de homens soropositivos oscila em torno de 40% nos diferentes trabalhos. Quando o caso índice é a mulher, a taxa de conversão do parceiro varia entre os diferentes trabalhos, de 0 até em torno de 15 a 20%.

Avaliação da resposta por letícia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:06:45

letícia: Há perspectivas de controle da doença a curto prazo no Brasil e no mundo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por letícia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:07:05

letícia: Que complicações a aids pode causar?

Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes moleculares

Avaliação da resposta por letícia: Insatisfeito

## 10.2 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema DST

### 10.2.1 Questionamentos da 1ª aplicação

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:32:21

Juliana: A herpes é transmitida através do sexo oral?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:33:02

Juliana: Por que as doenças sexualmente transmissíveis são chamadas também de doenças venéreas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:33:59

Juliana: O que causa o câncer no colo do útero?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:34:13

Juliana: O que é HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:35:48

Juliana: Por que as mulheres sofrem conseqüências mais graves quando tem doenças venéreas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:32:20

Cláudia: Adquire-se AIDS pelo sexo oral?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:32:45

Cláudia: Mulher com gonorréia transmite para a criança se estiver grávida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:33:22

Cláudia: Se a AIDS ainda não tiver se desenvolvido e o casal fizer sexo sem camisinha, terá risco de se contaminar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:33:52

Cláudia: Quem é mais fácil contrair AIDS: o homem ou a mulher?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:34:13

Cláudia: Quais os riscos do vírus HPV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

NOME DO USUÁRIO: vatusy

Apr 12, 2002 - 14:31:50

Pergunta gravada número: 1

Apr 12, 2002 - 14:32:09

vatusy: O que são as DSTs?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:33:13

vatusy: As DSTs afetam que tipo de pessoa?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:33:46

vatusy: As infecções são transmitidas apenas pelo contato sexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:34:39

vatusy: As doenças venéreas só se manifestarem na genitália externa?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:35:27

vatusy: Por qual tipo de organismos são causadas as DSTs?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 1  
Apr 12, 2002 - 14:31:59  
Jack: O que são doenças sexualmente transmissíveis?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 2  
Apr 12, 2002 - 14:32:28  
Jack: Como são transmitidas esses tipos de doenças?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 3  
Apr 12, 2002 - 14:32:41  
Jack: A sífilis tem cura?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 4  
Apr 12, 2002 - 14:33:02  
Jack: Essas doenças são hereditárias?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 5  
Apr 12, 2002 - 14:33:32  
Jack: Quais destas doenças se detectadas ainda no início tem cura?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 6  
Apr 12, 2002 - 14:34:02  
Jack: A AIDS é hereditária?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 1  
Apr 12, 2002 - 14:34:05  
Anne: O que é gonorréia?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 2  
Apr 12, 2002 - 14:34:28  
Anne: Como o vírus HIV age?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 3  
Apr 12, 2002 - 14:34:52  
Anne: Como ocorre o contágio da AIDS?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 4  
Apr 12, 2002 - 14:35:14  
Anne: Quais os sintomas da sífilis?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 5  
Apr 12, 2002 - 14:35:39  
Anne: Como se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 1  
Apr 12, 2002 - 14:32:19

Michele: Em que consistem as doenças sexualmente transmissíveis?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 12, 2002 - 14:32:42

Michele: Como as doenças venéreas são transmitidas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 12, 2002 - 14:32:52

Michele: Quais são as doenças sexualmente transmissíveis?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 12, 2002 - 14:33:22

Michele: A camisinha é o modo mais seguro de evitá-las?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 12, 2002 - 14:33:45

Michele: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

### *10.2.2 Questionamentos da 2ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:03:59

Cláudia: Quais os sintomas da hérpes genital?

Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:04:52

Cláudia: O que ocasiona o vírus condiloma?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:05:05

Cláudia: Aonde está presente o vírus da hepatite B?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:05:20

Cláudia: Como se sente alguém que contrai hepatite B?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:05:37

Cláudia: Qual a diferença entre AIDS e HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:01:48

Anne: Como um paciente pode chegar a ter sífilis terciária?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:02:10

Anne: Qual o tratamento da sífilis?

Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:03:47

Anne: Podemos pegar AIDS através de equipamentos cirúrgicos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:04:02

Anne: A mãe pode amamentar o bebê se tiver AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:04:17

Anne: A sífilis é passada para o feto?

Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:06:27

jackeline: O que é a gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por jackeline: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:07:01

jackeline: A camisinha protege de todas as doenças venéreas?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 15, 2002 - 15:07:44

jackeline: Quem inventou a camisinha?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 15, 2002 - 15:07:57

jackeline: O exame de sangue detecta todas as DSTs?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:08:20

jackeline: O que é a sífilis?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 15, 2002 - 15:04:09

Michelle: O que é hérpes genital?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 15, 2002 - 15:05:08

Michelle: A camisinha feminina é um preservativo seguro?

Doutor: Sim. Na verdade é o único modo seguro de evitá-las  
Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito  
Pergunta gravada número: 3  
Apr 15, 2002 - 15:07:17  
Michelle: Qual a diferença entre o herpes genital e o herpes simples?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 4  
Apr 15, 2002 - 15:08:50  
Michelle: Existe tratamento para o herpes?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 5  
Apr 15, 2002 - 15:09:08  
Michelle: Qual o agente causador da gonorréia?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 1  
Apr 15, 2002 - 15:06:40  
Juliana: Posso pegar uma doença sexualmente transmissível mesmo se o meu parceiro não tiver os sintomas?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 2  
Apr 15, 2002 - 15:07:25  
Juliana: A herpes tem cura?  
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença  
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito  
Pergunta gravada número: 3  
Apr 15, 2002 - 15:08:01  
Juliana: Qual tipo de relação sexual é mais perigosa para a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis?  
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua  
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 4  
Apr 15, 2002 - 15:09:39  
Juliana: A sífilis tem cura?  
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença  
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito  
Pergunta gravada número: 5  
Apr 15, 2002 - 15:10:03  
Juliana: Por que a AIDS ainda não tem cura?  
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença  
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 1  
Apr 15, 2002 - 15:10:02  
Vatusy: Como se prevenir das DSTs?  
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua  
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito  
Pergunta gravada número: 2  
Apr 15, 2002 - 15:10:25  
Vatusy: Quais são as DSTs mais conhecidas?  
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo  
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 3  
Apr 15, 2002 - 15:10:44  
Vatusy: O que são infestações?  
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo  
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito  
Pergunta gravada número: 4  
Apr 15, 2002 - 15:12:15  
Vatusy: O que são infestações?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 15, 2002 - 15:12:45

Vatusy: Cite três ectoparasitas causadores das infestações?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

Apr 15, 2002 - 15:13:11

Vatusy: Como a sífilis é detectada?

Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

### *10.2.3 Questionamentos da 3ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:20:36

Juliana: Sexo entre soropositivos precisa de proteção?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:21:04

Juliana: Como é feito o tratamento da sífilis?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:21:57

Juliana: O que é a candidíase vaginal?

Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por exemplo, o piolho, o chato e a pulga.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:22:34

Juliana: Uma mulher pode ter candidíase mesmo sem ter mantido relações sexuais?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:22:54

Juliana: Qual a DST mais perigosa, exceto a AIDS?

Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS. A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:15:29

claudia: É mais seguro usar duas camisinhas durante a relação?

Doutor: Sim. Na verdade é o único modo seguro de evitá-las

Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:16:26

claudia: O que é sexo seguro?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença.

Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:17:01

claudia: Sexo sem penetração tem risco para se contrair uma doença venérea?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:17:19

Claudia: A hérpes genital tem cura?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por claudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:18:06

claudia: Em se tratando de AIDS, uma relação homossexual tem o mesmo risco de uma heterossexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:25:16

Jack: A camisinha feminina é um meio seguro de se evitar DSTs?

Doutor: A camisinha feminina foi desenvolvida especialmente para prevenir DSTs, inclusive a AIDS, porque ela recobre toda a vagina e os grandes lábios, evitando assim o contato do esperma com as secreções vaginais da mulher. Porém, vale a pena lembrar que nenhum método é 100% seguro. A segurança depende do uso correto.

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:26:04

Jack: Podemos pegar AIDS através do beijo na boca?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de: Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Jack: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:26:40

Jack: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoníase

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:27:50

Jack: A mulher pode transmitir o HIV para o homem?

Doutor: Não existe distinção entre sexo para transmissão do vírus da AIDS

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:28:25

Jack: Qual o tratamento para a sífilis?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito



com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:21:25

Vatusy: O que é cancro mole?

Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por exemplo, o piolho, o chato e a pulga.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:21:52

Vatusy: Como é transmitido o cancro mole?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:22:26

Vatusy: o cancro mole pode matar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:22:47

Vatusy: Existe tratamento para o cancro mole?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:23:40

Vatusy: Quais os sintomas mais freqüentes do cancro mole?

Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:24:46

Michelle: O que é a gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a *Neisseria gonorrhoeae*. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:26:20

Michelle: Qual o agente causador da sífilis?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a *Neisseria gonorrhoeae*. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:27:50

Michelle: Qual o período de incubação da sífilis?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:28:08

Michelle: O que é a donovanose?

Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por exemplo, o piolho, o chato e a pulga.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:28:29

Michelle: O que é o chato?

Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por exemplo, o piolho, o chato e a pulga.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Apr 22, 2002 - 15:17:14

Anne: Se a aids não tem cura, qual a função do tratamento?

Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS.

Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Apr 22, 2002 - 15:17:34

Anne: O que é o HPV?

Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por exemplo, o piolho, o chato e a pulga.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Apr 22, 2002 - 15:18:31

Anne: Como o HPV pode ser transmitido?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Apr 22, 2002 - 15:18:51

Anne: O que é Herpes?

Doutor: Herpes é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Apr 22, 2002 - 15:19:27

Anne: Como o Herpes é transmitido?

Doutor: O herpes é transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

#### *10.2.4 Questionamentos da 4ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:29:57

Jack: Uma coceira na vagina pode ser sinal de alguma doença venérea?

Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) sempre trouxeram, além da sintomatologia orgânica, um forte componente emocional. Até recentemente nomeadas de "Doenças Venéreas", tiravam esta denominação das sacerdotisas dos templos de Vênus, que exerciam a prostituição como forma de culto à Deusa do Amor.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:30:48

Jack: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:31:18

Jack: Uma pessoa pode ser afetada por mais de uma doença sexualmente transmissível?

Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são doenças graves que podem causar disfunções sexuais, esterilidade, aborto, nascimento de bebês prematuros com problemas de saúde, deficiência física ou mental, alguns tipos de câncer e até a morte.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:31:31

Jack: Uma pessoa pode ter o vírus da AIDS e não desenvolvera doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:31:52

Jack: O que são portadores assintomáticos?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:59

Vatusy: O que é a sífilis?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:32:51

Vatusy: Quais os sintomas da sífilis?

Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:33:13

Vatusy: Pra que serve o exame papa nicolau?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:34:39

Vatusy: De quanto em quanto tempo uma mulher deve ir ao ginecologista?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:35:01

Vatusy: No que consiste o exame ginecológico ?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:34:14

Cláudia: Podemos contrair a hepatite C através do sexo oral?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:35:07

Cláudia: Como agir em caso de suspeita de DST?

Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:35:33

Cláudia: Se contrai hiv engolindo esperma de um homem com o vírus?

Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que reveste o pênis para que o vírus penetre.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:35:47

Cláudia: O que é corrimento?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:35:56

Cláudia: Todo corrimento é sinal de DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:34

Michelle: Um homem com DST pode apresentar impotência?

Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que reveste o pênis para que o vírus penetre.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:32:25

Michelle: O parasita chato se manifesta quantos dias após a relação sexual ?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:32:52

Michelle: Quais são as DSTs que mais matam hoje em dia?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:33:20

Michelle: Por que é importante tratar a DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:34:01

Michelle: O que é a candidíase vaginal?

Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:23:54

Anne: Corrimento vaginal é sinal de DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:24:33

Anne: Que exame devemos fazer para detectar se estamos com sífilis?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:25:35

Anne: Existe vacina para a sífilis?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:27:03

Anne: O que pode significar verrugas na região da vagina?

Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:28:25

Anne: Qual é o momento ideal para um portador do vírus da AIDS iniciar o tratamento com o Coquetel de medicamentos?

Doutor: A melhor maneira de combater o vírus é impedir sua multiplicação. É o que fazem os medicamentos anti-HIV, que devem baixar a carga viral, tornando-a indetectável e, se possível, restaurar a imunidade. Para que o tratamento anti-HIV seja mais eficaz, é recomendável iniciá-lo antes que a pessoa tenha alguma doença e que o seu sistema imunitário esteja muito enfraquecido. É a razão pela qual, hoje, muitas pessoas infectadas pelo HIV fazem um tratamento enquanto dispõem de boa saúde.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:45

Juliana: Quais são as consequências das DSTs não tratadas adequadamente?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoníase

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:32:37

Juliana: Qual a diferença entre o vírus HIV-1 e HIV-2?

Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS. A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:33:06

Juliana: Existe vacina para alguma doença venérea?

Doutor: A camisinha previne a maioria das DST, inclusive a AIDS.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:33:35

Juliana: Se a mulher contrair uma doença venérea durante a gravidez, o bebê pode nascer com algum tipo de problema?

Doutor: Nunca poderemos falar em risco ausente, porém ele será muito baixo, já que não acontecendo a ejaculação na mucosa vaginal ou anal não haverá contato do esperma ( que é o veículo de transporte do vírus) com as "portas de entrada" que podem estar presentes como pequenos ferimentos, fissuras e feridas no colo uterino.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:34:19

Juliana: Se a mulher contrair uma doença venérea durante a gravidez, as chances de abortar são maiores?

Doutor: Nunca poderemos falar em risco ausente, porém ele será muito baixo, já que não acontecendo a ejaculação na mucosa vaginal ou anal não haverá contato do esperma ( que é o veículo de transporte do vírus) com as "portas de entrada" que podem estar presentes como pequenos ferimentos, fissuras e feridas no colo uterino.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

### *10.2.5 Questionamentos da 5ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:29:39

Juliana: O que é sistema imunitário?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:31:29

Juliana: O que é prurido?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:32:12

Juliana: O que é uretrite?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a *Neisseria gonorrhoeae*. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:32:30

Juliana: O que é corrimento?

Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores e consistências variadas que sai do pênis ou da vagina

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:32:50

Juliana: O que é soropositivo?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:31:36

Claudia: O que causa corrimentos na mulher?

Doutor: Herpes é uma doença causada por vírus e que leva ao aparecimento de pequenas lesões nas regiões afetadas. A maior parte das pessoas já foi exposta ao vírus causador da herpes na infância, quando começa a haver um contato maior com outras crianças. No entanto, nem todos vão manifestar a doença. O vírus fica "adormecido" em alguns nervinhos próximos à boca, esperando um momento em que ocorra uma queda na imunidade (defesas do organismo) para se manifestar. Gripe, excesso de sol, temperaturas muito frias, estresse, problemas emocionais e outros fatores podem fazer com que haja uma queda nessas defesas do corpo.

Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:32:15

Claudia: O que causa corrimentos nos homens?

Doutor: O câncer de colo do útero não tem uma única causa, e nem sempre tem causa conhecida. Entretanto, tratando-se de DSTs, a infecção pelo HPV pode estar associada ao aparecimento de alguns casos desse câncer

Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:33:44

Claudia: Se um dos parceiros for aidético e o casal transar sem camisinha, há alguma chance do outro parceiro não se contaminar caso a aids ainda não tenha se desenvolvido?

Doutor: Sim. Pois a transmissão se dá pela presença do vírus no organismo e não pela presença dos sintomas.

Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:34:03

Claudia: Se uma pessoa tiver uma ferida no dedo e o sangue de um aidético entrar em contato com essa ferida, há risco da pessoa não aidética contrair a doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:34:56

Claudia: Existe um espermicida que mata o vírus da AIDS?

Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS.

Avaliação da resposta por Claudia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:39:31

Vatusy: Em que consiste a gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a *Neisseria gonorrhoeae*. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar.

Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:41:46

Vatusy: Como é feito o tratamento para a gonorréia?

Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:42:50

Vatusy: O que é a donovanose?

Doutor: A donovanose é uma doença crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente causador é a bactéria *Calymmatobacterium granulomatis*. Tem período de incubação de 30 dias a 6 meses. É mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:43:19

Vatusy: Quais os riscos de se pegar uma dst durante o sexo oral?

Doutor: A transmissão do vírus da hepatite C ocorre essencialmente através da via parenteral. Ou seja, através de transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e/ou agulhas. A transmissão sexual pode ocorrer, mas não é a mais freqüente. O sexo oral e a masturbação não estão entre as formas de transmissão da hepatite C conhecidas até o momento.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:45:10

Vatusy: O que é candidíase vaginal?

Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:30:59

Michelle: O que é o HIV?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:31:50

Michelle: Quais os principais sintomas da AIDS?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas



em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:32:16

Michelle: Existe tratamento pra AIDS?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:33:01

Michelle: Um homem pode pegar Aids de uma mulher?

Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que reveste o pênis para que o vírus penetre.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:34:15

Michelle: Existe vacina para AIDS?

Doutor: Não existe vacina para a sífilis. A única forma de prevenção é o uso de preservativo.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:23:23

Anne: Quais as DSTs mais frequentes?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma acuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoníase

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:24:05

Anne: Os problemas de saúde sexual afetam um número significativo de pessoas?

Doutor: Sim. Por exemplo, a Sífilis está associada à gonorréia em aproximadamente 4%. A tricomoníase associa-se à gonorréia em até 13%. O condiloma acuminado com a sífilis em 5%.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:25:34

Anne: O que é linfogranuloma venéreo?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:26:35

Anne: O que é sífilis congênita?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:27:27

Anne: O que é cancro duro?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:28:46

Jack: Como é transmitida a hepatite B?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:29:14

Jack: Quais os sintomas da hepatite B?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:29:34

Jack: Dá pra identificar como a pessoa pegou o vírus da hepatite B?

Doutor: Podemos encontrar o vírus da hepatite B no sangue, sêmem e secreções vaginais e na saliva.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:29:51

Jack: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente?

Doutor: Os sintomas mais comuns da hepatite B são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarreia, icterícia, dores articulares, entre outros.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:30:15

Jack: Qual o tratamento da hepatite B?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

### *10.2.6 Questionamentos da 6ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:11:41

Jackeline: Uma pessoa que tem herpes pode transmití-lo mesmo sem apresentar qualquer sintoma?

Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode ocorrer, contudo, é pouco freqüente.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:12:28

Jackeline: Posso pegar uma DSTs de uma toalha ou de um assento de vaso sanitário?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:12:56

Jackeline: Eu poderia ter uma DST e nem saber?

Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode ocorrer, contudo, é pouco frequente.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:13:22

Jackeline: É possível viver com o vírus HIV?

Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:13:42

Jackeline: As DST aparecem da mesma maneira nos homens e nas mulheres?

Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que reveste o pênis para que o vírus penetre.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:18:35

Anne: Alguma doença venérea pode levar ao câncer?

Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um resultado mais seguro, consulte um ginecologista.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:19:20

Anne: O que é vaginite?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:20:03

Anne: Porque é tão elevada a incidência de DSTs?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:20:31

Anne: A camisinha protege de todas as DSTs?

Doutor: A camisinha previne a maioria das DST, inclusive a AIDS.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:21:19

Anne: Que tipos de infecções resultam em dores durante as relações sexuais?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 15:07:27

Cláudia: Qual a forma de sexo mais fácil de se contrair HIV?

Doutor: A transmissão do vírus da hepatite C ocorre essencialmente através da via parenteral. Ou seja, através de transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e/ou agulhas. A transmissão sexual pode ocorrer, mas não

é a mais freqüente. O sexo oral e a masturbação não estão entre as formas de transmissão da hepatite C conhecidas até o momento.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 15:07:48

Cláudia: Quando a Aids chegou ao Brasil?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 15:08:27

Cláudia: Quais são as DSTs mais comuns?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoníase

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 15:09:16

Cláudia: O que é pediculose pubiana?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 15:10:03

Cláudia: Quais os sintomas do linfogranuloma venéreo?

Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fistulas que drenam secreção purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 15:01:21

Juli: Existe algum remédio que previne as DST?

Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta o risco de infecção pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 15:01:49

Juli: O que fazer quando acha que se está com uma DST ?

Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta o risco de infecção pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 15:02:02

Juli: Como se proteger na hora de fazer sexo oral na mulher?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 15:02:54

Juli: Existe alguma DST que não se pega pelo sexo?

Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmissão pelo sexo vaginal ou anal

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 15:03:16

Juli: Usar calça apertada pode causar alguma doença venérea?

Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um resultado mais seguro, consulte um ginecologista.

Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 15:09:46

Michelle: Se pega AIDS através do beijo na boca?

Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 15:10:26

Michelle: Coceira na vagina pode indicar alguma doença venérea?

Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um resultado mais seguro, consulte um ginecologista.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 15:11:01

Michelle: A aids é mais frequente entre homossexuais?

Doutor: Não. Ela pode passar de mãe para filho por transmissão vertical

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 15:11:33

Michelle: Como a aids é transmitida?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glândula e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 15:11:42

Michelle: Quando foi descoberto o HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 15:03:07

Vatusy: O que é HIV?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 15:03:23

Vatusy: Existe tratamento para a AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 15:03:54

Vatusy: O que é AIDS?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 15:05:35

Vatusy: O que significa imunodeficiência?

Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 15:05:57

Vatusy: Se pega Aids pela saliva?

Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

### *10.2.7 Questionamentos da 7ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:37:35

Vatusy: Pra que serve o tratamento da AIDS?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:37:56

Vatusy: Quantos subtipos do HIV já foram descobertos?

Doutor: O caso mais antigo, posteriormente identificado, data do ano de 1959. O vírus HIV foi encontrado em uma amostra sanguínea de um homem africano da etnia bantu, que viveu no Congo.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:38:14

Vatusy: O aborto é permitido para soropositivos?

Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:38:45

Vatusy: Como estão as pesquisas para encontrar a cura da AIDS?

Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:39:18

Vatusy: O que é tricomoníase?

Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:35:39

michelle: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS?

Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmissão pelo sexo vaginal ou anal

Avaliação da resposta por michelle: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:36:06

michelle: Qual é mais eficiente: a camisinha feminina ou a masculina?

Doutor: A camisinha feminina foi desenvolvida especialmente para prevenir DSTs, inclusive a AIDS, porque ela recobre toda a vagina e os grandes lábios, evitando assim o contato do esperma com as secreções vaginais da mulher. Porém, vale a pena lembrar que nenhum método é 100% seguro. A segurança depende do uso correto.

Avaliação da resposta por michelle: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:36:33

michelle: A mulher grávida passa AIDS para o bebê?

Doutor: Sim. Existe transmissão de mãe para filho na hora do parto.

Avaliação da resposta por michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:36:51

michelle: Como saber se temos sífilis?

Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença

Avaliação da resposta por michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:37:10

michelle: O que é sífilis congênita?

Doutor: Quando a mulher grávida tiver sífilis e não for tratada adequadamente, pode infectar o bebê causando-lhe a sífilis congênita, que pode trazer as seguintes conseqüências: cegueira, problemas ósseos, retardamento mental, pneumonia, feridas no corpo, dentes deformados. A maior parte dos abortamentos espontâneos (quando a gestante perde o bebê e não sabe por que) são causados pela sífilis na gravidez.

Avaliação da resposta por michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:05

Juliana: Qual a chance que eu tenho de pegar aids se eu transar com uma pessoa contaminada?

Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:39

Juliana: Quando duas pessoas fazem sexo anal, só a passiva corre o risco de pegar aids?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:09

Juliana: O que são as manchas na pele que muitos aidéticos apresentam?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:33:57

Juliana: O que acontece quando não se faz o tratamento certo da DST?

Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para diminuir os riscos de transmissão. Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o risco de infectar-se pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:31

Juliana: O que é um portador assintomático?

Doutor: Portador assintomático é a pessoa que foi infectada e não apresenta manifestações da doença. Os portadores assintomáticos são, em grande parte, os principais transmissores das DST, pois não percebendo que estão infectados não procuram tratamento e nem se cuidam para evitar o contágio dos parceiros.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:34:41

Anne: Em que consiste o exame papa Nicolau?

Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:35:29

Anne: Por que a necessidade de fazer um exame anual e coletar o preventivo?

Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:36:20

Anne: O que é tricomoníase?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a *Neisseria gonorrhoeae*. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:37:19

Anne: A gonorréia é passada da mãe para o bebê na gravidez?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:37:36

Anne: Qual das DSTs é passada de mãe pra filho?

Doutor: Por agentes infecciosos: bactérias, protozoários e/ou vírus

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:26

Cláudia: O que é donovanose?

Doutor: A donovanose é uma doença crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente causador é a bactéria *Calymmatobacterium granulomatis*. Tem período de incubação de 30 dias a 6 meses. É mais frequente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais,



elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:33:06

Cláudia: O que é tricomoníase?

Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com piolho, o *Phthirus Pubis*. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:34:57

Cláudia: Quais os sintomas da tricomoníase?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:35:21

Cláudia: Que exame detecta a presença de uma DST?

Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:35:40

Cláudia: Em que consiste o cancro mole?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 6

Jun 7, 2002 - 15:36:00

Cláudia: O que é donovanose?

Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente causador é a bactéria *Calymmatobacterium granulomatis*. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:33:04

Jackeline: O que é a hepatite B?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas

no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:34:46

Jackeline: Quais são as conseqüências das DST não tratadas adequadamente?

Doutor: As doenças sexualmente transmissíveis podem trazer graves conseqüências à saúde do homem, da mulher e dos bebês. As DST, principalmente aquelas em forma de feridas, aumentam o risco de transmissão do vírus da aids. O condiloma pode predispor ao câncer de colo de útero na mulher e do pênis no homem. A sífilis pode evoluir para cegueira ou doenças neurológicas. Pode ser transmitida ao feto durante a gravidez, causando no bebê deformidades ósseas, surdez, retardamento mental. Também podem ocorrer abortamento ou morte do bebê.

Avaliação da resposta por Jackeline: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:35:29

Jackeline: Quais são os sinais de DST?

Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmissão pelo sexo vaginal ou anal

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:36:09

Jackeline: Existe algum problema quando se faz sexo anal e logo a seguir sexo vaginal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:36:43

Jackeline: Uma pessoa pode transmitir uma doença sexualmente transmissível mesmo se não tiver os sintomas?

Doutor: Qualquer pessoa infectada pelo HIV pode passar o vírus para os outros, independentemente de estar ou não desenvolvendo sintomas ou saber ou não se tem o vírus.

Avaliação da resposta por Jackeline: Parcialmente Satisfeito

### *10.2.8 Questionamentos da 8ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:14:41

Jack: Quais os sintomas do herpes simples?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:15:52

Jack: Que DSTs podem ser prevenidas através de vacinas?

Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:16:18

Jack: O câncer do colo de útero pode ser causado por uma DST?

Doutor: O câncer de colo do útero não tem uma única causa, e nem sempre tem causa conhecida. Entretanto, tratando-se de DSTs, a infecção pelo HPV pode estar associada ao aparecimento de alguns casos desse câncer

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:16:36

Jack: Quando as DSTs surgiram?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:17:47

Jack: As dsts são mais frequentes em usuários de drogas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:15:01

Michelle: As DSTs podem causar problemas de formação ao feto?

Doutor: Por agentes infecciosos: bactérias, protozoários e/ou vírus

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:15:35

Michelle: Quais os sintomas da sífilis?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:16:04

Michelle: Que complicações pode causar uma sífilis não tratada?

Doutor: A hepatite pode trazer uma série de conseqüências, entre elas: a hepatite crônica, cirrose hepática, câncer do fígado, coma hepático e, até mesmo, a morte.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:17:17

Michelle: Um bebê de uma soropositiva pode nascer sem AIDS?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluidos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:17:50

Michelle: Por que as DSTs também são chamadas de doenças venéreas?

Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) sempre trouxeram, além da sintomatologia orgânica, um forte componente emocional. Até recentemente nomeadas de "Doenças Venéreas", tiravam esta denominação das sacerdotisas dos templos de Vênus, que exerciam a prostituição como forma de culto à Deusa do Amor.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:17:08

Juliana: Quais os sintomas do linfogranuloma venéreo?

Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomona vaginalis considerada uma uretrite não gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfeção.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:17:51

Juliana: O que é clamídia?

Doutor: Prurido significa coceira

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:18:16

Juliana: O que é granuloma venéreo?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:19:31

Juliana: A sífilis pode ser transmitida através da transfusão de sangue?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:19:50

Juliana: Que exame detecta o vírus HPV?

Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-HBC (para Hepatite B).

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:17:58

Claudia: Quando a AIDS chegou ao Brasil?

Doutor: A AIDS chegou ao Brasil na década de 80. Os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual.

Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:18:33

Claudia: Existe tratamento para a herpes?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:19:09

Claudia: O que é cancro mole?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:19:21

Claudia: O que é corrimento?

Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores e consistências variadas que sai do pênis ou da vagina

Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:20:06

Claudia: Qual o tratamento da gonorreia?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada

adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:18:04

Vatusy: Em que consiste o linfogranuloma venéreo?

Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:18:35

Vatusy: Que tipo de exame detecta o linfogranuloma?

Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-HBC (para Hepatite B).

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:19:42

Vatusy: O que é condiloma acuminado?

Doutor: O condiloma causa o aparecimento de uma lesão verrucosa na região genital ou anal. Não causam dor. Mais tarde, quando não tratadas, podem levar ao aparecimento do câncer de útero ou do reto e anus

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:20:15

Vatusy: Como a hepatite é transmitida?

Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas. Os sintomas mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarreia, icterícia, dores articulares, entre outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcóolicas, mas não há nenhuma restrição quanto à alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:20:30

Vatusy: A hepatite C também é transmitida por via sexual?

Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas. Os sintomas mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarreia, icterícia, dores articulares, entre outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcóolicas, mas não há nenhuma restrição quanto à alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 14, 2002 - 15:17:01

Anne: Alguma DST pode causar impotência no homem?

Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode ocorrer, contudo, é pouco frequente.

Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 14, 2002 - 15:17:36

Anne: O pré natal previne complicações para o bebê de mulheres infectadas?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 14, 2002 - 15:18:04

Anne: A mulher pode passar AIDS para o homem?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 14, 2002 - 15:19:02

Anne: A hepatite B tem cura?

Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas. Os sintomas mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarreia, icterícia, dores articulares, entre outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcoólicas, mas não há nenhuma restrição quanto à alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 14, 2002 - 15:19:28

Anne: Qual a finalidade da vacina para hepatite B?

Doutor: Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcoólicas, mas não há nenhuma restrição quanto à alimentação.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

### *10.2.9 Questionamentos da 9ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:03:03

Juliana: O que é HIV?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:03:21

Juliana: Como prevenir da AIDS?

Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua

Avaliação da resposta por Juliana: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:03:52

Juliana: A aids pode ser transmitida na aplicação de tatuagens?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:04:25

Juliana: Como é o tratamento do HPV?

Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:05:41

Juliana: Uma pessoa com AIDS pode amamentar?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: Nas relações sexuais sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:04:00

Jack: Quais são as DSTs de transmissão essencialmente sexual?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoníase

Avaliação da resposta por Jack: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:05:02

Jack: Podemos pegar hepatite B através do beijo na boca?

Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também.

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:06:07

Jack: Uma mulher pode ter candidíase sem transar?

Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção.

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:06:54

Jack: Como saber se o corrimento é normal ou decorrente de uma DST?

Doutor: Nos primeiros anos depois da primeira menstruação ou mesmo antes de menstruar, quando o organismo está sendo preparado pelos hormônios recém criados, é normal para as meninas observarem uma secreção vaginal mais abundante que mancha as roupas e preocupa. Na verdade essa secreção apenas denota um funcionamento dos ovários, desde que não haja odor fétido, coceira e ardência. Qualquer um desses sintomas poderá significar infecção e um tratamento talvez seja necessário.

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:07:21

Jack: Que complicações pode causar a hepatite B?

Doutor: A sífilis em sua fase terciária pode ocasionar lesões cutâneo-mucosas, neurológicas - como demência -, e cardiovasculares - como aneurisma aórtico e articulares.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:02:49

Anne: O que é donovanose?

Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente causador é a bactéria *Calymmatobacterium granulomatis*. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção

cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:03:44

Anne: O que é o herpes genital?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:04:23

Anne: O aborto é permitido para portadoras do HIV?

Doutor: O aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal). Atualmente, já existem hospitais públicos que realizam o aborto nestas hipóteses.

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:04:57

Anne: Podemos pegar pediculose pubiana através de toalhas ou roupas íntimas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:05:36

Anne: Que tipo de pessoas estão mais propícias a pegarem DSTs?

Doutor: Todas as pessoas que fizerem sexo sem proteção

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:02:17

Cláudia: O que são verrugas genitais?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:02:43

Cláudia: O que é cancro duro?

Doutor: Cancro duro é a primeira fase da sífilis, é a ferida que aparece nos órgãos genitais de 10 a 30 dias depois do contágio (pelo contato sexual). A ferida da sífilis não dói, não coça, não arde e às vezes pode aparecer também dentro da boca por causa do sexo oral (é como uma afta que não dói). Essa ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas a doença continua a progredir e continua sendo transmitida.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:03:14

Cláudia: O que é gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações



sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:03:47

Cláudia: Qual o tratamento da tricomoníase?

Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:04:17

Cláudia: Em que consiste a sífilis?

Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de incubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é *Treponema pallidum*. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:03:27

Vatusy: Qual o papel da escola na prevenção de DSTs?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:04:10

Vatusy: Por que as DST estão se alastrando tanto?

Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta o risco de infecção pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:04:57

Vatusy: Duas camisinhas usadas ao mesmo tempo oferecem mais segurança contra a Aids?

Doutor: Basta usar apenas uma camisinha para o casal estar protegido das DSTs e de uma gravidez indesejada. Porém, alguns cuidados devem ser tomados, como por exemplo: observar o prazo de validade da camisinha, abrir a embalagem só na hora de usar, colocar a camisinha sobre o pênis já ereto e retirá-la com o pênis ainda ereto e usar uma nova camisinha a cada relação.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:06:02

Vatusy: A sífilis só é transmitida pelo ato sexual?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:06:29

Vatusy: O que são úlceras genitais?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento

genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 21, 2002 - 17:01:48

Michele: Que conseqüências uma sífilis durante a gravidez trás pro Bebê?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 21, 2002 - 17:02:39

Michele: Quais os sintomas do herpes genital?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Michele: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 21, 2002 - 17:03:10

Michele: É possível uma pessoa ter herpes genital e não saber?

Doutor: Algumas pessoas podem não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida.

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 21, 2002 - 17:04:10

Michele: os sintomas do herpes podem voltar a se manifestar?

Doutor: Herpes é uma doença causada por vírus e que leva ao aparecimento de pequenas lesões nas regiões afetadas. A maior parte das pessoas já foi exposta ao vírus causador da herpes na infância, quando começa a haver um contato maior com outras crianças. No entanto, nem todos vão manifestar a doença. O vírus fica "adormecido" em alguns nervinhos próximos à boca, esperando um momento em que ocorra uma queda na imunidade (defesas do organismo) para se manifestar. Gripe, excesso de sol, temperaturas muito frias, estresse, problemas emocionais e outros fatores podem fazer com que haja uma queda nessas defesas do corpo. O herpes simples causa dor intensa, não tem cura e aparece de vez em quando. É contagioso e geralmente aparece no contorno dos lábios, ao lado da boca, nos órgãos genitais, nádegas e até dentro dos olhos (casos mais raros), podendo levar à cegueira

Avaliação da resposta por Michele: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 21, 2002 - 17:04:32

Michele: que exames detectam o herpes?

Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-HBC (para Hepatite B).

Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito

### *10.2.10 Questionamentos da 10ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:17:56

Vatusy: O que fazer se desconfiar que está com uma DST?

Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para diminuir os riscos de transmissão. Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o risco de infectar-se pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:18:41

Vatusy: Em qual tipo de relação sexual é mais fácil de se adquirir uma DST?

Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: Abstinência sexual, carície, beijo, etc.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:20:09

Vatusy: O que acontece depois que alguém é infectado com o HIV?

Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil diante de certos micróbios, como bactérias e vírus.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:21:10

Vatusy: O tratamento da gonorréia é igual tanto para o homem como para mulher?

Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:21:33

Vatusy: Quais os sintomas da gonorréia?

Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo *Trichomona vaginalis* considerada uma uretrite não gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:11:59

Juliana: O que é tricomoníase?

Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo *Trichomona vaginalis* considerada uma uretrite não gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:12:21

Juliana: Que complicações a tricomoníase pode causar?

Doutor: A hepatite pode trazer uma série de conseqüências, entre elas: a hepatite crônica, cirrose hepática, câncer do fígado, coma hepático e, até mesmo, a morte.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:12:58

Juliana: O que são bolinhas brancas no pênis?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:13:58

Juliana: O que é sexo seguro?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:14:46

Juliana: Quem já teve gonorréia, pode ter novamente?

Doutor: Muitas pessoas com DSTs não têm quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção de DST assintomática não causará problemas mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu médico imediatamente.

Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:17:51

Cláudia: Quais os sintomas da candidíase vaginal?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:18:41

Cláudia: Herpes Genital tem cura?

Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também podem ser receitados para evitar lesões secundárias.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:19:17

Cláudia: A AIDS veio do macaco ou do Laboratório?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:19:46

Cláudia: A AIDS tem tratamento?

Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantêm os vírus inativos e sem se replicar por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:20:20

Cláudia: As DSTs passam para o bebê?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:17:44

Michelle: Uma casal soropositivo precisa usar preservativo durante a relação sexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:18:18

Michelle: Pode-se contrair aids mesmo usando camisinha?

Doutor: Basta usar apenas uma camisinha para o casal estar protegido das DSTs e de uma gravidez indesejada. Porém, alguns cuidados devem ser tomados, como por exemplo: observar o prazo de validade da camisinha, abrir a embalagem só na hora de usar, colocar a camisinha sobre o pênis já ereto e retirá-la com o pênis ainda ereto e usar uma nova camisinha a cada relação.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:18:49

Michelle: Existe vacina para quais DSTs?

Doutor: Não existe vacina para a sífilis. A única forma de prevenção é o uso de preservativo.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:19:40

Michelle: Existe perspectivas da descoberta de uma vacina para a AIDS?

Doutor: Não há, no momento, vacina efetiva para a prevenção da infecção pelo HIV. Porém existem várias formas de prevenção: Na transmissão sexual se recomenda sexo seguro (abstinência, relação monogâmica com parceiro HIV negativo, uso de camisinha). Na transmissão pelo sangue recomenda-se cuidado no manejo de sangue (uso de seringas descartáveis, exigir que todo sangue a ser transfundido seja previamente testado para a presença do HIV, uso de luvas quando estiver manipulando feridas ou líquidos potencialmente contaminados

Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:20:15

Michelle: O que significa ser soropositivo

Doutor: Imunodeficiência é um distúrbio do sistema imunológico que se caracteriza por um defeito congênito ou adquirido em um ou vários mecanismos que interferem na defesa normal de um indivíduo perante infecções ou doenças tumorais.

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:16:36

Jack: qual a diferença entre sinais e sintomas?

Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS. A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:17:08

Jack: Como se pega gonorréia?

Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:17:39

Jack: Como se pega Condiloma?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:18:11

Jack: Como se pega Granuloma venéreo?

Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:19:17

Jack: Como se pega cancro mole?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 27, 2002 - 11:16:53

anne: É verdade que as mulheres correm risco maior de contrair DSTs?

Doutor: Se a DST não é tratada pode causar desde infertilidade no homem e na mulher maior chance de aparecimento de alguns tipos de câncer de útero e ânus, nascimento de criança prematura com lesões orgânicas, morte fetal e gravidez tubária. Portanto, a morte fetal e a gravidez tubária são formas de aborto causadas pelas DST.

Avaliação da resposta por anne: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 27, 2002 - 11:17:37

Anne: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode pegar?

Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmissão pelo sexo vaginal ou anal

Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 27, 2002 - 11:18:24

anne: Quais são os cuidados quando se está com uma DST?

Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para diminuir os riscos de transmissão. Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o risco de infectar-se pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST.

Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 27, 2002 - 11:21:11

anne: Qual o tratamento do linfogranuloma venéreo?

Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 a 5 dias) e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção.

Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 27, 2002 - 11:21:47

anne: Quais as formas de contágio da AIDS?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluidos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito

### *10.2.11 Questionamentos da 11ª aplicação*

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:12:07

Jack: O que são doenças venéreas?

Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:12:27

Jack: Qual a origem do nome doença venérea?

Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:13:17

Jack: Quais as doenças venéreas mais comuns?

Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, candidíase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase

Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:15:12

Jack: Quais as formas mais freqüentes de contaminação pelo vírus da aids?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:16:31

Jack: O que é o coquetel do dia seguinte?

Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto. Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.

Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:13:04

Vatusy: Quais os sintomas do herpes genital?

Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar. Na mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:14:15

Vatusy: Quais os sintomas do chato?

Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo *Trichomona vaginalis* considerada uma uretrite não gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:16:03

Vatusy: Eu poderia ter uma DST e nem saber?

Doutor: Muitas pessoas com DSTs não têm quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção de DST assintomática não causará problemas mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu médico imediatamente.

Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:17:08

Vatusy: Quais são os sintomas do HIV?

Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas

em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não for tratada, depois de alguns anos, pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos.

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:17:19

Vatusy: As DSTs podem ser curadas?

Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências

Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:16:15

juli: O que é a sífilis congênita?

Doutor: Quando a mulher grávida tiver sífilis e não for tratada adequadamente, pode infectar o bebê causando-lhe a sífilis congênita, que pode trazer as seguintes conseqüências: cegueira, problemas ósseos, retardamento mental, pneumonia, feridas no corpo, dentes deformados. A maior parte dos abortamentos espontâneos (quando a gestante perde o bebê e não sabe por que) são causados pela sífilis na gravidez.

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:17:26

juli: Quais as formas de contágio da aids?

Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sanguínea de outro indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:18:09

juli: Quais as formas de contágio do vírus HPV?

Doutor: Quando não tratado pode causar câncer do colo do útero, do pênis e câncer colo-retal

Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:19:38

juli: O que é gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino).

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:20:50

juli: Como é feito o tratamento da gonorréia?

Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:16:50

Cláudia: Quem corre um risco maior de contrair DSTs, O homem ou a mulher?

Doutor: Por causa das diferenças de anatomia, as mulheres correm maior risco de contrair uma DST durante a relação sexual homem/mulher do que os homens. As mulheres correm maior risco do que homens de contrair infecções por Chlamydia num único ato sexual sem proteção com um parceiro infectado. Essa probabilidade é o dobro daquela de um homem nas mesmas circunstâncias. E por que a anatomia feminina frequentemente esconde os primeiros sintomas da doença, as mulheres também sofrem efeitos mais severos de longo prazo de DSTs, tais como moléstia pélvica e infertilidade. A boa notícia é que as mulheres podem ser testadas e tratadas se fizerem exames ginecológicos anuais.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:17:15

Cláudia: O que é chlamidia?



Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores e consistências variadas que sai do pênis ou da vagina

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:18:01

Cláudia: Quais os sintomas do granuloma venéreo?

Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 a 5 dias) e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção.

Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:18:29

Cláudia: De onde veio a AIDS?

Doutor: A origem da AIDS parece ser do macaco, encontrado pela primeira vez na África

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:18:59

Cláudia: O que é pediculose pubiana?

Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com piolho, o Phthirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto.

Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:15:06

Michelle: O que são verrugas genitais?

Doutor: Verrugas genitais são infecções causadas por vírus e ocorrem tanto no pênis como na vulva e vagina. Seu aspecto é de uma verruga comum, mas menor. Necessitam atenção especial, visto que poderão desenvolver malignidade em certas circunstâncias. São os condilomas com características benignas e localização externa e o HPV cujo potencial poderá ser mais agressivo.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:15:44

Michelle: É fácil pegar uma doença venérea?

Doutor: Não. A sífilis por exemplo, pode atingir inclusive o sistema nervoso. A gonorréia pode passar despercebida e só aparecem os sintomas quando já atingiram ovários e trompas. O HPV aparece na região genital ou anal

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:16:21

Michelle: Quantos tipos de vírus da AIDS existem?

Doutor: Não existe um espermicida que mate o vírus da AIDS. A única forma de evitar a transmissão é o sexo com preservativo

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:17:19

Michelle: Todo corrimento é sinal de infecção vaginal?

Doutor: Nos primeiros anos depois da primeira menstruação ou mesmo antes de menstruar, quando o organismo está sendo preparado pelos hormônios recém criados, é normal para as meninas observarem uma secreção vaginal mais abundante que mancha as roupas e preocupa. Na verdade essa secreção apenas denota um funcionamento dos ovários, desde que não haja odor fétido, coceira e ardência. Qualquer um desses sintomas poderá significar infecção e um tratamento talvez seja necessário.

Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:18:22

Michelle: Uma mulher grávida pode passar DST para o filho?

Doutor: A mulher pode passar AIDS para o homem sempre que houver laceração na vagina e pênis capazes de colocar em contato o sangue da mulher como o sangue do homem

Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 16:15:41

anne: Qual a diferença entre cancro mole e cancro duro?

Doutor: Cancro duro é a primeira fase da sífilis, é a ferida que aparece nos órgãos genitais de 10 a 30 dias depois do contágio (pelo contato sexual). A ferida da sífilis não dói, não coça, não arde e às vezes pode aparecer também dentro da boca por causa do sexo oral (é como uma afta que não dói). Essa ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas a doença continua a progredir e continua sendo transmitida.

Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 16:16:21

anne: E cancro mole?

Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa

Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 16:17:39

anne: Como o HIV age?

Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas.

Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 16:19:02

anne: Quando ocorreram os primeiros casos de AIDS no Brasil

Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual. Até o início de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 16:20:00

anne: A gonorréia pode ser passada de mãe pra filho?

Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia (só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto).

Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito

### 10.3 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema educação sexual

#### 10.3.1 Questionamentos da 1ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Apr 29, 2002 - 14:34:30

Bruno: Existe uma idade certa para se começar a prática sexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
Apr 29, 2002 - 14:35:16  
Bruno: Na primeira vez de uma mulher há sempre sangramento da vagina?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
Apr 29, 2002 - 14:35:50  
Bruno: É seguro fazer sexo anal?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
Apr 29, 2002 - 14:36:05  
Bruno: A mulher só pode ter orgasmo em uma relação sexual?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
Apr 29, 2002 - 14:36:35  
Bruno: Tem algum problema se durante o sexo oral a mulher engolir esperma do homem?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1  
Apr 29, 2002 - 14:33:06  
Jader: Qual o período mais provável para uma mulher engravidar?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
Apr 29, 2002 - 14:33:34  
Jader: Como saber se um homem é fértil ou estéril?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
Apr 29, 2002 - 14:34:00  
Jader: Qual a diferença entre sexo e sexualidade?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
Apr 29, 2002 - 14:34:32  
Jader: Por que algumas mulheres não sentem prazer no ato sexual?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
Apr 29, 2002 - 14:35:21  
Jader: Quando se perde a virgindade sempre sangra?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1  
Apr 29, 2002 - 14:31:26  
Karen: Quais as doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
Apr 29, 2002 - 14:31:47  
Karen: Com qual exame detectamos a AIDS?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
Apr 29, 2002 - 14:32:08  
Karen: A AIDS é transmissível pela saliva?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
Apr 29, 2002 - 14:33:16  
Karen: Quais os primeiros sintomas da AIDS?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
Apr 29, 2002 - 14:33:33  
Karen: Quais os métodos de prevenção mais utilizados?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1  
Apr 29, 2002 - 14:34:01  
Paula: O que é a camisinha feminina?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
Apr 29, 2002 - 14:34:16  
Paula: Como funciona a camisinha feminina?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
Apr 29, 2002 - 14:34:37  
Paula: Uma pessoa com AIDS vive até quantos anos?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
Apr 29, 2002 - 14:34:55  
Paula: Qual a diferença entre ser portador e ter o vírus da AIDS?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
Apr 29, 2002 - 14:35:43  
Paula: Como surgiu a AIDS?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1  
Apr 29, 2002 - 14:33:55  
Catarina: Uma garota virgem pode usar DIU?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
Apr 29, 2002 - 14:34:53  
Catarina: Uma garota virgem pode usar camisinha feminina?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
Apr 29, 2002 - 14:35:36  
Catarina: É possível que o espermatozóide ultrapasse nossa roupa, causando uma gravidez?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
Apr 29, 2002 - 14:36:23  
Catarina: A mulher pode engravidar se transar menstruada?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
Apr 29, 2002 - 14:36:48  
Catarina: Uma garota virgem pode engravidar?  
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1  
 Apr 29, 2002 - 14:31:30  
 Val: O corpo da mulher muda após a primeira relação sexual?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
 Apr 29, 2002 - 14:32:01  
 Val: Por que têm garotas que não sangram na sua primeira relação?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
 Apr 29, 2002 - 14:32:29  
 Val: Qual o risco que corremos ao praticarmos sexo oral?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4  
 Apr 29, 2002 - 14:32:42  
 Val: O que é sexo seguro?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5  
 Apr 29, 2002 - 14:32:59  
 Val: Por que tem homens que falham na hora H?  
 Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

### 10.3.2 Questionamentos da 2ª aplicação

#### a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1  
 May 6, 2002 - 15:32:49  
 Val: A mulher tem sempre o mesmo prazer sexual?  
 Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem mutuamente.  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2  
 May 6, 2002 - 15:33:04  
 Val: As relações sexuais podem ser dolorosas?  
 Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação  
 Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3  
 May 6, 2002 - 15:33:46  
 Val: A mulher pode engravidar se mantiver relação sexual menstruada?  
 Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual  
 Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4  
 May 6, 2002 - 15:34:51  
 Val: Quando o homem mantém sua primeira relação sexual, muda algo?  
 Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual.  
 Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5  
 May 6, 2002 - 15:35:30  
 Val: O que é masturbação?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:49

Karen: Por que alguns homens apresentam ejaculação precoce?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:32:29

Karen: Qual a melhor maneira de evitar a gravidez na primeira relação sexual?

Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:33:12

Karen: As drogas influenciam de que forma na gravidez?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:33:51

Karen: É normal mulher ejacular no ato sexual?

Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem mutuamente.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:34:09

Karen: Sexo na adolescência pode trazer conseqüências negativas para os mesmos no futuro?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 3, 2002 - 15:31:24

Jader: Qual o primeiro sintoma apresentado pela aids?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 3, 2002 - 15:32:06

Jader: Para doenças como a gonorréia, a candidíase, existem medicamentos que acabam com as mesmas?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a

relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 3, 2002 - 15:32:20

Jader: Qual o agente transmissor da Hepatite B?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 3, 2002 - 15:32:36

Jader: Um indivíduo pode ser portador de mais de uma dst?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 3, 2002 - 15:33:28

Jader: Uma pessoa nasce ou vira homossexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:32:12

Paula: Quantos anos em média a pessoa deve começar a ter relação sexual?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:34:14

Paula: Qual a probabilidade de uma mulher engravidar na primeira vez?

Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário.

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:36:07

Paula: O que é coito interrompido?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:36:26

Paula: Sexo oral transmite alguma doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:36:40

Paula: O anticoncepcional engorda?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:33:37

Bia: Por que a maioria das meninas sentem dores na primeira vez?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:34:31

Bia: O que fazer quando algumas meninas sentem ardor na vagina ao transarem de camisinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:34:56

Bia: O tamanho das mamas de uma mulher pode ser diferente?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:35:38

Bia: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode contrair?

Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:36:17

Bia: Existe algum limite de idade para a mulher engravidar?

Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 6, 2002 - 15:31:10

Bruno: Durante o sexo anal uma mulher pode engravidar?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozoide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 6, 2002 - 15:31:30

Bruno: Camisinha previne cem por cento?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 6, 2002 - 15:32:10

Bruno: Quem é pior de se curar a DST, o homem ou a mulher?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 6, 2002 - 15:32:38

Bruno: Quais são os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada?

Doutor: O único método seguro de prevenção é o uso de camisinha.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 6, 2002 - 15:32:55

Bruno: Por que a mulher demora mais a gozar que o homem?

Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida

Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito

b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:34:43

Bia: Por que a maioria das meninas sentem dores na primeira vez?



Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:34:59

Bia: O que fazer quando algumas meninas sentem ardor na vagina ao transarem de camisinha?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:35:10

Bia: O tamanho das mamas de uma mulher pode ser diferente?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:35:47

Bia: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode contrair?

Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece outras conseqüências

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:36:18

Bia: Existe algum limite de idade para a mulher engravidar?

Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:49:06

Bruno: Durante o sexo anal uma mulher pode engravidar?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:49:24

Bruno: Camisinha previne cem por cento?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:49:32

Bruno: Quem é pior de se curar a DST, o homem ou a mulher?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:50:09

Bruno: Quais são os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada?

Doutor: O único método seguro de prevenção é o uso de camisinha.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:50:37

Bruno: Por que a mulher demora mais a gozar que o homem?

Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida

Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:37:52

Jader: Qual o primeiro sintoma apresentado pela aids?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:38:06

Jader: Para doenças como a gonorréia, a candidíase, existem medicamentos que acabam com as mesmas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:38:23

Jader: Qual o agente transmissor da Hepatite B?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:38:28

Jader: Um indivíduo pode ser portador de mais de uma dst?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:38:39

Jader: Uma pessoa nasce ou vira homossexual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:39:44

Karen: Por que alguns homens apresentam ejaculação precoce?

Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:40:42

Karen: Qual a melhor maneira de evitar a gravidez na primeira relação sexual?

Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:40:50

Karen: As drogas influenciam de que forma na gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:41:19

Karen: É normal mulher ejacular no ato sexual?

Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem mutuamente.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:41:38

Karen: Sexo na adolescência pode trazer conseqüências negativas para os mesmos no futuro?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:47:08

Paula: Quantos anos em média a pessoa deve começar a ter relação sexual?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:47:20

Paula: Qual a probabilidade de uma mulher engravidar na primeira vez?

Doutor: Na maioria das vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e não ocasiona sangramento

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:47:33

Paula: O que é coito interrompido?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:47:58

Paula: Sexo oral transmite alguma doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:48:08

Paula: O anticoncepcional engorda?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 7, 2002 - 10:43:26

Val2s: A mulher tem sempre o mesmo prazer sexual?

Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem mutuamente.

Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 7, 2002 - 10:43:37

Val2s: As relações sexuais podem ser dolorosas?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 7, 2002 - 10:43:47

Val2s: A mulher pode engravidar se mantiver relação sexual menstruada?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Val2s: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 7, 2002 - 10:44:42

Val2s: Quando o homem mantém sua primeira relação sexual, muda algo?

Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual.

Avaliação da resposta por Val2s: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 7, 2002 - 10:45:02

Val2s: O que é masturbação?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito

### 10.3.3 Questionamentos da 3ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:33:27

Bruno: Para que serve o saco?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:34:23

Bruno: É normal ter só um testículo?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:35:07

Bruno: O que é a camisinha feminina?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:35:54

Bruno: O que é o orgasmo?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:36:34

Bruno: Os homens tem mais necessidade de sexo que as mulheres?

Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece outras conseqüências

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:34:12

Jader: O que é puberdade?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:34:41

Jader: Qual a diferença entre a puberdade masculina e a feminina?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:35:07

Jader: Para que serve a menstruação?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:36:04

Jader: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:36:37

Jader: Uma mulher pode contrair herpes genital fazendo sexo oral?

Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:31:52

VAI: Por que algumas meninas sentem dor de cólica durante a menstruação e outras não?

Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e não ocasiona sangramento

Avaliação da resposta por VAI: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:32:31

VAI: A vida sexual deve começar antes do casamento?

Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou.

Avaliação da resposta por VAI: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:33:41

VAI: Por que meus seios doem quando estou menstruada?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por VAI: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:34:17

VAI: Uma garota virgem pode usar absorvente interno?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por VAI: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:35:02

VAI: Quais os métodos contraceptivos existentes para se evitar uma gravidez?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por VAI: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:32:41

Bia: O homem e a mulher conseguem manter quantas relações sexuais por dia?

Doutor: A mudança no corpo e psicológicas está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:33:41

Bia: O que é coito interrompido?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:33:51

Bia: O que é coito interrompido?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:35:32

Bia: O sexo anal pode causar que tipo de doenças?

Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:36:24

Bia: O que é hímen?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

May 13, 2002 - 15:37:39

Bia: O tamanho do penis influencia na intensidade do prazer para mulher?

Doutor: Nem todas, mais isso é muito comum, principalmente durante a puberdade. Essa diferença às vezes demora uns dois anos para ser corrigida. O que pode permanecer é uma pequena diferença de volume dos seios, perfeitamente normal e comum a quase todas as mulheres.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:34:07

Paula: O que é menopausa?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:34:29

Paula: O que é sexo seguro?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:34:51

Paula: Tomar pílula muito cedo faz mal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:35:18

Paula: É possível ficar grávida com a ejaculação do sêmen na coxa?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:36:01

Paula: Quais as formas de prevenção de uma gravidez indesejada?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 15:32:50

Karen: Quando a mulher já está na menopausa, as possibilidades de contrair dst são grandes?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 15:33:19

Karen: O que é a candidíase vaginal?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 15:33:49

Karen: O que é gonorréia?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 15:34:02

Karen: O que é sífilis?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 15:34:23

Karen: Qual a idade média de uma mulher entrar na menopausa?

Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

#### b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 19:05:52

val: Por que algumas meninas sentem dor de cólica durante a menstruação e outras não?

Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e não ocasiona sangramento

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 19:06:10

val: A vida sexual deve começar antes do casamento?

Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou.

Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 19:06:27

val: Por que os seios doem quando estou menstruada?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 19:06:37

val: Uma garota virgem pode usar absorvente interno?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 19:07:19

val: Quais os métodos contraceptivos existentes para se evitar uma gravidez?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 19:03:32

paula: O que é menopausa?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 19:03:57

paula: O que é sexo seguro?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 19:04:12

paula: Tomar pílula muito cedo faz mal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 19:04:28

paula: É possível ficar grávida com a ejaculação do sêmen na coxa?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 19:04:43

paula: Quais as formas de prevenção de gravidez indesejada?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 19:10:37

Bruno: Para que serve o saco?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozóides.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2



May 13, 2002 - 19:10:57

Bruno: É normal ter só um testículo?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 19:11:31

Bruno: O que é a camisinha feminina?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 19:11:39

Bruno: O que é o orgasmo?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 19:11:49

Bruno: Os homens tem mais necessidade de sexo que as mulheres?

Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece outras conseqüências

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 19:08:31

Jader: O que é puberdade?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 19:08:40

Jader: Qual a diferença entre a puberdade masculina e a feminina?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 19:08:53

Jader: Para que serve a menstruação?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 19:09:05

Jader: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 19:09:23

Jader: Uma mulher pode contrair herpes genital fazendo sexo oral?

Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 18:46:57

BIA: O homem e a mulher conseguem manter quantas relações sexuais por dia?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 18:47:16

BIA: O que é coito interrompido?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por BIA: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 18:47:51

BIA: O que é hímen?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 18:48:06

BIA: O sexo anal pode causar que tipo de doenças?

Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 18:48:31

BIA: O tamanho do penis influencia na intensidade do prazer para mulher?

Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipotativo, que acomete em média 35% da população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo de ter atividade sexual.

Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 13, 2002 - 18:50:11

Karen: Quando a mulher já está na menopausa, as possibilidades de contrair dst são grandes?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 13, 2002 - 18:50:24

Karen: O que é a candidíase vaginal?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 13, 2002 - 18:50:40

Karen: O que é gonorréia?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 13, 2002 - 18:50:55

Karen: O que é sífilis?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 13, 2002 - 18:51:22

Karen: Qual a idade média de uma mulher entrar na menopausa?

Doutor: Em qualquer circunstância, seja a primeira vez ou não, a mulher pode engravidar desde que esteja no período fértil e que tenha transado sem proteção (camisinha ou outro método contraceptivo)

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

#### 10.3.4 Questionamentos da 4ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:17:33

Bruno: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:18:33

Bruno: O que as meninas fazem para se masturbar?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:19:14

Bruno: O que é o esperma?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:19:34

Bruno: Qual a quantidade normal de esperma ejaculado?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:20:32

Bruno: O que é impotência sexual?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:17:07

Bia: Por que algumas mulheres tem TPM?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:17:57

Bia: Por que sentimos dores antes de menstruar?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:18:34

Bia: Existe uma idade pra mulher ter TPM?

Doutor: Não existe idade limite para uma mulher engravidar. É preciso, como limite mínimo, que a mulher já esteja com seus órgãos genitais completamente amadurecidos e com a fabricação normal de hormônios. E como limite máximo é preciso que a mulher ainda secrete esses hormônios e que seus ovários ainda produzam óvulos

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:18:51

Bia: A menina para de crescer após a menarca?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:19:15

Bia: Qual a melhor forma de combater a cólica menstrual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:17:29

Paula: Qual a diferença entre Sêmen e esperma?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:18:37

Paula: As carícias preliminares podem ser feitas sem camisinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:19:43

Paula: O que é a pílula do dia seguinte?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:20:36

Paula: Engolir esperma pode engravidar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozoides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:20:52

Paula: O que provoca o aborto?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:18:44

Val: O que quer dizer homossexual e bissexual?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:19:09

Val: Por que há tanta discriminação com os homossexuais?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:19:42

Val: Como uma mulher fica grávida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:20:07

Val: O que é período fértil?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:20:56

Val: Sexo anal engravida?

Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS.

Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:16:46

Jader: o que é ejaculação precoce?

Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo antes da sensação de satisfação sexual

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:17:17

Jader: O que é masturbação?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:18:00

Jader: Só existe um tamanho de camisinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:18:39

Jader: Qual a maneira correta de colocar a camisinha?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:19:12

Jader: Existe a ejaculação feminina?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 20, 2002 - 14:17:49

Karen: Quais os sintomas da gonorréia?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 20, 2002 - 14:18:36

Karen: A camisinha feminina evita o contágio de DSTs?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 20, 2002 - 14:18:42

Karen: A mãe pode passar gonorréia para o filho durante a gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 20, 2002 - 14:19:25

Karen: Como é o tratamento da gonorréia?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 20, 2002 - 14:20:47

Karen: Que complicações pode causar uma gonorréia não tratada?

Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

## b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:10:49

Karen: Quais os sintomas da gonorréia?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse;

diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:11:08

Karen: A mãe pode passar gonorréia para o filho durante a gravidez?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:11:23

Karen: Como é o tratamento da gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:11:53

Karen: Que complicações pode causar uma gonorréia não tratada?

Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:12:28

Karen: A camisinha feminina evita o contágio de DSTs?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:13:42

Paula: Qual a diferença entre Sêmen e esperma?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:13:56

Paula: As carícias preliminares podem ser feitas sem camisinha?

Doutor: Nem todas, mais isso é muito comum, principalmente durante a puberdade. Essa diferença às vezes demora uns dois anos para ser corrigida. O que pode permanecer é uma pequena diferença de volume dos seios, perfeitamente normal e comum a quase todas as mulheres.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:14:22

Paula: O que é a pílula do dia seguinte?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:14:37

Paula: Engolir esperma pode engravidar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozoides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:14:48

Paula: O que provoca o aborto?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:03:07

Val: O que quer dizer homossexual e bissexual? ]

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:03:26

Val: Por que há tanta discriminação com os homossexuais?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:03:35

Val: Como uma mulher fica grávida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:03:44

Val: O que é período fértil?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:04:22

Val: Sexo anal engravida?

Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:16:53

Bia: Por que algumas mulheres tem TPM?

Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo de ter atividade sexual.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:17:24

Bia: Por que sentimos dores antes de menstruar?

Doutor: Na puberdade, há hormônios que entram em ação para fazer os órgãos sexuais femininos crescerem e se desenvolverem. Um deles é o estrogênio, e sua produção sempre aumenta alguns dias antes da menstruação. Entre outras coisas, o estrogênio faz o organismo reter mais água. Por isso é que os seios aumentam de volume, o que provoca inchaço e dor. Depois da menstruação, a quantidade de estrogênio cai e tudo volta ao normal

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:17:51

Bia: Existe uma idade pra mulher ter TPM?



Doutor: Não existe idade limite para uma mulher engravidar. É preciso, como limite mínimo, que a mulher já esteja com seus órgãos genitais completamente amadurecidos e com a fabricação normal de hormônios . E como limite máximo é preciso que a mulher ainda secrete esses hormônios e que seus ovários ainda produzam óvulos

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:18:07

Bia: A menina para de crescer após a menarca?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:18:11

Bia: Qual a melhor forma de combater a cólica menstrual?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:05:39

Bruno: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:05:52

Bruno: O que as meninas fazem para se masturbar?

Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve procurar um médico para exame local

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:06:02

Bruno: O que é o esperma?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:06:58

Bruno: Qual a quantidade normal de esperma ejaculado?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:07:51

Bruno: O que é impotência sexual?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 21, 2002 - 11:08:48

Jader: o que é ejaculação precoce?

Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo antes da sensação de satisfação sexual

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 21, 2002 - 11:09:24

Jader: O que é masturbação?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 21, 2002 - 11:09:31

Jader: Só existe um tamanho de camisinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 21, 2002 - 11:09:41

Jader: Qual a maneira correta de colocar a camisinha?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 21, 2002 - 11:09:50

Jader: Existe a ejaculação feminina?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

### 10.3.5 Questionamentos da 5ª aplicação

#### a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:30:29

Karen: Quais os sintomas da gravidez?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:30:57

Karen: Uma garota grávida pode menstruar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:31:16

Karen: Uma mulher grávida pode manter relações sexuais normalmente?

Doutor: Em recente pesquisa realizada pelo Istoé on-line, os homens transam em média 3,3 vezes por semana e mulheres, 2,6, sendo portanto um problema de ordem individual.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:31:48

Karen: Uma mulher pode engravidar se estiver menstruada?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:32:44

Karen: O que é o período fértil?

Doutor: O período fértil são os dias em que a garota tem uma chance maior de engravidar. Ele vai depender da duração do ciclo menstrual. A ovulação (liberação do óvulo pelo ovário) geralmente ocorre em torno de 14 dias antes do início da próxima menstruação e representa o período de maior fertilidade da mulher. Temos que levar em conta ainda uma "margem de segurança" de 5 dias antes e 5 dias depois da ovulação. Assim, num ciclo normal de 28 dias, a ovulação deve ocorrer no 14º dia e o período fértil irá do 9º dia até o 19º dia. Já num ciclo de 30 dias, a ovulação se dará no 16º dia e o período fértil estará compreendido entre o 11º dia e o 21º dia. Fora desse período as chances de engravidar são mínimas.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:31:47

Val: De onde vem o sangue da menstruação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:32:19

Val: O que é TPM?

Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo.

Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:33:14

Val: Existe tratamento para a TPM?

Doutor: A TPM pode acontecer em qualquer idade, desde que a mulher já menstrue

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:33:54

Val: Por que durante a menstruação muitas garotas tem cólica?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:34:28

Val: É normal o peito ficar maior durante a menstruação?

Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é nada bom. Um monte de problemas podem aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozoides suficientes para gerar um filho.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:31:21

Paula: Quais as formas de transmissão da AIDS?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:31:59

Paula: O que é AIDS?

Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no qual o hímen ainda está intacto. O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:32:45

Paula: O tratamento da Aids é eficaz?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:33:36

Paula: Podemos pegar aids no dentista?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:34:26

Paula: Quando a AIDS chegou no Brasil?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:31:54

Jader: Quais as DSTs mais comuns?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:32:50

Jader: O que é a sífilis?

Doutor: A sífilis é uma DST causada pela bactéria *Treponema pallidum*, transmitida não só pela relação sexual, como por transmissão vertical mãe-filho e por transfusão de sangue contaminado. Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Porém, se a doença não for tratada nessa fase primária, surge a fase secundária, caracterizada pelo aparecimento de manchas vermelhas na pele, mal estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, podem acarretar doenças mentais, paralisias e morte

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:33:08

Jader: As DSTs são realmente doenças perigosas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:33:32

Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber?

Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele tem relações promíscuas.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:33:47

Jader: Todas as DSTs tem cura?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:33:34

Bruno: Em que época os pelos começam a aparecer?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:33:53

Bruno: Qual o tamanho normal do pênis?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:34:31

Bruno: O que é hímen?

Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no qual o hímen ainda está intacto. O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:35:13

Bruno: Uma mulher fica com a vagina mais larga depois que tem filho de parto normal?

Doutor: É importante ter consciência de que as necessidades das pessoas são diferenciadas em vários outros aspectos e também em relação ao sexo, e isso é absolutamente normal. Pois bem, o ritmo sexual é apenas mais uma delas. Isso não quer dizer que o homem tem mais necessidade de sexo do que as mulheres. O que muda é o biorritmo de cada pessoa. O importante é não permitir que tal fato interfira na vida conjugal de duas pessoas.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:35:48

Bruno: Existe o ponto G?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 15:28:56

Bia: O que significa ser homossexual?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 15:30:38

Bia: O que significa ser bissexual?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 15:31:40

Bia: Os homossexuais ainda fazem parte do principal grupo de risco da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 15:31:57

Bia: O homossexualismo é uma doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 15:32:14

Bia: Qual a diferença entre gay e travesti?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

#### b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 20:56:18

Bia: O que significa ser homossexual?

Doutor: É mesmo muito difícil para as pessoas enfrentarem uma situação diferente daquela que estão habituadas. Assim, ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, trocando carícias, é uma coisa que ainda choca e incomoda muito. Não adianta ficar encanado com isso e deixar de viver a sua vida do jeito que você acha melhor. As pessoas vão ter que aprender a respeitar você do jeito que você é. Se isso estiver sendo um problema muito grande vale a pena procurar a ajuda de um terapeuta. Ele pode dar uma força nesse momento mais difícil

Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 20:56:51

Bia: O que significa ser bissexual?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 20:57:00

Bia: Os homossexuais ainda fazem parte do principal grupo de risco da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 20:57:11

Bia: O homossexualismo é uma doença?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 20:57:24

Bia: Qual a diferença entre gay e travesti?

Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, fantasias e desejos que todo o ser humano tem.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 21:11:48

Val: De onde vem o sangue da menstruação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 21:12:01

Val: O que é TPM?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 21:12:12

Val: Existe tratamento para a TPM?

Doutor: A TPM pode acontecer em qualquer idade, desde que a mulher já menstrue

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 21:12:29

Val: Por que durante a menstruação muitas garotas tem cólica?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 21:12:47

Val: É normal o peito ficar maior durante a menstruação?

Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é nada bom. Um monte de problemas podem aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozoides suficientes para gerar um filho.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 21:07:42

Karen: Quais os sintomas da gravidez?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 21:07:55

Karen: Uma garota grávida pode menstruar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozoides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 21:08:09

Karen: Uma mulher grávida pode manter relações sexuais normalmente?

Doutor: Em recente pesquisa realizada pelo Istoé on-line, os homens transam em média 3,3 vezes por semana e mulheres, 2,6, sendo portanto um problema de ordem individual.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 21:08:22

Karen: Uma mulher pode engravidar se estiver menstruada?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 21:08:40

Karen: O que é o período fértil?

Doutor: O período fértil são os dias em que a garota tem uma chance maior de engravidar. Ele vai depender da duração do ciclo menstrual. A ovulação (liberação do óvulo pelo ovário) geralmente ocorre em torno de 14 dias antes do início da próxima menstruação e representa o período de maior fertilidade da mulher. Temos que levar em conta ainda uma "margem de segurança" de 5 dias antes e 5 dias depois da ovulação. Assim, num ciclo normal de 28 dias, a ovulação deve ocorrer no 14º dia e o período fértil irá do 9º dia até o 19º dia. Já num ciclo de 30 dias, a ovulação se dará no 16º dia e o período fértil estará compreendido entre o 11º dia e o 21º dia. Fora desse período as chances de engravidar são mínimas.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 21:09:42

Paula: Quais as formas de transmissão da AIDS?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 21:09:56

Paula: O que é AIDS?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 21:10:05

Paula: O tratamento da Aids é eficaz?

Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 21:10:21

Paula: Podemos pegar aids no dentista?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 21:10:36

Paula: Quando a AIDS chegou no Brasil?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 20:48:54

Bruno: Em que época os pelos começam a aparecer?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 20:49:07

Bruno: Qual o tamanho normal do pênis?



Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 20:49:20

Bruno: O que é hímen?

Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no qual o hímen ainda está intacto. O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 20:49:48

Bruno: Uma mulher fica com a vagina mais larga depois que tem filho de parto normal?

Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 20:50:07

Bruno: Existe o ponto G?

Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de servir para impedir a passagem dos espermatozoides para o útero, protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

May 27, 2002 - 21:05:33

Jader: Quais as DSTs mais comuns?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

May 27, 2002 - 21:05:49

Jader: O que é a sífilis?

Doutor: A sífilis é uma DST causada pela bactéria *Treponema pallidum*, transmitida não só pela relação sexual, como por transmissão vertical mãe-filho e por transfusão de sangue contaminado. Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Porém, se a doença não for tratada nessa fase primária, surge a fase secundária, caracterizada pelo aparecimento de manchas vermelhas na pele, mal estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, podem acarretar doenças mentais, paralisias e morte

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

May 27, 2002 - 21:06:02

Jader: As DSTs são realmente doenças perigosas?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

May 27, 2002 - 21:06:17

Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber?

Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele tem relações promíscuas.

Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

May 27, 2002 - 21:06:31

Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber?

Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele tem relações promíscuas.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

May 27, 2002 - 21:06:39

Jader: Todas as DSTs tem cura?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

### 10.3.6 Questionamentos da 6ª aplicação

#### a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:20

Karen: Por que alguns bebês nascem antes do tempo?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:54

Karen: Em parto normal é necessário corte na vagina?

Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:23

Karen: Quais os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:33:55

Karen: Existe a possibilidade de gravidez fazendo sexo anal?

Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:10

Karen: Se gozar na perna é possível engravidar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:31:04

Val: O que é menopausa?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:31:31

Val: O absorvente interno agride a vagina?

Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o tipo mais adequado.

Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:32:06

Val: Quando a menina está menstruada e tem coceira na vagina, pode ser o absorvente?

Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve procurar um médico para exame local.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:32:48

Val: É normal a menstruação desregulada?

Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é nada bom. Um monte de problemas pode aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozoides suficientes para gerar um filho.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:33:25

Val: Uma mulher pode transar menstruada?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozoide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:35:37

Bruno: Como ocorre a ereção ?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:35:52

Bruno: O HÍMEN PODE SE ROMPER DURANTE A MASTURBAÇÃO?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:36:27

Bruno: Qual o tamanho de uma vagina?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:36:59

Bruno: O que é clitóris?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:37:15

Bruno: É verdade que a masturbação afina o pênis?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:32:18

Bia: O que é homofobia?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a Síndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:33:16

Bia: Qual a causa de uma pessoa ser homossexual?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:34:06

Bia: É verdade que a mulher que se masturba demais fica frígida?

Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozóides) dentro da vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozóides (após a ejaculação) saem pelo pênis acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua movimentação Na vagina, os espermatozóides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da vagina) que facilita o deslocamento.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:34:38

Bia: O que é coito interrompido?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozóides.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:35:02

Bia: Qual é a idade aproximada para que a menstruação desça?

Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio para receber o óvulo fecundado. Não havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o sangramento.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:31:22

Jader: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS?

Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:32:23

Jader: O que é o cancro mole?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:33:31

Jader: Quais os sintomas da hepatite B?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:34:09

Jader: O que fazer quando desconfiar que se está com uma DST ?

Doutor: A menopausa não influencia na possibilidade de contrair DSTs. Depende da vida sexual da mulher e da escolha de seus parceiros.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:34

Jader: O que é condiloma cuminado?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 15:33:07

Paula: A aids se pega através do beijo na boca?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 15:33:43

Paula: É possível pegar AIDS usando roupas de outras pessoas ou banheiros públicos?

Doutor: É muito pouco provável que um espermatozóide consiga atravessar a roupa do garoto, a roupa da garota e ainda chegar firme e forte até a vagina. Gravidez acontece quando o garoto introduz o pênis dentro da vagina da garota e cria uma via de acesso direto para os espermatozoides

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 15:34:21

Paula: A mulher grávida passa o HIV para o bebê?

Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozoides) dentro da vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozoides (após a ejaculação) saem pelo pênis acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua movimentação Na vagina, os espermatozoides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da vagina) que facilita o deslocamento.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 15:34:44

Paula: Que exame detecta o HIV?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:34:58

Paula: O que são doenças oportunistas?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 22:29:11

Karen: Por que alguns bebês nascem antes do tempo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 22:30:54

Karen: Em parto normal é necessário corte na vagina?

Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 22:31:23

Karen: Quais os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada?

Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafragma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 22:32:55

Karen: Existe a possibilidade de gravidez fazendo sexo anal?

Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 22:34:10

Karen: Se gozar na perna é possível engravidar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 22:36:04

Val: O que é menopausa?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 22:37:31

Val: O absorvente interno agride a vagina?

Doutor: Pode, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o tipo mais adequado.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 22:39:06

Val: Quando a menina está menstruada e tem coceira na vagina, pode ser o absorvente?

Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve procurar um médico para exame local.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 22:39:48

Val: É normal a menstruação desregulada?

Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é nada bom. Um monte de problemas pode aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozóides suficientes para gerar um filho.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 22:40:25

Val: Uma mulher pode transar menstruada?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 22:45:37

Bruno: Como ocorre a ereção ?

Doutor: A origem da AIDS parece ser do macaco, encontrado pela primeira vez na África

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 22:46:05

Bruno: O HÍMEN PODE SE ROMPER DURANTE A MASTURBAÇÃO?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 22:46:39

Bruno: Qual o tamanho de uma vagina?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 22:47:29

Bruno: O que é clitoris?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 22:48:15

Bruno: É verdade que a masturbação afina o pênis?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 22:52:18

Bia: O que é homofobia?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 22:53:16

Bia: Qual a causa de uma pessoa ser homossexual?

Doutor: Segundo Freud, é somente após a puberdade que o comportamento sexual assume uma forma definitiva.

Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 22:54:06

Bia: É verdade que a mulher que se masturba demais fica frígida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 22:54:38

Bia: O que é coito interrompido?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contêm espermatozoides.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 15:54:52

Bia: Qual é a idade aproximada para que a menstruação desça?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Pode ser combatida com o uso de bolsa de água quente no abdome e/ou exercícios físicos leves, quando a dor é decorrente de contração muscular do útero. Em casos de dores mais fortes o ideal é consultar um ginecologista

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 22:56:00

Jader: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS?

Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 22:56:23

Jader: O que é o cancro mole?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 22:57:11

Jader: Quais os sintomas da hepatite B?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 22:57:55

Jader: O que fazer quando desconfiar que se está com uma DST ?

Doutor: A menopausa não influencia na possibilidade de contrair DSTs. Depende da vida sexual da mulher e da escolha de seus parceiros.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 22:58:34

Jader: O que é condiloma cuminado?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo



assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 7, 2002 - 23:00:07

Paula: A aids se pega através do beijo na boca?

Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou esterilizados

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 7, 2002 - 23:00:43

Paula: É possível pegar AIDS usando roupas de outras pessoas ou banheiros públicos?

Doutor: É muito pouco provável que um espermatozóide consiga atravessar a roupa do garoto, a roupa da garota e ainda chegar firme e forte até a vagina. Gravidez acontece quando o garoto introduz o pênis dentro da vagina da garota e cria uma via de acesso direto para os espermatozóides

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 7, 2002 - 23:01:21

Paula: A mulher grávida passa o HIV para o bebê?

Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozóides) dentro da vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozóides (após a ejaculação) saem pelo pênis acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua movimentação Na vagina, os espermatozóides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da vagina) que facilita o deslocamento.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 7, 2002 - 23:02:44

Paula: Que exame detecta o HIV?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 7, 2002 - 23:03:25

Paula: O que são doenças oportunistas?

Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

### 10.3.7 Questionamentos da 7ª aplicação

#### a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:06:10

Val: O absorvente interno pode se perder dentro da mulher?

Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o tipo mais adequado.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:06:40

Val: Por que sentimos cólicas quando menstruamos?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:07:17

Val: Uma menina de 15 anos que ainda não teve a primeira menstruação, pode ter algum problema?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:08:29

Val: Por quanto tempo em média uma garota fica menstruada?

Doutor: Durante a gravidez, sangramento é sempre sinal de problema. Caso ocorra, a garota deve procurar um médico.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:08:45

Val: Como são produzidos os espermatozoides e os óvulos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:03:27

Paula: Por que muitos adéticos são magros?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:05:15

Paula: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:06:12

Paula: Depois de quanto tempo uma pessoa que contraiu o vírus da AIDS começa a ser transmissora?

Doutor: Ser portador e ter o vírus da AIDS é a mesma coisa. O que diferencia é que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não, porque o sistema imunológico das pessoas é diferente e portanto, as respostas orgânicas são diferentes.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:07:27

Paula: Há perigo de a camisinha feminina furar?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:08:07

Paula: Qual o risco do coito interrompido para a gravidez?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:02:39

Karen: O que são zonas erógenas?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:03:16

Karen: Pra que serve o pré natal?

Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio para receber o óvulo fecundado. Não havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o sangramento.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:03:49

Karen: Uma mulher pode perder o bebê se durante a gravidez adquirir uma DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:04:10

Karen: A sífilis é transmitida para o feto?

Doutor: Nem todas as doenças são transmitidas ao feto durante a gravidez. Das DSTs somente a AIDS e a Sífilis apresentam transmissão vertical mãe-feto

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:04:46

Karen: Que conseqüências uma sífilis durante a gravidez trás pro bebê?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:03:10

Jader: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:03:58

Jader: Em que consiste a gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:04:49

Jader: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente?

Doutor: A gonorréia pode trazer algumas complicações para os homens como: artrite, meningite, faringite, prostatite, infecção ocular, entre outras. A mulher, se não for tratada, pode se tornar infértil e, se estiver grávida, pode abortar. Pode ocorrer também o parto prematuro, gravidez ectópica, pneumonia, otite média do recém-nascido, entre outras complicações.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:05:35

Jader: O que é janela imunológica?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:07:16

Jader: Em que situação o aborto é permitido?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:03:09

Bruno: Quais as causas da impotência sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:04:23

Bruno: Como é diagnosticada a impotência sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:04:59

Bruno: Existe tratamento para a impotência sexual?

Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em pequenas doses.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:05:53

Bruno: A vasectomia pode deixar o homem impotente?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:06:19

Bruno: O método de coito interrompido é seguro?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozóides.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 18, 2002 - 17:01:49

Bia: Qual o efeito da pílula?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 18, 2002 - 17:02:58

Bia: Qual a diferença entre a pílula e a injeção?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 18, 2002 - 17:03:43

Bia: O que é DIU?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 18, 2002 - 17:04:11

Bia: O que é o método do muco?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 18, 2002 - 17:04:44

Bia: O que é laqueadura?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

## b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:32:47

BIA: Qual o efeito da pílula?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13

centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros.

Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:33:02

bIA: Qual a diferença entre a pílula e a injeção?

Doutor: Entre os homossexuais existe uma diversidade de comportamentos, estilos de vida e estereótipos, entre eles, gays, travestis, transexuais e bofes. Os gays, popularmente chamados de bichas ou entendidos, incluem os "enrustidos" (infelizmente a maioria), as "bichas fechativas" e os "assumidos". As travestis se vestem de mulher, algumas usam silicone ou hormônio para feminilizar seu corpo, infelizmente uma grande parte vive da prestação de serviços sexuais, algumas porque gostam e outras por não conseguir um trabalho socialmente aceito. As transexuais se consideram completamente pertencentes ao sexo oposto ao que nasceram, chegando alguns a realizar a operação para mudança de sexo. Os bofes são rapazes que transam com os homossexuais mas que não assumem a identidade homossexual

Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:33:20

bIA: O que é DIU?

Doutor: Homofobia refere-se à incompreensão, à ignorância e ao medo que a sociedade expressa em relação aos gays, às lésbicas e aos bissexuais

Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:34:17

bIA: O que é o método do muco?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:34:48

bIA: O que é laqueadura?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:55:22

Bruno: O método de coito interrompido é seguro?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:55:33

Bruno: A vasectomia pode deixar o homem impotente?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:55:47

Bruno: Quais as causas da impotência sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:56:07

Bruno: Como é diagnosticada a impotência sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:56:34

Bruno: Existe tratamento para a impotência sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito

pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:45:53

Jader: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:46:14

Jader: Em que consiste a gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:46:33

Jader: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente?

Doutor: A gonorréia pode trazer algumas complicações para os homens como: artrite, meningite, faringite, prostatite, infecção ocular, entre outras. A mulher, se não for tratada, pode se tornar infértil e, se estiver grávida, pode abortar. Pode ocorrer também o parto prematuro, gravidez ectópica, pneumonia, otite média do recém-nascido, entre outras complicações.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:46:45

Jader: O que é janela imunológica?

Doutor: Homofobia refere-se à incompreensão, à ignorância e ao medo que a sociedade expressa em relação aos gays, às lésbicas e aos bissexuais

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:47:48

Jader: Em que situação o aborto é permitido?

Doutor: As causas mais comuns do abortamento espontâneo são: cérvix incompetente, amputada, ou lacerada; anomalias congênitas ou adquiridas da cavidade uterina; hipotireoidismo, diabetes melito, nefrite crônica; infecção aguda; uso de cocaína, especialmente "crack"; ou grave choque emocional. Muitas viroses, mais notavelmente citomegalovírus, herpesvírus; e o vírus da rubéola, têm sido implicadas como fatores causais. Existem também as causas fetais, quase sempre relacionadas à rejeição natural de um feto mal formado.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:49:00

Karen: O que são zonas erógenas?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:49:45

Karen: Pra que serve o pré natal?

Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio para receber o óvulo fecundado. Não havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o sangramento.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:49:58

Karen: Uma mulher pode perder o bebê se durante a gravidez adquirir uma DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:50:33

Karen: A sífilis é transmitida para o feto?

Doutor: Nem todas as doenças são transmitidas ao feto durante a gravidez. Das DSTs somente a AIDS e a Sífilis apresentam transmissão vertical mãe-feto

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:51:01

Karen: Que consequências uma sífilis durante a gravidez trás pro Bebê?

Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:29:47

Paula: Por que muitos aidéticos são magros?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:30:17

Paula: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha?

Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve procurar um médico para exame local

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:30:45

Paula: Depois de quanto tempo uma pessoa que contraiu o vírus da AIDS começa a ser transmissora?

Doutor: Ser portador e ter o vírus da AIDS é a mesma coisa. O que diferencia é que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não, porque o sistema imunológico das pessoas é diferente e portanto, as respostas orgânicas são diferentes.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:31:12

Paula: Há perigo de a camisinha feminina furar?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozoides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozoides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:31:22



Paula: Qual o risco do coito interrompido para a gravidez?

Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham espermatozoides.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 19, 2002 - 08:52:44

Val7s: O absorvente interno pode se perder dentro as mulher?

Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o tipo mais adequado.

Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 19, 2002 - 08:53:29

Val7s: Por que sentimos cólicas quando menstruamos?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Val7s: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 19, 2002 - 08:53:55

Val7s: Uma menina de 15 anos que ainda não teve a primeira menstruação, pode ter algum problema?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 19, 2002 - 08:54:14

Val7s: Por quanto tempo em média uma garota fica menstruada?

Doutor: Durante a gravidez, sangramento é sempre sinal de problema. Caso ocorra, a garota deve procurar um médico.

Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 19, 2002 - 08:54:25

Val7s: Como são produzidos os espermatozoides e os óvulos?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito

### 10.3.8 Questionamentos da 8ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:01:28

Bia: O que é diafragma?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozoides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:02:18

Bia: O que é a pílula do dia seguinte?

Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:02:49

Bia: O que é vasectomia?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:04:05

Bia: Pílulas anticoncepcionais diminuem o desejo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:04:36

Bia: Por que o pênis fica duro?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:02:58

Bruno: O que é sexualidade?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:03:23

Bruno: Faz mal transar durante a gravidez?

Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:04:48

Bruno: O que é abuso sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:05:36

Bruno: A vasectomia é reversível?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:06:26

Bruno: o que é cabaço?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozoides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:02:10

Val: Quais as principais DSTs?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:03:12

Val: Existe menopausa masculina?

Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em pequenas doses.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:04:13

Val: Há a possibilidade de uma pessoa infectada pelo HIV não ter AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:04:39

Val: Ainda se fala em grupo de risco?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:05:01

Val: Quanto tempo devo esperar para fazer o teste da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:04:19

Paula: Em que situações o aborto é permitido?

Doutor: No Brasil, o aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal). Atualmente, já existem hospitais públicos que realizam o aborto nestas hipóteses.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:04:53

Paula: Pra que serve o pré natal na gravidez?

Doutor: O pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê durante toda a gravidez. Durante o pré-natal são feitas várias consultas, exames e orientações para cuidar da saúde da mãe e do bebê. Adolescentes que fazem o pré-natal desde o início e durante toda a gestação, não têm maior risco na gravidez, no parto e para o bebê, do que mulheres adultas. É durante o pré-natal que o médico saberá se está tudo bem com a mãe e com o bebê.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:05:24

Paula: Que DSTs podem ser prevenidas por vacinas?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:05:44

Paula: Como o homem pode ter certeza que o nenê é mesmo dele?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:06:03

Paula: Quais os tipos de parto que existem?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:03:10

Jader: Se um homem tem fimose ele pode ter relações sexuais?

Doutor: a não ser que o médico profba ( por outros problemas físicos da gestante), o sexo pode ser praticado com segurança durante toda a gravidez.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:04:01

Jader: Qual a diferença entre ejaculação e orgasmo?

Doutor: A pílula ou a injeção tem o efeito de impedir a ovulação, ou seja, a saída do óvulo do ovário para a trompa, impedindo assim que ocorra uma fecundação. Elas contêm hormônios femininos e esses hormônios é que impedem a ovulação. A diferença entre a pílula e a injeção é que as pílulas são comprimidos tomados todos os dias e a injeção são, dependendo do tipo, tomadas uma vez por mês ou a cada três meses.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:04:44

Jader: Usar cuecas apertadas faz mal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:06:32

Jader: Por que o pênis fica duro?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:06:48

Jader: Com que idade o pênis pára de crescer?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 14:02:45

Karen: Mulher virgem pode engravidar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozoides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 14:03:18

Karen: Quando procurar o ginecologista pela primeira vez?

Doutor: Na maioria das vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e não ocasiona sangramento

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 14:04:08

Karen: Homem tem corrimento?

Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 14:04:37

Karen: Teste de farmácia funciona para saber se a mulher está grávida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 14:05:27

Karen: O que é ciclo menstrual?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

#### b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 19:04:16

Val: Quais as principais DSTs?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 19:04:30

Val: Existe menopausa masculina?

Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em pequenas doses.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 19:04:42

Val: Há a possibilidade de uma pessoa infectada pelo HIV não ter AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 19:04:55

Val: Ainda se fala em grupo de risco?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 19:05:06

Val: Quanto tempo devo esperar para fazer o teste da AIDS?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 19:05:55

Paula: Quais os tipos de parto que existem?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 19:06:19

Paula: Como o homem pode ter certeza que o nenê é mesmo dele?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 19:06:36

Paula: Que DSTs podem ser prevenidas por vacinas?

Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou algum problema orgânico. É necessário procurar o médico

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 19:06:48

Paula: Pra que serve o pré natal na gravidez?

Doutor: O pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê durante toda a gravidez. Durante o pré-natal são feitas várias consultas, exames e orientações para cuidar da saúde da mãe e do bebê. Adolescentes que fazem o pré-natal desde o início e durante toda a gestação, não têm maior risco na gravidez, no parto e para o bebê, do que mulheres adultas. É durante o pré-natal que o médico saberá se está tudo bem com a mãe e com o bebê.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 19:06:58

Paula: Em que situações o aborto é permitido?

Doutor: No Brasil, o aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal). Atualmente, já existem hospitais públicos que realizam o aborto nestas hipóteses.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 19:01:45

Karen: Mulher virgem pode engravidar?

Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozoides podem subir até as trompas e se a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 19:02:00

Karen: Quando procurar o ginecologista pela primeira vez?

Doutor: Em qualquer circunstância, seja a primeira vez ou não, a mulher pode engravidar desde que esteja no período fértil e que tenha transado sem proteção (camisinha ou outro método contraceptivo)

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 19:02:25

Karen: Homem tem corrimento?

Doutor: É importante ter consciência de que as necessidades das pessoas são diferenciadas em vários outros aspectos e também em relação ao sexo, e isso é absolutamente normal. Pois bem, o ritmo sexual é apenas mais uma delas. Isso não quer dizer que o homem tem mais necessidade de sexo do que as mulheres. O que muda é o biorritmo que cada pessoa. O importante é não permitir que tal fato interfira na vida conjugal de duas pessoas.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 19:02:37

Karen: Teste de farmácia funciona para saber se a mulher está grávida?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 19:02:46

Karen: O que é ciclo menstrual?

Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 18:58:15

Jader: Se um homem tem fimose ele pode ter relações sexuais?

Doutor: a não ser que o médico profba ( por outros problemas físicos da gestante), o sexo pode ser praticado com segurança durante toda a gravidez.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 18:59:28

Jader: Qual a diferença entre ejaculação e orgasmo?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 18:59:46

Jader: Usar cuecas apertadas faz mal?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 18:59:54

Jader: Por que o pênis fica duro?

Doutor: Não, não é verdade. A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja frequência depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 19:00:16

Jader: Com que idade o pênis pára de crescer?

Doutor: A média de idade da primeira menstruação é entre os 11 e 12 anos. Mas, isto varia de mulher para mulher, podendo ocorrer antes para umas (por exemplo, aos 9 anos) e depois para outras (até os 18 e 19 anos), sendo totalmente normal.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 19:09:06

Bruno: O que é sexualidade?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 19:09:25

Bruno: Faz mal transar durante a gravidez?

Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 19:09:35

Bruno: O que é abuso sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 19:09:43

Bruno: A vasectomia é reversível?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 19:09:52

Bruno: O que é cabaço?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jun 24, 2002 - 18:55:47

Bia: O que é a pílula do dia seguinte?

Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jun 24, 2002 - 18:56:02

Bia: O que é diafragma?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jun 24, 2002 - 18:56:16

Bia: O que é vasectomia?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jun 24, 2002 - 18:56:25

Bia: Pílulas anticoncepcionais diminuem o desejo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jun 24, 2002 - 18:56:35

Bia: Por que o pênis fica duro?

Doutor: Não, não é verdade. A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja frequência depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

### *10.3.9 Questionamentos da 9ª aplicação*

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:20:09

Bia: O que é menarca?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:20:47

Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua?

Doutor: A menstruação não atrapalha a relação sexual. Porém, não devemos descuidar da proteção neste período, pois o risco de uma gravidez indesejada, ainda que pequeno, existe.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito



Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:21:29

Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar?

Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos culotes, nádegas e seios.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:22:14

Bia: O uso contínuo da pílula por muito tempo pode causar esterilidade?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:22:45

Bia: O que é vaginismo?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:21:30

Bruno: O que é orgia?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:22:24

Bruno: O que é espanhola?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:23:00

Bruno: Com quantos anos pode começar a se masturbar?

Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:23:27

Bruno: Quais as DSTs mais frequentes?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:25:27

Bruno: O que é cancro mole?

Doutor: São feridas dolorosas com a base mole. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. Aparece com frequência em climas tropicais. Pode ser chamada também de cancro venéreo e, popularmente, é conhecida como cavalo. É transmitida de forma sexual, exclusivamente. É altamente contagiosa. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. Os principais sintomas são lesões dolorosas, geralmente múltiplas. Tem odor forte e se a pele superficial em estado necrótico for removida, sangra facilmente. No homem, aparece mais freqüentes no frênulo e sulco bálango-prepucial; na mulher, face interna dos pequenos e grandes lábios.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:17:17

Paula: Quanto tempo levará, após o parto, para a mulher ficar com as formas anteriores à gravidez?

Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:18:38

Paula: As camisinhas podem evitar as DSTs?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:19:17

Paula: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:20:12

Paula: O que é fimose?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:20:38

Paula: Duchas vaginais podem evitar a gravidez?

Doutor: A mãe não transmite a gonorréia para o filho durante a gravidez. Porém, na hora do parto, quando for parto normal, a criança pode ser infectada no canal do parto

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:11:37

Karen: O que é ser virgem?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:12:21

Karen: Por que a virgindade sempre é referida em relação as mulheres?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:13:17

Karen: Como funciona a tabelinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a

relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:14:04

Karen: Que fatores podem alterar o ciclo menstrual?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:14:26

Karen: Corrimento vaginal é sinal de DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:16:45

Val: O que é pediculose pubiana?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:17:21

Val: É normal se masturbar?

Doutor: Após a 1ª menstruação pode demorar até dois anos para que a menstruação fique regulada, isso é normal. Mas em outras condições é sempre legal procurar a orientação de um serviço de saúde

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:18:06

Val: O que é condiloma acuminado?

Doutor: Condiloma acuminado é uma infecção causada por vírus HPV (Human Papilloma Viruses). HPV é um grupo de vírus com mais de 70 tipos. Os condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção pelo vírus do grupo HPV. Os locais mais afetados são a glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero na mulher. Os principais sintomas são o aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. É comum a doença voltar a aparecer mesmo com o tratamento adequado. Pode ser também que as lesões desapareçam espontaneamente.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:18:23

Val: Quais os sintomas da pediculose pubiana?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:19:08

Val: Como escolher um método contraceptivo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 10:21:47

Jader: O que é educação sexual?

Doutor: Abuso sexual é qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é veiculada sem o consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando em violência psicológica, social e/ou física. Em casos de abuso sexual a autoridade judiciária a que se recorre (fóruns, delegacias, conselhos tutelares) dará o devido encaminhamento de acordo com as particularidades da situação. No caso de o abuso resultar em gravidez, existe a possibilidade, dentro da lei, de se realizar o aborto, mediante comprovação da ocorrência do abuso. À Justiça cabe estabelecer medidas concretas que impeçam que o abuso se repita, bem como encaminhar as pessoas envolvidas para tratamento e responsabilizar legalmente quem o cometeu.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 10:23:06

Jader: Com que idade uma pessoa deve começar sua vida sexual?

Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 10:23:55

Jader: O viagra realmente funciona?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 10:24:24

Jader: O que é Tensão Pré-Menstrual?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 10:25:19

Jader: Uma mulher que está amamentando pode tomar anticoncepcional?

Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozoides dos testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá fazê-la sempre pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

#### b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:17:00

Bia: O que é menarca?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:17:14

Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:17:41

Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:17:58

Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar?

Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos culotes, nádegas e seios.

Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:18:12

Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua?

Doutor: A menstruação não atrapalha a relação sexual. Porém, não devemos descuidar da proteção neste período, pois o risco de uma gravidez indesejada, ainda que pequeno, existe.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

Jul 2, 2002 - 13:18:28

Bia: O que é menarca?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 7

Jul 2, 2002 - 13:18:41

Bia: O que é vaginismo?

Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina).

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 8

Jul 2, 2002 - 13:18:58

Bia: O uso contínuo da pílula por muito tempo pode causar esterilidade?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:15:17

Bruno: O que é orgia?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozoides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:15:36

Bruno: O que é espanhola?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozoides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:15:56

Bruno: Com quantos anos pode começar a se masturbar?

Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:16:04

Bruno: Quais as DSTs mais frequentes?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:16:15

Bruno: O que é cancro mole?

Doutor: São feridas dolorosas com a base mole. Seu agente causador é *Haemophilus ducreyi*. Aparece com freqüência em climas tropicais. Pode ser chamada também de cancro venéreo e, popularmente, é conhecida como cavalo. É transmitida de forma sexual, exclusivamente. É altamente contagiosa. O tratamento é feito com medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. Os principais sintomas são lesões dolorosas, geralmente múltiplas. Tem odor forte e se a pele superficial em estado necrótico for removida, sangra facilmente. No homem, aparece mais freqüentes no frênulo e sulco bálando-prepucial; na mulher, face interna dos pequenos e grandes lábios.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:06:22

Jader: O que é educação sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:06:35

Jader: Com que idade uma pessoa deve começar sua vida sexual?

Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:06:45

Jader: O viagra realmente funciona?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:06:54

Jader: O que é Tensão Pré-Menstrual?

Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um mecanismo de proteção para os espermatozoides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 36,5 graus centígrados).

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:07:16

Jader: Uma mulher que está amamentando pode tomar anticoncepcional?

Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que permita que o HIV seja transmitido

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:09:01

Karen: O que é ser virgem?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:09:14

Karen: Por que a virgindade sempre é referida em relação as mulheres?

Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:09:26

Karen: Como funciona a tabelinha?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:09:41

Karen: Que fatores podem alterar o ciclo menstrual?

Doutor: Ciclo menstrual é o tempo que vai do 1º dia de uma menstruação, ao 1º dia da próxima. Embora um ciclo de 28 a 29 dias seja considerado normal, o número de dias do ciclo menstrual pode variar de uma mulher para outra.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:09:51

Karen: Corrimento vaginal é sinal de DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:11:51

Paula: Quanto tempo levará, após o parto, para a mulher ficar com as formas anteriores à gravidez?

Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:12:00

Paula: As camisinhas podem evitar as DSTs?

Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto.

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:12:09

Paula: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:12:18

Paula: O que é fimose?

Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:12:28

Paula: Duchas vaginais podem evitar a gravidez?

Doutor: A mãe não transmite a gonorréia para o filho durante a gravidez. Porém, na hora do parto, quando for parto normal, a criança pode ser infectada no canal do parto

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 2, 2002 - 13:13:18

Val: O que é pediculose pubiana?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 2, 2002 - 13:13:23

Val: O que é pediculose pubiana?

Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um mecanismo de proteção para os espermatozoides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 36,5 graus centígrados).

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 2, 2002 - 13:13:44

Val: É normal se masturbar?

Doutor: Após a 1ª menstruação pode demorar até dois anos para que a menstruação fique regulada, isso é normal. Mas em outras condições é sempre legal procurar a orientação de um serviço de saúde

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 2, 2002 - 13:13:52

Val: O que é condiloma acuminado?

Doutor: Condiloma acuminado é uma infecção causada por vírus HPV (Human Papilloma Viruses). HPV é um grupo de vírus com mais de 70 tipos. Os condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção pelo vírus do grupo HPV. Os locais mais afetados são a glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero na mulher. Os principais sintomas são o aparecimento de pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. É comum a doença voltar a aparecer mesmo com o tratamento adequado. Pode ser também que as lesões desapareçam espontaneamente.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 2, 2002 - 13:14:00

Val: Quais os sintomas da pediculose pubiana?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 6

Jul 2, 2002 - 13:14:16

Val: Como escolher um método contraceptivo?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

### 10.3.10 Questionamentos da 10ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:07:12

Bia: Existe tratamento para o vaginismo?

Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar café, cigarro e álcool é indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já



as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em pequenas doses.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:07:34

Bia: o que é depressão pós-parto?

Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:08:35

Bia: O que é disfunção sexual?

Doutor: Abuso sexual é qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é veiculada sem o consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando em violência psicológica, social e/ou física. Em casos de abuso sexual a autoridade judiciária a que se recorre (fóruns, delegacias, conselhos tutelares) dará o devido encaminhamento de acordo com as particularidades da situação. No caso de o abuso resultar em gravidez, existe a possibilidade, dentro da lei, de se realizar o aborto, mediante comprovação da ocorrência do abuso. À Justiça cabe estabelecer medidas concretas que impeçam que o abuso se repita, bem como encaminhar as pessoas envolvidas para tratamento e responsabilizar legalmente quem o cometeu.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:09:33

Bia: Como fazer para interromper a menstruação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:10:35

Bia: O que é tricomoníase?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:14:26

Bruno: Quais são os primeiros sintomas de uma gravidez?

Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; diarreia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:15:01

Bruno: Uma mulher sempre engorda ao tomar anticoncepcional?

Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos culotes, nádegas e seios.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:15:23

Bruno: o que são DSTs?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade

para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:16:12

Bruno: Quais as principais DSTs?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:17:13

Bruno: Quais os sintomas da gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:06:57

Jader: Existe alguma DST que não se pega apenas pelo contato sexual?

Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra cavernosas (pênis), cirurgia para colocação de prótese peniana.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:07:46

Jader: O uso do viagra pode causar algum efeito colateral?

Doutor: Ao suspender os anticoncepcionais orais o seu organismo retorna as suas funções normais em 30 a 60 dias. Muito raramente persiste a anovulação (falta de despreendimento do óvulo no ovário) o que vai produzir um período sem menstruação.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:08:29

Jader: O que são os espermicidas?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:09:42

Jader: Pra que serve o exame papa nicolau?

Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio para receber o óvulo fecundado. Não havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o sangramento.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:10:38

Jader: O homem apresenta algum sinal de virgindade?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:05:52

Val: O que pode ser feito para reduzir o risco de contrair o HIV por via sexual?

Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:06:49

Val: Por que os meninos pensam tanto em sexo?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:08:08

Val: O que é puberdade?

Doutor: A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, no qual ocorrem o aparecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o início da fertilidade, alterações hormonais e a parada do crescimento. Este processo complexo tem por finalidade capacitar o indivíduo para procriação e perpetuação da espécie. Nas meninas as alterações são representadas pelo aparecimento do broto mamário, de pêlos pubianos, desenvolvimento genital, distribuição feminina de gordura e as menstruações, finalizando o desenvolvimento puberal. Nos meninos surgem os pêlos, barba, engrossamento de voz, desenvolvimento muscular, acne e desenvolvimento genital. Nos meninos inicia em geral aos 14 anos e nas meninas aos 13 anos

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:09:04

Val: O que fazer quando o cara brochar?

Doutor: Parar de ter relações sexuais; Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame médico

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:11:54

Val: O hímen pode ser restaurado?

Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou algum problema orgânico. É necessário procurar o médico

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:14:35

Karen: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS?

Doutor: Em todas as práticas sexuais desprotegidas (sem camisinha) corre-se o risco de pegar AIDS e outras DST. Estudos dizem que o sexo anal desprotegido oferece o maior risco de contaminação, depois o sexo vaginal, e em terceiro o sexo oral. Mas risco é risco e não importa o tamanho dele, por que pode se contaminar.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:15:52

Karen: Por que é tão importante fazer o pré-natal?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:17:27

Karen: O que é andropausa?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade

para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:18:22

Karen: O que é laqueadura?

Doutor: A laqueadura é uma cirurgia realizada na mulher com a finalidade de evitar definitivamente a concepção. A mulher só deve optar por este método se estiver bem informada e segura dessa decisão porque, para voltar a ter filhos/as, é necessário uma nova operação que, além de cara, nem sempre dá resultados positivos. Não deve ser feita em adolescentes

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:18:57

Karen: O que é diafragma?

Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozoides alcancem os óvulos. Normalmente é utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1ª vez por um médico, que escolhe o tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar. Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 horas.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 09:04:08

Paula: É normal a relação sexual doer?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 09:05:32

Paula: A pílula anticoncepcional pode ser tomada por qualquer mulher?

Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. Diferente das pílulas comuns, elas não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas todas as mulheres podem usá-las. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas pílulas comuns

Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 09:07:07

Paula: O que é ejaculação precoce?

Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo antes da sensação de satisfação sexual

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 09:07:28

Paula: Para que serve o espermicida?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 09:08:10

Paula: O que é a mini-pílula?

Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:13:00

Bia: O que é tricomoníase?

Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:13:13

Bia: Como fazer para interromper a menstruação?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:13:21

Bia: O que é disfunção sexual?

Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:13:32

Bia: o que é depressão pós-parto?

Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:13:49

Bia: Existe tratamento para o vaginismo?

Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em pequenas doses.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:25:43

Bruno: Quais são os primeiros sintomas de uma gravidez?

Doutor: Em geral, a primeira coisa que acontece é a ausência de menstruação. Outros sinais que podem aparecer, devido à mudança hormonal: sonolência, enjoos, vômitos, seios sensíveis, vontade de urinar a toda hora.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:26:04

Bruno: Uma mulher sempre engorda ao tomar anticoncepcional?

Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos culotes, nádegas e seios.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:26:15

Bruno: o que são DSTs?

Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:26:28

Bruno: Quais as principais DSTs?

Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:26:36

Bruno: Quais os sintomas da gonorréia?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:15:29

Jader: Existe alguma DST que não se pega apenas pelo contato sexual?

Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem mutuamente.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:15:42

Jader: O uso do viagra pode causar algum efeito colateral?

Doutor: Ao suspender os anticoncepcionais orais o seu organismo retorna as suas funções normais em 30 a 60 dias. Muito raramente persiste a anovulação (falta de despreendimento do óvulo no ovário) o que vai produzir um período sem menstruação.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:15:50

Jader: O que são os espermicidas?

Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém espermatozoides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:15:59

Jader: Pra que serve o exame papa nicolau?

Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio para receber o óvulo fecundado. Não havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o sangramento.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:16:08

Jader: O homem apresenta algum sinal de virgindade?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:17:46

Karen: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS?

Doutor: Em todas as práticas sexuais desprotegidas (sem camisinha) corre-se o risco de pegar AIDS e outras DST. Estudos dizem que o sexo anal desprotegido oferece o maior risco de contaminação, depois o sexo vaginal, e em terceiro o sexo oral. Mas risco é risco e não importa o tamanho dele, por que pode se contaminar.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:17:59

Karen: Por que é tão importante fazer o pré-natal?

Doutor: Todo mundo conhece a cena clássica do garoto entrando no banheiro com uma revista de mulheres peladas. Apesar de não serem tão populares no mundo feminino, as mulheres também podem usar imagens de nus para se excitar. Aliás, tudo o que vale para os homens pode valer para as garotas: vídeos pornôs, tele-sexo, sexo virtual... A satisfação física vem principalmente do toque. A menina pode acariciar seus grandes e pequenos lábios, o clitóris e a vagina, usando os dedos ou acessórios como vibradores. Mas não existem regras definidas: se a garota gosta de acariciar seus seios, tá valendo! Se ela gosta de usar a ducha de água do chuveiro, por que não? Ou seja, tudo o que dê prazer pode entrar no jogo!

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:18:08

Karen: O que é andropausa?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:18:16

Karen: O que é laqueadura?

Doutor: A laqueadura é uma cirurgia realizada na mulher com a finalidade de evitar definitivamente a concepção. A mulher só deve optar por este método se estiver bem informada e segura dessa decisão porque, para voltar a ter filhos/as, é necessário uma nova operação que, além de cara, nem sempre dá resultados positivos. Não deve ser feita em adolescentes

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:18:24

Karen: O que é diafragma?

Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozoides alcancem os óvulos. Normalmente é utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1ª vez por um médico, que escolhe o tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar. Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 horas.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:19:36

Paula10s: É normal a relação sexual doer?

Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso.

Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:19:50

Paula10s: A pílula anticoncepcional pode ser tomada por qualquer mulher?

Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. Diferente das pílulas comuns, eles não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas todas as mulheres podem usá-lo. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas pílulas comuns

Avaliação da resposta por Paula10s: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:20:00

Paula10s: O que é ejaculação precoce?

Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse

processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo antes da sensação de satisfação sexual

Avaliação da resposta por Paula10s: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:20:12

Paula10s: Para que serve o espermicida?

Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um mecanismo de proteção para os espermatozoides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 36,5 graus centígrados).

Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:20:25

Paula10s: O que é a mini-pílula?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Jul 4, 2002 - 11:22:37

Val: O que pode ser feito para reduzir o risco de contrair o HIV por via sexual?

Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Jul 4, 2002 - 11:23:00

Val: Por que os meninos pensam tanto em sexo?

Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Jul 4, 2002 - 11:23:10

Val: O que é puberdade?

Doutor: A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, no qual ocorrem o aparecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o início da fertilidade, alterações hormonais e a parada do crescimento. Este processo complexo tem por finalidade capacitar o indivíduo para procriação e perpetuação da espécie. Nas meninas as alterações são representadas pelo aparecimento do broto mamário, de pêlos pubianos, desenvolvimento genital, distribuição feminina de gordura e as menstruações, finalizando o desenvolvimento puberal. Nos meninos surgem os pêlos, barba, engrossamento de voz, desenvolvimento muscular, acne e desenvolvimento genital. Nos meninos inicia em geral aos 14 anos e nas meninas aos 13 anos

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Jul 4, 2002 - 11:23:27

Val: O que fazer quando o cara brochar?

Doutor: Parar de ter relações sexuais; Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame médico

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Jul 4, 2002 - 11:23:38

Val: O hímen pode ser restaurado?

Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou algum problema orgânico. É necessário procurar o médico

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito



### 10.3.11 Questionamentos da 11ª aplicação

a) Com *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:03:03

Bruno: Homem tem corrimento?

Doutor: Os corrimentos no homem aparecem no canal da urina, ou uretra, podendo ser percebidos mais facilmente pela manhã. As uretrites mais frequentes são a gonorréia, a infecção pela clamídia e a tricomoníase.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:04:10

Bruno: O que são uretrites?

Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozoides alcancem os óvulos. Normalmente é utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1ª vez por um médico, que escolhe o tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar. Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 horas.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:04:59

Bruno: O que é libido?

Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo pênis, dedo, ou espéculo ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:05:27

Bruno: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha?

Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de servir para impedir a passagem dos espermatozoides para o útero, protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:07:22

Bruno: O que o estupro pode causar com o organismo de uma mulher?

Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozoides dos testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá fazê-la sempre pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:06:25

Bia: O que é inseminação artificial?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcoólicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:07:12

Bia: Se o meu companheiro tiver aids e eu não, posso ter filhos?

Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aids, ou seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS. Significa estar na fase da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. Alguns portadores do HIV podem demorar anos para desenvolver a doença e até mesmo nunca desenvolver. Isto ocorre porque cada pessoa tem uma resposta imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. Hoje, entretanto, é necessário acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:07:57

Bia: Como são o exame e a consulta ginecológica?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:08:35

Bia: Quais são os exames que os adolescentes devem fazer?

Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo.

Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:09:57

Bia: Como funciona a pílula do dia seguinte?

Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte.

Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:05:57

Jader: Existe tratamento para a impotência sexual?

Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra cavernosas (pênis), cirurgia para colocação de prótese peniana.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:06:27

Jader: O que é a vasectomia?

Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozoides dos testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá fazê-la sempre pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:08:11

Jader: Que fatores podem levar um homem a ter impotência?

Doutor: Fazendo o exame de investigação de paternidade por análise de DNA. Este exame oferece mais de 99,999... % de garantia em seus resultados, sendo o mais eficiente se comparado a todos os outros exames que poderiam ser feitos para o mesmo fim. Isso porque todos nós possuímos, em quase todas as células de nosso corpo, informações genéticas que estão contidas em moléculas de ácido desoxirribonucléico, mais conhecido como DNA. As informações genéticas se apresentam em duas cópias (alelos), uma herdada da mãe e outra do pai, que juntas vão determinar nossas características individuais: cor dos olhos, cor dos cabelos, etc. É através do

cruzamento desses dados que a Ciência verifica, com exatidão, se um indivíduo é mesmo pai de determinada pessoa.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:11:22

Jader: Uma pessoa com AIDS pode amamentar?

Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:12:35

Jader: Por que algumas mulheres enjoam dos maridos durante a gravidez?

Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:04:55

Karen: Sentir dores durante a relação sexual pode ser sinal de DST?

Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou algum problema orgânico. É necessário procurar o médico

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:05:33

Karen: Qual é o tamanho de um pênis normal?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros. Geralmente, o pênis de um rapaz cresce até os 18 anos. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:06:00

Karen: Transar uma única vez pode engravidar?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:07:52

Karen: A droga transmite AIDS?

Doutor: O vírus HIV foi isolado em fluídos corporais como saliva, lágrimas e urina mas, como estudos comprovam, a infectividade dos vírus desses fluídos são extremamente baixas então, o HIV só pode ser transmitido de forma sexual, sanguínea e vertical.

Avaliação da resposta por Karen: Parcialmente Satisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:09:03

Karen: É errado se masturbar?

Doutor: A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja frequência depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:03:45

Val: Como se faz a tabelinha?

Doutor: A tabela é um método natural que exige muita disciplina. O ciclo normal da mulher é de 28 à 30 dias e a ovulação se dá no 14º dia ou 2 dias antes ou 2 dias depois. Portanto, é necessário evitar a ejaculação na vagina no 14º, 15º dias e 4 dias antes e 4 dias depois, chamado período de perigo, por ser fértil. Tabelinha não é considerada segura. Prefira a camisinha ou a pílula anticoncepcional.

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:04:15

Val: A camisinha diminui o prazer sexual?

Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo de ter atividade sexual.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:04:36

Val: O que é orgasmo?

Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina).

Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:05:23

Val: Como eu posso evitar uma gravidez?

Doutor: A ducha vaginal é um método de fazer lavagem vaginal logo após as relações sexuais, com o objetivo de retirar o esperma da vagina. Não é nem um pouco eficaz para evitar a gravidez e pode diminuir as defesas naturais da vagina, prejudicando a saúde da mulher. Pode também causar infecções no útero, nas trompas, nos ovários etc. Além disso, não evita DSTs e AIDS.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:06:40

Val: Gozar fora evita pegar DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 5, 2002 - 15:03:38

Paula: O que é pediculose pubiana?

Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto.

Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 5, 2002 - 15:04:17

Paula: Pra que serve o auto exame das mamas?

Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 5, 2002 - 15:04:55

Paula: O que significa orgasmo clítoriano?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 5, 2002 - 15:05:21

Paula: O que significa ser heterossexual?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 5, 2002 - 15:07:31

Paula: Existe cura para a tensão pré-menstrual?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito

b) Sem *Thesaurus*

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:26:00

bia: O que é inseminação artificial?

Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozoides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero.

Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:26:15

bia: Se o meu companheiro tiver aids e eu não, posso ter filhos?

Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aids, ou seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS. Significa estar na fase da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. Alguns portadores do HIV podem demorar anos para desenvolver a doença e até mesmo nunca desenvolver. Isto ocorre porque cada pessoa tem uma resposta imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. Hoje, entretanto, é necessário acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS.

Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:26:25

bia: Como são o exame e a consulta ginecológica?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:26:45

bia: Quais são os exames que os adolescentes devem fazer?

Doutor: Parar de ter relações sexuais; Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame médico

Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:24:29

Bruno: Homem tem corrimento?

Doutor: Os corrimentos no homem aparecem no canal da urina, ou uretra, podendo ser percebidos mais facilmente pela manhã. As uretrites mais frequentes são a gonorréia, a infecção pela clamídia e a tricomoníase.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:24:41

Bruno: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha?

Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de servir para impedir a passagem dos espermatozoides para o útero, protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a

transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção.

Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:24:53

Bruno: O que são uretríte?

Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo pênis, dedo, ou espécuro ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:25:03

Bruno: o que é libido?

Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo pênis, dedo, ou espécuro ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição.

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 6, 2002 - 18:25:11

Bruno: O que o estupro pode causar com o organismo de uma mulher?

Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. Diferente das pílulas comuns, eles não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas todas as mulheres podem usá-lo. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas pílulas comuns

Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:17:47

Jader: Existe tratamento para a impotência sexual?

Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra cavernosas (pênis), cirurgia para colocação de prótese peniana.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:17:53

Jader: O que é a vasectomia?

Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozoides dos testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá fazê-la sempre pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir.

Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:18:02

Jader: Que fatores podem levar um homem a ter impotência?

Doutor: Fazendo o exame de investigação de paternidade por análise de DNA. Este exame oferece mais de 99,999... % de garantia em seus resultados, sendo o mais eficiente se comparado a todos os outros exames que poderiam ser feitos para o mesmo fim. Isso porque todos nós possuímos, em quase todas as células de nosso corpo, informações genéticas que estão contidas em moléculas de ácido desoxirribonucléico, mais conhecido como DNA. As informações genéticas se apresentam em duas cópias (alelos), uma herdada da mãe e outra do pai, que juntas vão determinar nossas características individuais: cor dos olhos, cor dos cabelos, etc. É através do cruzamento desses dados que a Ciência verifica, com exatidão, se um indivíduo é mesmo pai de determinada pessoa.

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:18:15

Jader: Por que algumas mulheres enjoam dos maridos durante a gravidez?

Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 6, 2002 - 18:18:27

Jader: Uma pessoa com AIDS pode amamentar?

Doutor: A natureza furtiva de tantas DSTs as tornam difíceis de diagnosticar. Muitas pessoas com DSTs não têm quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção de DST assintomática não causará problemas mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu médico imediatamente

Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:19:23

Karen: Sentir dores durante a relação sexual pode ser sinal de DST?

Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:19:38

Karen: Qual é o tamanho de um pênis normal?

Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 centímetros. Geralmente, o pênis de um rapaz cresce até os 18 anos. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:19:55

Karen: Transar uma única vez pode engravidar?

Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozoídeo. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:20:08

Karen: A droga transmite AIDS?

Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a síndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana.

Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 6, 2002 - 18:20:21

Karen: É errado se masturbar?

Doutor: A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja frequência depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a.

Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:21:01

Paula: O que é pediculose pubiana?

Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por

roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto.

Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:21:21

paula: O que significa ser heterossexual?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:21:34

paula: Pra que serve o auto exame das mamas?

Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:22:03

paula: O que significa orgasmo clítoriano?

Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 6, 2002 - 18:22:12

paula: Existe cura para a tensão pré-menstrual?

Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação

Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 1

Aug 6, 2002 - 18:23:00

val: Como se faz a tabelinha?

Doutor: A tabela é um método natural que exige muita disciplina. O ciclo normal da mulher é de 28 à 30 dias e a ovulação se dá no 14º dia ou 2 dias antes ou 2 dias depois. Portanto, é necessário evitar a ejaculação na vagina no 14º, 15º dias e 4 dias antes e 4 dias depois, chamado período de perigo, por ser fértil. Tabelinha não é considerada segura. Prefira a camisinha ou a pílula anticoncepcional.

Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 2

Aug 6, 2002 - 18:23:11

val: A camisinha diminui o prazer sexual?

Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo de ter atividade sexual.

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 3

Aug 6, 2002 - 18:23:24

val: O que é orgasmo?

Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina).

Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito

Pergunta gravada número: 4

Aug 6, 2002 - 18:23:35



val: Como eu posso evitar uma gravidez?

Doutor: A ducha vaginal é um método de fazer lavagem vaginal logo após as relações sexuais, com o objetivo de retirar o esperma da vagina. Não é nem um pouco eficaz para evitar a gravidez e pode diminuir as defesas naturais da vagina, prejudicando a saúde da mulher. Pode também causar infecções no útero, nas trompas, nos ovários etc. Além disso, não evita DSTs e AIDS.

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

Pergunta gravada número: 5

Aug 6, 2002 - 18:23:48

val: Gozar fora evita pegar DST?

Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta.

Avaliação da resposta por val: Insatisfeito

## 10.4 Avaliação realizada no Ergolist

### 10.4.1. Critério Presteza

Questão 1 de 17

Os títulos de telas, janelas e caixas de diálogo estão no alto, centrados ou justificados à esquerda?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 17

Todos os campos e mostradores de dados possuem rótulos identificativos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 17

Caso o dado a entrar possua um formato particular, esse formato encontra-se descrito na tela?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 17

As unidades para a entrada ou apresentação de dados métricos ou financeiros encontram-se descritas na tela?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 17

Os rótulos dos campos contêm um elemento específico, por exemplo ":", como convite às entradas de dados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 17

Caso o dado a entrar possua valores aceitáveis esses valores encontram-se descritos na tela?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 7 de 17

Listas longas apresentam indicadores de continuação, de quantidade de itens e de páginas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 17

As tabelas apresentam cabeçalhos para linhas e colunas consistentes e distinguíveis dos dados apresentados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 17

Os gráficos possuem um título geral e rótulos para seus eixos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 10 de 17

Os botões que comandam a apresentação de caixas de diálogo apresentam em seus rótulos o sinal "..." como indicador da continuidade do diálogo?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 11 de 17

As páginas de menus possuem títulos, cabeçalhos ou convites à entrada?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 12 de 17

As opções de menu que levam a outros painéis de menu apresentam o sinal ">" como indicador desse fato?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 13 de 17

O usuário encontra disponíveis as informações necessárias para suas ações?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 14 de 17

Nas caixas de mensagens de erro, o botão de comando "AJUDA" está sempre presente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 15 de 17

O usuário pode obter facilmente ajuda on line e contextual sobre as funcionalidades?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 16 de 17

Existe a possibilidade do usuário obter a lista de comandos básicos da linguagem?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 17 de 17

Na ocorrência de erros, o usuário pode acessar todas as informações necessárias ao diagnóstico e à solução do problema?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.2. Critério Agrupamento/Distinção por Localização

Questão 1 de 11

O espaço de apresentação está diagramado em pequenas zonas funcionais?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 11

A disposição dos objetos de interação de uma caixa de dialogo segue uma ordem lógica?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 11

Nos agrupamentos de dados , os itens estão organizados espacialmente segundo um critério lógico?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 11

Os códigos das teclas aceleradoras de opções de menu estão localizados à direita do nome da opção?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 11

Nas listas de seleção, as opções estão organizadas segundo alguma ordem lógica?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 11

Os painéis de menu são formados a partir de um critério lógico de agrupamento de opções?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 7 de 11

Dentro de um painel de menu, as opções mutuamente exclusivas ou interdependentes estão agrupadas e separadas das demais?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 11

As opções dentro de um painel de menu estão ordenadas segundo algum critério lógico?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 11

A definição da opção de menu selecionada por *default* segue algum critério?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 10 de 11

Os grupos de botões de comando estão dispostos em coluna e à direita, ou em linha e abaixo dos objetos aos quais estão associados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 11 de 11

O botão de comando selecionado por *default* está na posição mais alta, se os botões estão dispostos verticalmente, ou na mais à esquerda, se os botões estão dispostos horizontalmente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

### 10.4.3. Critério Agrupamento/Distinção por Formato

Questão 1 de 17

Os controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das informações apresentadas nas telas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 17

Códigos visuais são empregados para associar diferentes categorias de dados distribuídos de forma dispersa nas telas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 17

Os diferentes tipos de elementos de uma tela de consulta (dados, comandos e instruções) são visualmente distintos uns dos outros?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 17

Os rótulos são visualmente diferentes dos dados aos quais estão associados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Falta o rótulo indicador da entrada da questão e resposta

Questão 5 de 17

Os cabeçalhos de uma tabela estão diferenciados através do emprego de cores diferentes, letras maiores ou sublinhadas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 17

Em situações anormais, os dados críticos e que requeiram atenção imediata são diferenciados através do uso de cores brilhantes como por exemplo, o vermelho ou o rosa?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Opções de avaliação

Questão 7 de 17

Sinais sonoros são empregados para alertar os usuários em relação a uma apresentação visual?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 17

Na apresentação de textos, os recursos de estilo, como itálico, negrito, sublinhado ou diferentes fontes são empregados para salientar palavras ou noções importantes?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

As respostas fornecidas ao aluno poderiam ser formatadas pelo autor

Questão 9 de 17

Os itens selecionados para alteração, atualização ou acionamento estão destacados dos outros?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Na tela de avaliação, não ocorre.

Questão 10 de 17

Nas situações de alarme e nas telas de alta densidade de informação, o recurso de intermitência visual é empregado para salientar dados e informações?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 11 de 17

Os campos obrigatórios são diferenciados dos campos opcionais de forma visualmente clara?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 12 de 17

Nas caixas de mensagens, o botão selecionado por *default* tem uma apresentação visual suficientemente distinta dos outros?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 13 de 17

Em situações em que se exija atenção especial do usuário, as mensagens de alerta e de aviso são apresentadas de maneira distinta?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Em alguns casos não é apresentado mensagem de alerta

Questão 14 de 17

A forma do cursor do *mouse* é diferente da de qualquer outro item apresentado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 15 de 17

As formas de cursores (dois ou mais) apresentados simultaneamente são suficientemente distintas umas das outras?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 16 de 17

As caixas de agrupamento são empregadas para realçar um grupo de dados relacionados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 17 de 17

Quando apresenta opções não disponíveis no momento, o sistema as mostra de forma diferenciada visualmente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.4. Critério Feedback Imediato

Questão 1 de 12

O sistema fornece *feedback* para todas as ações do usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Na avaliação

Na alteração de perguntas/resposta, etc

Questão 2 de 12

Quando, durante a entrada de dados, o sistema torna-se indisponível ao usuário, devido a algum processamento longo, o usuário é avisado desse estado do sistema e do tempo dessa indisponibilidade?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

No processo de gravação

## Questão 3 de 12

O sistema fornece informações sobre o estado das impressões?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 4 de 12

Os itens selecionados de uma lista são realçados visualmente de imediato?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 5 de 12

A imagem do cursor fornece *feedback* dinâmico e contextual sobre a manipulação direta?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 6 de 12

O sistema fornece ao usuário informações sobre o tempo de processamentos demorados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 7 de 12

O sistema apresenta uma mensagem informando sobre o sucesso ou fracasso de um processamento demorado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 8 de 12

O sistema fornece *feedback* imediato e contínuo das manipulações diretas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 9 de 12

O sistema define o foco das ações para os objetos recém criados ou recém abertos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Tela de pergunta e resposta. Tela de abertura

## Questão 10 de 12

O sistema fornece *feedback* sobre as mudanças de atributos dos objetos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 11 de 12

Qualquer mudança na situação atual de objetos de controle é apresentada visualmente de modo claro ao usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

na carga do repertório o botão OK deveria ficar disable até que o repertório desejado fosse selecionado

## Questão 12 de 12

O sistema fornece um histórico dos comandos entrados pelo usuário durante uma sessão de trabalho?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

### 10.4.5 Critério. Legibilidade

## Questão 1 de 27

As áreas livres são usadas para separar grupos lógicos em vez de tê-los todos de um só lado da tela, caixa ou janela?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

abertura, box inspecionar pergunta

## Questão 2 de 27

Os grupos de objetos de controle e de apresentação que compõem as caixas de diálogo e outros objetos compostos encontram-se alinhados vertical e horizontalmente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 27

Os rótulos de campos organizados verticalmente e muito diferentes em tamanho estão justificados à direita?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 27

A largura mínima dos mostradores de texto é de 50 caracteres?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

visualizador de resposta 30 caracteres somente (perdendo posições iniciais para o idioma) - disponibiliza somente 21 caracteres quando o idioma é português. O usuário não tem como ler toda a questão/resposta nesta tela

Questão 5 de 27

A altura mínima dos mostradores de texto é de 4 linhas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 27

Os parágrafos de texto são separados por, pelo menos, uma linha em branco?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

o autor do repertório poderia ter um módulo de formatação de sua resposta.(Vantagem principalmente no caso de respostas longas)

Questão 7 de 27

O uso exclusivo de maiúsculas nos textos é evitado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 27

O uso do negrito é minimizado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 27

O uso do sublinhado é minimizado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 10 de 27

Nas tabelas, linhas em branco são empregadas para separar grupos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 11 de 27 As listas de dados alfabéticos são justificadas à esquerda?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 12 de 27

As listas contendo números decimais apresentam alinhamento pela vírgula?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 13 de 27

As linhas empregadas para o enquadramento e segmentação de menus (separadores, delimitadores etc.) são simples?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 14 de 27

As bordas dos painéis dos menus estão suficientemente separadas dos textos das opções de modo a não prejudicar a sua legibilidade?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 15 de 27

O uso de abreviaturas é minimizado nos menus?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 16 de 27

Os nomes das opções estão somente com a inicial em maiúsculo?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 17 de 27

Os números que indicam as opções de menu estão alinhados pela direita?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 18 de 27

Quando a enumeração alfabética é utilizada, as letras para seleção estão alinhadas pela esquerda?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 19 de 27

As opções das barras de menu horizontal estão separadas por, no mínimo, 2 caracteres brancos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 20 de 27

Os rótulos de campos começam com uma letra maiúscula, e as letras restantes são minúsculas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

tela de adição de perguntas: Frase De Entrada

Questão 21 de 27

Os itens de dados longos são particionados em grupos mais curtos, tanto nas entradas como nas apresentações?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 22 de 27

Os códigos alfanuméricos do sistema agrupam separadamente letras e números?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 23 de 27

Os ícones são legíveis?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 24 de 27

O sistema utiliza rótulos (textuais) quando pode existir ambigüidade de ícones?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 25 de 27

A informação codificada com o vídeo reverso é legível?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 26 de 27

O uso de vídeo reverso está restrito à indicação de *feedback* de seleção?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 27 de 27

Os dados a serem lidos são apresentados de forma contínua, ou seja, não piscantes ?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.6 Critério Concisão

Questão 1 de 14



O sistema oferece valores *defaults* para acelerar a entrada de dados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 14

A identificação alfanumérica das janelas é curta o suficiente para ser lembrada facilmente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 14

Os nomes das opções de menu são concisos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 14

Os ícones são econômicos sob o ponto de vista do espaço nas telas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 14

As denominações são breves?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 14

As abreviaturas são curtas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 7 de 14

Os códigos arbitrários que o usuário deve memorizar são sempre menores do que 4 ou 5 caracteres?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 14

Os rótulos são concisos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 14

Códigos alfanuméricos não significativos para o usuário e que devem ser entrados no sistema são menores do que 7 caracteres?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 10 de 14

Na entrada de dados alfanuméricos, o sistema considera as letras maiúsculas e minúsculas como equivalentes?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 11 de 14

Na entrada de dados numéricos, o usuário é liberado do preenchimento do ponto decimal desnecessário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 12 de 14

Na entrada de dados numéricos, o usuário é liberado do preenchimento de zeros fracionários desnecessários?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 13 de 14

Na entrada de valores métricos ou financeiros, o usuário é liberado do preenchimento da unidade de medida?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 14 de 14

É permitido ao usuário reaproveitar os valores definidos para entradas anteriores, podendo inclusive alterá-los?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Tela de entrada de questões

### 10.4.7 Critério Ações Mínimas

#### Questão 1 de 5

Em formulário de entrada de dados o sistema posiciona o cursor no começo do primeiro campo de entrada?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

visualizador de perguntas/respostas

#### Questão 2 de 5

Na realização das ações principais em uma caixa de diálogo, o usuário tem os movimentos de cursor minimizados através da adequada ordenação dos objetos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

editor de frase - ao dar o input na entrada, ao teclar tab, o cursor vai pro OK e não p/ o adicionar como previsto

#### Questão 3 de 5

O usuário dispõe de um modo simples e rápido (tecla TAB por exemplo) para a navegação entre os campos de um formulário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 4 de 5

Os grupos de botões de comando possuem sempre um botão definido como *default*?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 5 de 5

A estrutura dos menus é concebida de modo a diminuir os passos necessários para a seleção?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

### 10.4.8 Critério Densidade Informacional

#### Questão 1 de 9

A densidade informacional das janelas é reduzida?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 2 de 9

As telas apresentam somente os dados e informações necessários e indispensáveis para o usuário em sua tarefa?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

ex: nº de questões na tela de abertura, Idioma no visualizador de questões. ...

#### Questão 3 de 9

Na entrada de dados codificados, os códigos apresentados somente os dados necessários estão presentes na tela de uma maneira distinguível?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 4 de 9

O sistema minimiza a necessidade do usuário lembrar dados exatos de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 5 de 9

Na leitura de uma janela, o usuário tem seus movimentos oculares minimizados através da distribuição dos objetos principais segundo as linhas de um "Z" ?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### Questão 6 de 9

O sistema evita apresentar um grande número de janelas que podem desconcentrar ou sobrecarregar a memória do usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 7 de 9

Na manipulação dos dados apresentados pelo sistema, o usuário está liberado da tradução de unidades?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 9

As listas de seleção e combinação apresentam uma altura correspondente a um máximo de nove linhas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 9

Os painéis de menu apresentam como ativas somente as opções necessárias?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.9 Critério Ações Explícitas

Questão 1 de 4

O sistema posterga os processamentos até que as ações de entrada do usuário tenham sido completadas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 4

Durante a seleção de uma opção de menu o sistema permite a separação entre indicação e execução da opção ?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 4

Para iniciar o processamento dos dados, o sistema sempre exige do usuário uma ação explícita de "ENTER"?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

tela de entrada: avaliação de resposta

Tela de visualização de pergunta - não existe botão p/ atualizar

Questão 4 de 4

É sempre o usuário quem comanda a navegação entre os campos de um formulário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.10 Critério Controle do Usuário

Questão 1 de 4

O usuário pode terminar um diálogo seqüencial repetitivo a qualquer instante?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 4

O usuário pode interromper e retomar um diálogo seqüencial a qualquer instante?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 4

O usuário pode reiniciar um diálogo seqüencial a qualquer instante?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 4

Durante os períodos de bloqueio dos dispositivos de entrada, o sistema fornece ao usuário uma opção para interromper o processo que causou o bloqueio?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.11 Critério Flexibilidade

Questão 1 de 3

Os usuários têm a possibilidade de modificar ou eliminar itens irrelevantes das janelas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 3

Ao usuário é permitido personalizar o diálogo, através da definição de macros?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 3

É permitido ao usuário alterar e personalizar valores definidos por *default*?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.12 Critério Experiência do Usuário

Questão 1 de 6

Caso se trate de um sistema de grande público, ele oferece formas variadas de apresentar as mesmas informações aos diferentes tipos de usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 6

Os estilos de diálogo são compatíveis com as habilidades do usuário, permitindo ações passo-a-passo para iniciantes e a entrada de comandos mais complexos por usuários experimentados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 6

O usuário pode se deslocar de uma parte da estrutura de menu para outra rapidamente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

não possui atalhos

Questão 4 de 6

O sistema oferece equivalentes de teclado para a seleção e execução das opções de menu, além do dispositivo de apontamento (mouse,...)?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 6

O sistema é capaz de reconhecer um conjunto de sinônimos para os termos básicos definidos na linguagem de comando, isto para se adaptar aos usuários novatos ou ocasionais?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 6

O usuário experiente pode efetuar a digitação de vários comandos antes de uma confirmação?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.13 Critério Proteção contra Erros

Questão 1 de 7

O sistema apresenta uma separação adequada entre áreas selecionáveis de um painel de menu de modo a minimizar as ativações acidentais?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 7

Em toda ação destrutiva, os botões selecionados por *default* realizam a anulação dessa ação?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Às vezes nem tem a opção de cancelar/desfazer

Questão 3 de 7

Os campos numéricos para entrada de dados longos estão subdivididos em grupos menores e pontuados com espaços, vírgulas, hífen ou barras?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 7

Ao final de uma sessão de trabalho o sistema informa sobre o risco de perda dos dados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 7

O sistema emite sinais sonoros quando ocorrem problemas na entrada de dados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 7

As teclas de funções perigosas encontram-se agrupadas e/ou separadas das demais no teclado?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 7 de 7

O sistema solicita confirmação (dupla) de ações que podem gerar perdas de dados e/ou resultados catastróficos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.14 Critério Qualidade das Mensagens de Erros

Questão 1 de 9

As mensagens de erro ajudam a resolver o problema do usuário, fornecendo com precisão o local e a causa específica ou provável do erro, bem como as ações que o usuário poderia realizar para corrigí-lo?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 9

As mensagens de erro são neutras e polidas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

As mensagens de erro são construídas com palavras técnicas e pouco explicam que atitude o usuário deve tomar. Ex tela de resposta.

Questão 3 de 9

As frases das mensagens de erro são curtas e construídas a partir de palavras curtas, significativas e de uso comum?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

No visualizador de respostas ao clicar em alterar item, sem selecionar a resposta que deseja alterar, o sistema dá a mensagem: "Não há item selecionado". Porém existe o campo tipo de seleção que confunde o usuário

Questão 4 de 9

As mensagens de erro estão isentas de abreviaturas e/ou códigos gerados pelo sistema operacional?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 9

O usuário pode escolher o nível de detalhe das mensagens de erro em função de seu nível de conhecimento?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 9

A informação principal de uma mensagem de erro encontra-se logo no início da mensagem?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Algumas mensagens são mal redigidas

Questão 7 de 9

Quando necessário, as informações que o usuário deve memorizar encontram-se localizadas na parte final da mensagem de erro?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 9 Em situações normais as mensagens de erro são escritas em maiúsculo/minúsculo?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 9

As mensagens de erro têm seu conteúdo modificado quando na repetição imediata do mesmo erro pelo mesmo usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.15 Critério Correção de Erros

Questão 1 de 5

Qualquer ação do usuário pode ser revertida através da opção DESFAZER?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 5

Através da opção REFAZER, a regressão do diálogo, também pode ser desfeita?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 3 de 5

Os comandos para DESFAZER e REFAZER o diálogo estão diferenciados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 4 de 5

O sistema reconhece e através de uma confirmação do usuário, executa os comandos mais freqüentes mesmo com erros de ortografia?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 5

Depois de um erro de digitação de um comando ou de dados, o usuário tem a possibilidade de corrigir somente a parte dos dados ou do comando que está errada?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.16 Critério Consistência

Questão 1 de 11

A identificação das caixas, telas ou janelas são únicas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 2 de 11

A organização em termos da localização das várias características das janelas é mantida consistente de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Botão Cancel

Questão 3 de 11

A posição inicial do cursor é mantida consistente ao longo de todas as apresentações de formulários?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Nem sempre o campo de atualização se apresenta com o cursor posicionado

Questão 4 de 11

Uma mesma tecla de função aciona a mesma opção de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 5 de 11

Os ícones são distintos uns dos outros e possuem sempre o mesmo significado de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 11

A localização dos dados é mantida consistente de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

cadastro de perguntas: Ao inserir uma nova questão/resposta, o programa, além de inserir aleatoriamente a questão no BD, não posiciona o cursor sobre a questão recém inserida.

Questão 7 de 11

Os formatos de apresentação dos dados são mantidos consistentes de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 8 de 11

Os rótulos estão na mesma posição em relação aos campos associados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 9 de 11 O símbolo para convite à entrada de dados é padronizado (por exemplo " : ")?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 10 de 11

As áreas de entrada de comandos estão na mesma posição de uma tela para outra?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Ok/ Cancel.

Ora na vertical, ora na horizontal.

Ora é cancel, ora é cancela

Questão 11 de 11

Os significados dos códigos de cores são seguidos de maneira consistente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### *10.4.17 Critério Significado dos Códigos*

Questão 1 de 12

As denominações dos títulos estão de acordo com o que eles representam?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

Em várias telas o título está em inglês.

Certas denominações como visualizador resposta não são adequadas ao objetivo da tela, que seria inspecionar resposta

Questão 2 de 12

Os títulos das páginas de menu são explicativos, refletindo a natureza da escolha a ser feita?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 3 de 12

Os títulos das páginas de menu são distintos entre si?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

no menu, as opções criar e editar repertório levam para a tela de Visualizador de repertório

## Questão 4 de 12

Os títulos das páginas de menu são combináveis ou componíveis?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 5 de 12

As denominações das opções de menu são familiares ao usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 6 de 12

O vocabulário utilizado nos rótulos, convites e mensagens de orientação são familiares ao usuário, evitando palavras difíceis?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 7 de 12

O vocabulário utilizado em rótulos, convites e mensagens de orientação é orientado à tarefa, utilizando termos e jargão técnico normalmente empregados na tarefa?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

editar, carregar - termos técnicos de informática

## Questão 8 de 12

Os cabeçalhos de colunas de dados são significativos e distintos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 9 de 12

O sistema adota códigos significativos ou familiares aos usuários?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 10 de 12

As abreviaturas são significativas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 11 de 12

As abreviaturas são facilmente distinguíveis umas das outras, evitando confusões geradas por similaridade?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 12 de 12

A intermitência luminosa (pisca-pisca) é usada com moderação e somente para atrair a atenção para alarmes, avisos ou mensagens críticas?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

#### 10.4.18 Critério Compatibilidade

## Questão 1 de 21

As telas são compatíveis com o padrão do ambiente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 2 de 21

A imagem do formulário na tela do terminal assemelha-se com o formulário de entrada em papel?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta



## Questão 3 de 21

O sistema propõe uma caixa de diálogo modal, quando a aplicação deve ter todos os dados antes de prosseguir ou quando o usuário tenha de responder a uma questão urgente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 4 de 21

As caixas de diálogo do sistema apresentam um botão de validação, um botão de anulação e, se possível, um botão de ajuda?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 5 de 21

Os significados usuais das cores são respeitados nos códigos de cores definidos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 6 de 21 As opções de codificação por cores são limitadas em número?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 7 de 21

As informações codificadas através das cores apresentam uma codificação adicional redundante?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 8 de 21

A taxa de intermitência para elementos piscantes está entre 2 e 5 Hz (2 a 5 piscadas por segundo)?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 9 de 21

A apresentação sonora é compatível com o ruído do ambiente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 10 de 21

As mensagens são sempre afirmativas e na voz ativa?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Comentários:

As respostas são na negativa. Ex. Não há item selecionado

## Questão 11 de 21

Quando uma frase descreve uma seqüência de eventos, a ordem das palavras na frase corresponde à seqüência temporal dos eventos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 12 de 21

Ilustrações e animações são usadas para completar as explicações do texto?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 13 de 21

O sistema segue as convenções dos usuários para dados padronizados?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 14 de 21

O sistema utiliza unidades de medida familiares ao usuário?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 15 de 21

Dados numéricos que se alterem rapidamente são apresentados analogicamente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

## Questão 16 de 21

Dados numéricos que demandam precisão de leitura são apresentados digitalmente?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 17 de 21

Os itens são numerados com números, não com letras?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 18 de 21

Os identificadores numéricos de opção de menu iniciam de "1", e não de "0"?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 19 de 21

Os eixos de um gráfico apresentam escalas numéricas iniciando em zero, com intervalos padronizados, crescendo da esquerda para a direita e de cima para baixo?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 20 de 21

Os itens de um grupo de botões de rádio são mutuamente exclusivos?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta

Questão 21 de 21

Os itens de um grupo de caixas de atribuição permitem escolhas independentes?

Sim       Não       Não aplicável       Adiar resposta